

Order ANSERIFORMES カモ目

Family ANATIDAE カモ科

DENDROCYGNA Swainson リュウキュウガモ属

6. *Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821) リュウキュウガモ

Ryukyu-gamo Lesser Whistling Duck

Range: Indomalayan. Breeds in tropical Asia from India to Java, north to s China and s Japan (Ryukyu Is.). Mainly sedentary.

Status: Ryukyu Is. (FB: Okinawajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I.). Record in Aichi (6th ed.) was removed because of suspicion of escaped bird. No reliable records over the last 50 years.

Habitat: Marshes, freshwater pools, flooded rice fields, mangroves.

琉球諸島 (FB: 沖縄島, 石垣島, 西表島, 黒島). 目録6版では愛知での記録を掲載しているが, 飼育個体の逸出の可能性があるため削除した. 最近50年間以上, 確実な国内記録がない.

湿地, 水田, マングローブ林などに生息する.

ANSER Brisson マガン属

7. *Anser cygnoides* (Linnaeus, 1758) サカツラガン

Sakatsura-gan Swan Goose

Range: C and e Palearctic. Breeds from the Altai east through Mongolia and Transbaikalia to the Amur Basin and Ussuriland; formerly has bred in Kamchatka, Commander Is., Okhotsk coast, and Sakhalin. Winters to China and Japan (now very rare). Recorded from the Kurile Is., Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV: Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Fukushima, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Aichi, Ishikawa, Gifu, Shiga, Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (IV), Oki (IV), Shikoku (IV: Tokushima, Ehime), Kyushu (IV: Fukuoka, Oita, Saga, Nagasaki, Kagoshima), Yakushima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ikemajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Inland lakes, marshes, tidal flats, rice fields.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (IV: 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 福島,

群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 愛知, 石川, 岐阜, 滋賀, 京都, 兵庫, 鳥取, 島根, 広島, 山口), 佐渡 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV: 徳島, 愛媛), 九州 (IV: 福岡, 大分, 佐賀, 長崎, 鹿児島), 屋久島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 池間島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

湖沼, 湿原, 河川, 水田などに生息する. 1950年までは東京湾に定期的に渡来していた.

8. *Anser fabalis* (Latham, 1787) ヒシクイ

Hishikui Bean Goose

Range: N Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to Anadyrland, south to the Altai, Mongolia, and Amur Basin. Winters to temperate regions.

8-1. *Anser fabalis middendorffii* Severtzov, 1873 オオヒシクイ

Range: Breeds in the wooded regions of e Siberia and Russian Far East from the Khatanga to the Kolyma River and Anadyrland, south to the s Altai, nw Mongolia, Lake Baikal region, and n Amur Basin. Winters to China and Japan. Recorded from Sakhalin and Korea.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV: Aomori, WV: Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Ishikawa, Fukui, Shiga, Okayama, Shimane, IV: Tochigi, Gunma, Nagano, Chiba, Kanagawa, Gifu), Sado (IV), Tsushima (PV), Shikoku (IV: Kagawa, Kochi), Kyushu (IV: Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV), Taramajima I. (AV), Iriomotejima I., Yonagunijima I. (AV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Inland lakes, marshes, rivers, rice fields.

北海道 (PV), 本州 (PV: 青森, WV: 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 石川, 福井, 滋賀, 岡山, 島根, IV: 栃木, 群馬, 長野, 千葉, 神奈川, 岐阜), 佐渡 (IV), 対馬 (PV), 四国 (IV: 香川, 高知), 九州 (IV: 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV), 多良間島 (AV), 西表島, 与那国島 (AV), 南大東島 (AV).

湖沼, 湿原, 河川, 水田に生息.

8-2. *Anser fabalis curtus* Lönnberg, 1923 ヒメヒシクイ

Range: Rare and breeding range little known; breeds probably from Novaya Zemlya to the Taimyr Peninsula. Winter range also poorly known.

Status: Honshu (AV: Niigata, Mar. 2003), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I.).

本州 (AV: 新潟, 2003年3月), 小笠原群島 (AV: 聳島).