

日本鳥類目録第5版補遺
ADDENDA AND CORRIGENDA
TO
CHECK-LIST OF JAPANESE BIRDS



日本鳥学会
THE ORNITHOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

目 次

- I 日本鳥類目録に追加の鳥類…………… |
- II 分布地の追加…………… |
- III 日本鳥類目録第5版第1刷正誤表… 6

- I Additios of Species ……………|0
- II Additions of Locality Records |3
- III Corrections ……………|7

I 日本鳥類目録に追加の鳥類

- 9/10 ワタリアホウドリ *Diomedea exulans* Linnaeus
 ワタリアホウドリ *Diomedea exulans exulans* Linnaeus
 南部琉球（尖閣列島周辺の海上1970年11月26日—2 標本）
 上記の記録だけの迷鳥である。
- 184/185 ヒメハマシギ *Calidris mauri* (Cabanis)
 本州（宮城県蒲生1975年5月8日）
 上記の1例だけの迷鳥である。
- 248/249 ヒメクビワカモメ *Larus roseus* MacGillivray
 北海道（斜里郡斜里町1974年1月15日）
 成鳥4羽，若鳥3羽が同時に観察された。まれな迷鳥である。
- 295/296 カンムリカッコウ *Clamator coromandus* (Linnaeus)
 トカラ列島（宝島1974年5月11日）
 上記の1例だけの迷鳥である。
- 431/432 チョウセンメジロ *Zosterops erythropleura* Swinhoe
 本州（福井県織田町笈松1974年11月7日）
 上記の1例だけの迷鳥である。
- 477/478 ホシムクドリ *Sturnus vulgaris* Linnaeus
 ホシムクドリ *Sturnus vulgaris poltaratskyi* Finsch
 九州（鹿児島県出水市1969年12月～1970年1月—野鳥35巻6号，1974年1月—
 野鳥39巻11号，熊本県江津湖1973年11月～12月—野鳥39巻2号）
 まれな冬鳥として渡来する（鳥97/98号参照）。

II 分布地の追加

番号	種 名	追 加
1	アビ	礼文島，利尻島
19	オオミズナギドリ	鹿児島県 <u>硫黄島</u> ， <u>草垣島</u> (B)， <u>馬毛島</u> (?)， <u>小笠原群島</u> (群島)
27	ハイイロウミツバメ	宮城 1956年3月24日
30	クロコシジロウミツバメ	岩手県 <u>花巻</u>

32	クロウミツバメ	硫黄列島(南硫黄島)
36	カツオドリ	神奈川, 伊豆諸島(新島, 鳥島)
43	オオグンカンドリ	兵庫県瑞ヶ池1954年9月26日
45	サンカノゴイ	南部琉球(宮古)
48	リュウキュウヨシゴイ	南部琉球(竹富, 小浜)
49	ミゾゴイ	南部琉球(宮古)
55	アマサギ	南部琉球(小浜)
56	チュウダイサギ	南部琉球(黒島W)
62	ムラサキサギ	中部琉球(沖縄), 南部琉球(小浜)
63	コウノトリ	礼文島(1974年), 鳥取
64	ナベコウ	南部琉球(西表1965年, 1968年)
69	シジュウカラガン	九州(長崎県三和町1974年)
71	ハイイロガン	北海道, 秋田1972年, 石川
72	マガン	壱岐
73	カリガネ	愛知
74	オオヒシクイ	石川
75	ハクガン	秋田, 愛知1973年
77	サカツラガン	鹿児島(1974年)を解説に挿入
82	アカツクシガモ	四国(香川)
83	ツクシガモ	伊豆諸島(八丈)
86	マガモ	隠岐
88	コガモ	対馬, 壱岐, 北部琉球(徳之島)
88	アメリカコガモ	群馬, 九州(熊本)
90	ヨシガモ	対馬
92	ヒドリガモ	中部琉球(沖縄)
94	オナガガモ	中部琉球(沖縄)
97	アカバシハジロ	福井県菅湖1969年11月 ♂ 1羽
98	ホシハジロ	中部琉球(沖縄)
99	オオホシハジロ	長野県諏訪湖1974年, 愛知県鍋田1974年
101	アカハジロ	福井, 広島
102	キンクロハジロ	中部琉球(沖縄)

103	スズガモ	<u>対馬, 壱岐</u>
104	コケワタガモ	<u>北海道(根室1974年)</u>
106	クロガモ	<u>壱岐</u>
112	ヒメハジロ	<u>北海道(根室1974年)</u>
113	ミコアイサ	<u>隠岐</u>
114	ウミアイサ	<u>壱岐</u>
117	ハチクマ	<u>九州(甕島)</u>
122	アカハラダカ	<u>本州(潮岬の南方542kmの海上)</u>
123	ツミ	<u>対馬, 中部琉球(沖縄)</u>
125	ケアシノスリ	<u>対馬</u>
127	ノスリ	<u>南千島(シコタン)</u>
129	クマタカ	<u>対馬</u>
132	イヌワシ	<u>対馬</u>
139	オオハヤブサ	<u>南千島(シコタンB), 九州(鹿児島)</u>
142	チョウゲンボウ	<u>小笠原群島</u>
148	シマキジ	<u>九州(天草)</u>
149	ミフウズラ	<u>北部琉球(喜界B, W)</u>
150	クロヅル	<u>北海道(千歳1966年, 阿寒1971年), 四国(徳島1973年12月)</u>
151	タンチョウ	<u>佐渡(1947年)</u>
154	マナヅル	<u>京都1877年, 種子島(1917年)</u>
157	クイナ	<u>伊豆諸島(八丈)</u>
158	オオクイナ	<u>南部琉球(与那国)</u>
164	バン	<u>中部琉球(沖縄)</u>
170	タマシギ	<u>中部琉球(屋我地)</u>
171	ミヤコドリ	<u>硫黄列島</u>
173	コチドリ	<u>南部琉球(黒島)</u>
175	シロチドリ	<u>壱岐, 小笠原群島(西之島), 中部琉球(伊江, 久米), 南部琉球(与那国)</u>
176	メダイチドリ	<u>中部琉球(久米), 大東群島</u>
184	キョウジョシギ	<u>小笠原群島(鴛島, 父島, 母島), 硫黄列島(北硫黄島,</u>

		<u>硫黄島</u>)
200	オオハシシギ	<u>宮城県</u> , <u>石川県</u> , <u>山口県</u> を解説に挿入
201	シベリアオオハシシギ	<u>大阪府南港1974年 8月29日～9月 8日冬1羽</u>
202	ツルシギ	<u>大東群島(沖大東島)</u>
205	アオアシシギ	<u>南部琉球(黒島)</u> , <u>大東群島(南大東島)</u>
212	イソシギ	<u>南部琉球(仲神島)</u>
213	ソリハシシギ	<u>中部琉球(沖縄)</u>
224	タシギ	<u>硫黄列島(北硫黄島)</u>
225	ハリオシギ	<u>大東群島</u>
230	セイタカシギ	<u>愛知県鍋田で繁殖が確認された(1975年 7月27日ひな3羽)</u> 。を解説に追加
234	ツバメチドリ	<u>本州(B)</u> , <u>九州(B)</u> <u>宮崎県都城市および高鍋町(1974年一野鳥39巻11号)</u> , <u>福岡県大牟田市(1975年一野鳥だより ふくおか17号)</u> <u>鳥取県米子市日野川(1975年 5月)などで繁殖が確認された</u> 。を解説に追加
235	オオトウゾクカモメ	<u>本州</u>
238	シロハラトウゾクカモメ	<u>南千島</u>
243	シロカモメ	<u>伊豆諸島(三宅)</u>
244	カモメ	<u>小笠原群島(父島)</u>
246	ズグロカモメ	<u>南部琉球(宮古)</u>
250	ハジロクロハラアジサシ	<u>中部琉球(沖縄)</u> , <u>大東群島(南大東島)</u>
254	オオアジサシ	<u>新潟</u> , <u>南部琉球(西表, 北向島)</u>
263	コアジサシ	<u>粟島</u>
268	ウミガラス	<u>佐渡(W)</u>
277	コウミスズメ	<u>本州南部</u>
288	リュウキュウキジバト	<u>中部琉球(伊是名, 伊江, 久高)</u>
297	カラフトワシミミズク	<u>北海道(日高支庁浦河1937年)</u>
311	ヤマショウビン	<u>対馬(1973年 4月)</u>
325	エゾオオアカゲラ	<u>南千島(エトロフ)</u>

332	ヒバリ	<u>伊豆諸島</u>
338	イワツバメ	<u>伊豆諸島(神津)</u>
340	キマユツメナガセキレイ	<u>本州からの報告もある。を解説に追加</u>
342	キセキレイ	<u>小笠原群島</u>
343	ハクセキレイ	<u>壱岐, 五島列島, 男女群島</u>
344	セグロセキレイ	<u>伊豆諸島(利島)</u>
348	ビンズイ	<u>北部琉球(奄美)</u>
350	ムネアカタヒバリ	<u>北部琉球(奄美)</u>
355	アマミヒヨドリ	<u>北部琉球(沖永良部 B, W)</u>
358	シマアカモズ	<u>南部琉球(宮古)</u>
359	オオモズ	<u>南千島(エトロフ)</u>
368	コマドリ	<u>屋久島</u>
372	オガワコマドリ	<u>新潟</u>
374	ルリビタキ	<u>壱岐</u>
386	クロツグミ	<u>利尻島</u>
397	カラフトウグイス	<u>佐渡</u>
400	ウチャヤマシマセンニュウ	<u>九州(福岡県沖ノ島 B), 伊豆諸島(青ヶ島)</u>
408	エゾムシクイ	<u>伊豆諸島(大島)</u>
410	イイジマムシクイ	<u>和歌山県(1936年)からの記録もある。を解説に追加</u>
416	オジロビタキ	<u>九州(佐賀1974年2月一鳥95/96号)</u>
421	リュウキュウサンコウチ ョウ	<u>中部琉球(屋我地)</u>
423	ツリスガラ	<u>九州(熊本県1974年, 1975年)</u>
426	ヒガラ	<u>佐渡</u>
427	ヤマガラ	<u>九州(B, W), 対馬(B, W), 五島列島</u>
428	シジュウカラ	<u>伊豆諸島(式根 B, W, 神津 B, W)</u>
431	ダイトウメジロ	<u>大東群島(北大東島 B, W)</u>
435	ホオジロ	<u>伊豆諸島(式根 B, W)</u>
438	ホオアカ	<u>伊豆諸島(大島)</u>
441	カシラダカ	<u>粟島, 伊豆諸島(三宅 W)</u>
447	アオジ	<u>隠岐</u>

450	オオジュリン	伊豆諸島(大島)
457	コカワラヒワ	隠岐
469	アカウソ	対馬
472	シメ	伊豆諸島(新島W)
476	コムクドリ	北部琉球(奄美), 南部琉球(与那国)
489	ハシブトガラス	粟島
27 (PI20)	ホシムクドリ	削除(本種は, No477/478となる)

III 日本鳥類目録第5版第1刷正誤表

番号	種 名	誤	正
目次	(p. viii)	サケイ科 PTEROCLIDAE	サケイ科 PTEROCLIDIDAE
13	フルマカモメ	<i>Fulmarus glacialis</i> Linnaeus	<i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus)
21	アカアシミズナギ ドリ		種名の下に亜種名を入れる <u>アカアシミズナギドリ</u> <i>Puffj-</i> <i>nus carneipes carneipes</i> Gould
30	クロコシジロウミ ツバメ	千葉県, 犬吠埼	千葉県犬吠埼
37	アオツラカツオド リ	明神礁付近1969年7月2日	1969年7月22日
53	ササゴイ	小笠原群島(母島)	(父島)
62	ムラサキサギ	四国(W)	四国
67	トキ	<i>Nipponia nippon</i> Temminck	<i>Nipponia nippon</i> (Temminck)
70	コクガン	九州	九州(W)
72	マガン	本州	本州(W)
74	ヒメヒシクイ		本州(福井)の記録もある。を解 説に追加
75	ハクガン	<i>Anser caerulescens</i> Linnaeus	<i>Anser caerulescens</i> (Linnaeus)

100	メジロガモ	新浜猟場1969年12月	1959年12月
112	ヒメハジロ	新潟県中之島村1957年	新潟県中之島村1956年
114	ウミアイサ	四国	四国(W)
119	オジロワシ	亜種名欠如	<u>オジロワシ</u> <i>Haliaeetus</i> <i>albicilla albicilla</i> (Linnaeus)
123	ツミ		九州(熊本)でも繁殖する。を解説に追加
137	チュウヒ	本州(W)	本州北部(B, W), 本州南部(W)
146	タイワンコジュケイ		埼玉県越ヶ谷で放鳥された記録もある。を解説に追加
152	ナベヅル	石川1920年	石川1926年
154	マナヅル	熊本1972年	熊本1971年
156	アネハヅル	鹿児島1972年	鹿児島1973年
160	リュウキュウヒクイナ	<i>Porzana fusca phaeopyga</i> <u>(Stejneger)</u>	<i>Porzana fusca phaeopyga</i> Stejneger
165	ツルクイナ	亜種名削除	本種には、亜種はない。
188	ヒメウズラシギ	千葉県行徳でも……	千葉県行徳および南部琉球(石垣島)でも……
240	セグロカモメ	<i>Larus argentatus vegae</i> Palmen	<i>Larus argentatus vegae</i> Palmén
255	ハシブトアジサシ	亜種名欠如	種名の下に亜種名を入れる <u>ハシブトアジサシ</u> <i>Sterna</i> <i>nilotica nilotica</i> Gmelin
258	エリグロアジサシ	沖神島B	仲神島B
261	マミジロアジサシ	静岡1871年	静岡1894年
264	ハイイロアジサシ	<i>Anous cerulea</i> Bennett	<i>Anous cerulea</i> (Bennett)
271	ケイマフリ		三重県志摩半島でも記録がある。
	サケイ科	PTEROCLIDAE	を解説に追加 PTEROCLIDAE
282	サケイ	上記5例のほか……	南部琉球(石垣)を分布地に追加し、上記6例のほか……とす

283	カラスバト	離島からの例である。	る。 離島からの漂行の例である。
288	リュウキュウキジバト	徳之島 <u>W</u> , 沖永良部 <u>W</u> , 与論 <u>W</u> 与那国	徳之島, 沖永良部, 与論 与那国 <u>B, W</u>
291	チュウダイズアカアオバト	宮古 <u>W</u>	宮古
302	オオコノハズク	<u>伊豆諸島でも繁殖する。</u>	削除
309	アマツバメ	九州	九州 (<u>B</u>)
314	カワセミ	対馬 (<u>W</u>) 与那国 <u>W</u>	対馬 与那国
318	アリスイ	<i>Jynx torquilla japonica</i> Bonaparte	<i>Jynx torquilla japonica</i> (<u>Bonaparte</u>)
318	シベリアアリスイ	<i>Jynx torquilla chinensis</i> Hesse	<i>Jynx torquilla chinensis</i> (<u>Hesse</u>)
324	エゾアカゲラ	利尻島 (<u>W</u>)	利尻島
327	エゾコゲラ	利尻島 (<u>W</u>)	利尻島
327	ツシマコゲラ	隠岐 (<u>W</u>)	隠岐 (<u>B, W</u>)
328	ミユビゲラ	1932年に……	1942年に……
331	ヒメコウテンシ	酒匂川下流1958年6月5日	1958年 <u>5月6日</u> 採集
340	マミジロツメナガセキレイ	<u>男女群島</u>	削除
343	ホオジロハクセキレイ	<u>北海道</u>	削除
344	セグロセキレイ	伊豆諸島 (大島 <u>W</u> , 三宅 <u>W</u> ,	<u>大島W</u> , を削除
355	オガサワラヒヨドリ	<i>Hypsipetes amaurotis squameiceps</i> (Kittlitz)	<i>Hypsipetes amaurotis squameiceps</i> (Kittlitz)
362	ヒレンジャク	<i>Bombycilla japonica</i> Siebold	<i>Bombycilla japonica</i> (<u>Siebold</u>)
369	ウスアカヒゲ	<i>Erithacus komadori subrufa</i> (Kuroda)	<i>Erithacus komadori subrufus</i> (Kuroda)

381	ヒメイソヒヨ	秋田市1968年5月, 1969年 5月	1968年5月を削除
426	ヒガラ	利尻島(W)	利尻島(B, W)
427	ヤマガラ	四国北部(B, W)	四国(B, W)
428	シジュウカラ	礼文島(W) 五島列島 御蔵B, W	礼文島 五島列島(B, W) 御蔵
429	シロハラゴジュウ カラ	南千島(W)	南千島
431	メジロ	対馬(B), 壱岐(B),	対馬(B, W), 壱岐(B, W),
432	ハハジマメグロ	向島W	向島
434	シラガホオジロ	冬鳥または旅鳥として……	迷鳥として……
439	コホオアカ	静岡県大里村1909年11月	1904年11月
447	アオジ	南部琉球(竹富, 与那国)	南部琉球(竹富W, 与那国W)
448	クロジ	群馬 果卵の確認は……	削除 山形, 福島, 栃木, 長野では繁殖が確認された。に変わる
449	キタシベリアジュ リン	1925年3月1日♀1羽	1925年3月1日♂1羽
	シベリアジュリン	1924年1月27日♀1羽	1924年1月27日♂1羽
452	ユキホオジロ	南千島	削除

I Additions of Species

9/10 **Diomedea exulans** Linnaeusワタリアホウドリ
Wandering Albatross Watari-ahôdori

Diomedea exulans Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 132 (Cape of Good Hope, S. Africa).

Range: Subantarctic Seas. Breeds on Tristan da Cunha, Gough (*dabbenena*), S. Georgia, Marion, Prince Edward, Crozet, Kerguelen, Auckland Is., Antipodes (*exulans*). Ranges in southern seas between 30° and 60° S. and wanders around the Antarctica.

Status: Accidental (one record).

Habitat: Two birds were captured on open sea by a bonito-fishing boat.

Diomedea exulans exulans Linnaeus

See species range.

Locality Records: S. Ryukyus (near Senkaku Is., 26 Nov. 1970).

184/185 **Calidris mauri** (Cabanis)ヒメハマシギ
Western Sandpiper Hime-hamashigi

Ereunetes Mauri Cabanis, 1857, J. Orn., 4 (1856): 419 (South Carolina).

Range: Nearctic. Coasts of Alaska from Nunivak I. and the Kashunuk River to Camden Bay, and east coast of Chukotski Peninsula in north-eastern Siberia. Migratory, wintering on both the Pacific and Atlantic coasts of America south to West Indies, Venezuela, and Peru. Monotypic.

Status: Accidental (one record).

Habitat: A single bird was observed and photographed in salt-flat.

Locality Records: Honshu (Miyagi at Gamô, 8 May 1975).

248/249 **Larus roseus** MacGillivrayヒメクビワカモメ
Ross' Gull Hime-kubiwa-kamome

Larus roseus MacGillivray, 1824, Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., 5: 249 (Melville Peninsula).

Range: Arctic. Arctic coast of eastern Siberia, west to the delta of the Yana; a breeding record from Disko Bay, western Greenland. Winters in the Arctic Ocean and the Bering Sea; accidental in Europe, Sea of Okhotsk, Manchuria, and Japan. Monotypic.

Status: Accidental (one record).

Habitat: A party of 4 adults and 3 young birds was observed and photographed at sea coast.

Locality Records: Hokkaido (Abashiri at Shari, 15 Jan. 1974).

CLAMATOR Kaup カンムリカッコウ属

Clamator Kaup, 1829, Skizz. Entwickel. Ges. Nat. Syst. Eur. Thierw.:

53. Type, by original designation, *Cuculus glandarius* Linnaeus.

295/296 ***Clamator coromandus*** (Linnaeus)カンムリカッコウ

Red-winged Crested Cuckoo Kanmuri-kakkô

Cuculus coromandus Linnaeus, 1766, Syst. Nat., ed. 12, 1: 171
(Coromandel).

Range: Oriental. From Himalayas, India and Ceylon east through southeast Asia to Sumatra, Java and Borneo; China north to Kiangsu and Szechwan. Resident, but Chinese bird is migratory. Straggled to Taiwan, Philippines, Celebes, and Ryukyus. Monotypic.

Status: Accidental (one record).

Habitat: A straggled bird was captured in a village and released.

Locality Records: N. Ryukyus (Takarajima, Tokara Is., 11 May 1974).

431/432 ***Zosterops erythropleura*** Swinhoeチョウセンメジロ
Chestnut-flanked White-eye Chôsen-mejiro

Zosterops erythropleurus Swinhoe, 1863, Ibis, (1), 5: 294; Proc. Zool. Soc. London, (1863): 204 (Tientsin and Shanghai, N. China).

Range: Eastern Palearctic. Eastern Amurland, Ussuriland, and eastern Manchuria. Migratory, migrating through Korea and eastern China to winter in southwestern China (Yunnan), Indochina, Thailand, and eastern Burma. Monotypic.

Status: Accidental (one record).

Habitat: An adult bird was captured and ringed on a hillside.

Locality Records: Honshu (Fukui, 7 Nov. 1974).

477/478 ***Sturnus vulgaris*** Linnaeus¹⁾ホシムクドリ
Starling Hoshi-mukudori

Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1: 167 (Sweden).

Range: Palearctic. Europe and Siberia east to Lake Baikal, Altai, and Turkestan, south to Asia Minor, Iran, and western Himalayas. Partly migratory, wintering in north Africa, Iranian region, and northern India. Introduced in North America, South Africa, Polynesia, Australia, and New Zealand. Polytypic (about 11 subspecies).

1) The Committee considered that this species is an accidental or rare winter visitor rather than an escapee from captivity (cf. Appendix 2).

Status: Accidental or rare winter visitor. No specimen, subspecies assigned on geographical ground.

Habitat: Cultivated regions and gardens.

***Sturnus vulgaris poltaratskyi* Finsch**

Sturnus poltaratskyi Finsch, 1878, Proc. Zool. Soc. London, (1878): 713 (western Altai).

Siberia from Urals eastward to Lake Baikal, south to East Kazakhstan, Semipalatinsk, Altai, and western Mongolia. Winters in Iran, Afghanistan, Baluchistan, and plains of northern India; recorded from eastern China (Hopei, Shantung) and Japan.

Locality Records: Kyushu (Kagoshima, Dec. 1969–Jan. 1970, Jan. 1974; Kumamoto, Nov.–Dec. 1973).

For *Puffinus carneipes* on p. 11 substitute:

- 21 ***Puffinus carneipes* Gould** アカアシミズナギドリ
Pale-footed Shearwater Akaashi-mizunagidori

Puffinus carneipes Gould, 1844, Ann. Mag. Nat. Hist., 13: 365 (West Australia).

Range: Austro-neozelanic and S. American (Chilean) islands, migrating to Indian and N. Pacific Oceans. Breeds on islands of S. W. Australia (migrating to Indian Ocean—indistinct subspecies *hullianus*); Lord Howe I. and North Island, N. Z., migrating to western Pacific, rarely to Washington and California coasts or further to Juan Fernandez on Chilean coast (*carneipes*). Other population (*creatopus*) breeds on Mocha I. and Juan Fernandez, migrating north to California coast.¹⁾ Polytypic (3 subspecies).

Status: Regular summer visitor from the Southern Hemisphere. Not very common off Pacific coast, but large flocks may be met with along the Japanese coasts.

Habitat: Offshore waters.

***Puffinus carneipes carneipes* Gould**

Breeds on North Island, N. Z., and Lord Howe I., migrating to Japanese waters, sporadic east to California coast, etc.

Locality Records: Hokkaido, S. Kuriles, Honshu, Izu Is. (Oshima, Niihima, Torishima).

1) This is a pale-breasted form, formerly treated as separate species, but see W.R.P. Bourne in Handb. N. Amer. Bds, 1963, 1: 162.

II Additions of Locality Records

No.	Species	Additions
2	<i>Gavia arctica viridigularis</i>	S. Kuriles
3	<i>Gavia pacifica</i>	S. Kuriles
5	<i>Podiceps ruficollis poggei</i>	S. Kuriles
8	<i>Podiceps grisegena holbollii</i>	S. Kuriles
11	<i>Diomedea immutabilis</i>	S. Kuriles
20	<i>Puffinus pacificus</i>	<i>Range: Breeds on Revilla Gigedo, Hawaii, Ogasawara Is., formerly Minami-torishima (white-breasted "cuneatus" of Salvin, Ibis, 1888: 353), Pescadores, Pacific islands west to Cocos Keeling, east to Marquesas, W. Australia, Seychelles, Mauritius, Reunion (chlororhynchus); also Fiji, Lord Howe, Norfolk, Kermadec, Kandavu (pacificus).</i>
21	<i>Puffinus carneipes</i>	S. Kuriles
27	<i>Oceanodroma furcata furcata</i>	Miyagi (Mar. 1956)
36	<i>Sula leucogaster plotus</i>	Kanagawa, Izu Is. (Niijima, Torishima)
38	<i>Sula sula rubripes</i>	S. Ryukyus
40	<i>Phalacrocorax filamentosus</i>	S. Ryukyus (Yonakuni)
43	<i>Fregata minor minor</i>	Hyogo 1954
61	<i>Ardea cinerea jouyi</i>	S. Kuriles
62	<i>Ardea purpurea manilensis</i>	C. Ryukyus (Okinawa)
63	<i>Ciconia ciconia boyciana</i>	Rebun (1974)
65	<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Okayama
67	<i>Nipponia nippon</i>	Tokyo
69	<i>Branta canadensis leucopareia</i>	Kyushu (Nagasaki 1974—obs.)
71	<i>Anser anser rubrirostris</i>	Hokkaido, Akita 1972, Ishikawa
72	<i>Anser albifrons frontalis</i>	Iki
73	<i>Anser erythropus</i>	Aichi
74	<i>Anser fabalis serrirostris</i>	S. Kuriles
	<i>Anser fabalis middendorffii</i>	Ishikawa
75	<i>Anser caerulescens hyperboreus</i>	Akita, Aichi 1973

No.	Species	Additions
77	<i>Anser cygnoides</i>	S. Kuriles, Kyushu (Kagoshima 1974)
79	<i>Cygnus cygnus</i>	S. Kuriles
80	<i>Cygnus columbianus jankowskii</i>	S. Kuriles, Shikoku
82	<i>Tadorna ferruginea</i>	Oki, Shikoku (Kagawa)
85	<i>Aix galericulata</i>	Awashima, Iki
86	<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Rebun, Yagishiri, Awashima
87	<i>Anas poecilorhyncha zonorhyncha</i>	Awashima
88	<i>Anas crecca crecca</i>	Iki, Izu Is. (Oshima, Miyake), Ogasawara Is. (Chichi, Haha)
	<i>Anas crecca carolinensis</i>	Gunma, Kyushu (Kumamoto)
89	<i>Anas formosa</i>	S. Kuriles, Iki
92	<i>Anas penelope</i>	Awashima, Iki, C. Ryukyus (Okinawa)
94	<i>Anas acuta acuta</i>	C. Ryukyus (Okinawa)
95	<i>Anas querquedula</i>	S. Kuriles
96	<i>Anas clypeata</i>	S. Kuriles
98	<i>Aythya ferina</i>	C. Ryukyus (Okinawa)
99	<i>Aythya valisineria</i>	Lake Suwa in Nagano 1974, Nabeta in Aichi 1974
101	<i>Aythya baeri</i>	Fukui, Hiroshima
102	<i>Aythya fuligula</i>	N. Ryukyus (Amami-oshima)
103	<i>Aythya marila mariloides</i>	Iki
106	<i>Melanitta nigra americana</i>	Iki
109	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Teuri, Awashima
111	<i>Bucephala clangula clangula</i>	Teuri
112	<i>Bucephala albeola</i>	Hokkaido (Nemuro 1974)
114	<i>Mergus serrator</i>	Teuri, S. Kuriles, Iki
116	<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	S. Kuriles
117	<i>Pernis apivorus japonicus</i>	Sado
123	<i>Accipiter gularis gularis</i>	S. Kuriles
125	<i>Buteo lagopus menzbieri</i>	S. Kuriles
127	<i>Buteo buteo japonicus</i>	Oki
135	<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	S. Kuriles
136	<i>Circus melanoleucos</i>	Kyushu (Kusagakijima, Apr. 1973)
137	<i>Circus aeruginosus spilonotus</i>	Sado
139	<i>Falco peregrinus japonensis</i>	Rishiri, Teuri, S. Kuriles
140	<i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Awashima, Sado
141	<i>Falco columbarius insignis</i>	S. Kuriles

No.	Species	Additions
148	<i>Phasianus colchicus karpowi</i>	Kyushu
150	<i>Grus grus lilfordi</i>	Shikoku (Tokushima, Dec. 1973)
151	<i>Grus japonensis</i>	Niigata 1935, Okayama 1974, Shimane 1973
156	<i>Anthropoides virgo</i>	N. Ryukyus (Tokunoshima 1965)
157	<i>Rallus aquaticus indicus</i>	Rebun, Rishiri, Sado
159	<i>Porzana pusilla pusilla</i>	Iwo Is. (Iwojima)
160	<i>Porzana fusca phaeopyga</i>	S. Ryukyus (Miyako)
166	<i>Fulica atra atra</i>	Izu Is., S. Ryukyus (Miyako)
167	<i>Otis tarda dybowskii</i>	Gifu
173	<i>Charadrius dubius curonicus</i>	S. Kuriles, Awashima, S. Ryukyus (Iriomote)
175	<i>Charadrius alexandrinus nihonensis</i>	S. Kuriles, Izu Is. (Oshima)
176	<i>Charadrius mongolus stegmanni</i>	S. Kuriles
177	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Danjo Is.
180	<i>Pluvialis dominica fulva</i>	S. Kuriles
184	<i>Arenaria interpres interpres</i>	S. Kuriles, Tsushima, Danjo Is.
195	<i>Crocutia alba</i>	S. Kuriles
196	<i>Eurynorhynchus pygmeus</i>	S. Kuriles
200	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Miyagi, Ishikawa, Yamaguchi
201	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Osaka, Aug. 1974
202	<i>Tringa erythropus</i>	S. Kuriles
203	<i>Tringa totanus eurhinus</i>	C. Ryukyus (Okinawa)
205	<i>Tringa nebularia</i>	S. Kuriles
207	<i>Tringa guttifer</i>	Hokkaido (Ishikari), Kumamoto 1973
210	<i>Tringa incana</i>	S. Kuriles
214	<i>Limosa limosa melanuroides</i>	S. Kuriles
216	<i>Numenius arquata</i>	Tsushima
220	<i>Numenius tahitiensis</i>	Ogasawara Is.
222	<i>Scolopax rusticola</i>	S. Kuriles, Sado
225	<i>Gallinago stenura</i>	S. Kuriles, Ogasawara Is. (Muko)
226	<i>Gallinago megala</i>	Izu Is. (Torishima)
227	<i>Gallinago hardwickii</i>	S. Kuriles
228	<i>Gallinago solitaria japonica</i>	S. Kuriles
229	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	S. Kuriles; Miyagi
230	<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Yamagata; Recently known to breed in Honshu (Aichi 1975).

No.	Species	Additions
233	<i>Phalaropus lobatus</i>	Rebun, Sado, Tsushima
234	<i>Glareola maldivarum</i>	Shikoku; Recently known to breed in Honshu (Tottori 1975), and Kyushu (Fukuoka 1975, Miyazaki 1974).
235	<i>Stercorarius skua maccormicki</i>	S. Kuriles
236	<i>Stercorarius pomarinus</i>	S. Kuriles
241	<i>Larus schistisagus</i>	Rebun, Rishiri, Teuri, Daikokujima, Tsushima
242	<i>Larus glaucescens</i>	S. Kuriles
245	<i>Larus crassirostris</i>	Rebun, Rishiri, Teuri, Danjo Is.
248	<i>Larus tridactylus pollicaris</i>	Tsushima
250	<i>Sterna leucopetera</i>	Akita
254	<i>Sterna bergii cristata</i>	Shizuoka
256	<i>Sterna hirundo longipennis</i>	Kyushu
268	<i>Uria aalge inornata</i>	Rebun, Rishiri
271	<i>Cepphus carbo</i>	Rebun, Rishiri
273	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	Rebun, Rishiri
285	<i>Columba versicolor</i>	Ogasawara Is. (Chichi)
291	<i>Sphenurus formosae medioximus</i>	S. Ryukyus (Miyako)
293	<i>Cuculus canorus telephonus</i>	Rebun, Rishiri
301	<i>Otus scops japonicus</i>	Rishiri
304	<i>Ninox scutulata japonica</i>	Daito Is. (Kita-daito)
307	<i>Chaetura caudacuta caudacuta</i>	Rishiri
308	<i>Apus affinis subfurcatus</i>	Izu Is. (Miyake)
309	<i>Apus pacificus pacificus</i>	Rishiri, Rebun
316	<i>Eurystomus orientalis calonyx</i>	S. Kuriles
317	<i>Upupa epops saturata</i>	Saitama, Ishikawa
318	<i>Jynx torquilla japonica</i>	Rebun, Rishiri
324	<i>Dendrocopos major japonicus</i>	Rishiri
329	<i>Pitta brachyura nympha</i>	Saitama 1973, Yamanashi 1964
338	<i>Delichon urbica dasypus</i>	Izu Is. (Torishima)
343	<i>Motacilla alba leucopsis</i>	Goto Is.
349	<i>Anthus gustavi gustavi</i>	Niigata 1967
371	<i>Erithacus calliope</i>	Rebun, Teuri
383	<i>Turdus dauma aureus</i>	Izu Is. (Mikura)
386	<i>Turdus cardis</i>	Danjo Is.

No.	Species	Additions
400	<i>Locustella ochotensis pleskei</i>	Mie—breed, Izu Is. (Aogashima)
402	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	Rishiri
416	<i>Ficedula parva albicilla</i>	Kyushu (Saga, Feb. 1974)
419	<i>Muscicapa griseisticta</i>	Shikoku
423	<i>Remiz pendulinus consobrinus</i>	Kyushu (Kumamoto 1974, 1975)
428	<i>Parus major minor</i>	Izu Is. (Kozu, Mikura)
431	<i>Zosterops japonica japonica</i>	Danjo Is.
442	<i>Emberiza elegans elegans</i>	S. Kuriles
469	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>	Izu Is. (Kozu)
472	<i>Coccothraustes coccothraustes japonicus</i>	Ogasawara Is. (Haha)
p.364		
27	<i>Sturnus vulgaris</i>	Delete

III Corrections

No.	Species	Corrections
p.VI		Family PTEROCLIDAE → Family PTEROCLIDIDAE
2	<i>Gavia arctica viridigularis</i>	east to Lena Should read west to Lena
4	<i>Gavia adamsii</i>	Honshu (south to Sagami Bay), → (south to Sagami Bay and Niigata),
13	<i>Fulmarus glacialis</i>	<i>Fulmarus glacialis</i> Linnaeus → <i>Fulmarus glacialis</i> (Linnaeus)
	<i>Fulmarus glacialis</i>	<i>Procellaria fulmarus</i> Linnaeus, 1761, → <i>Procellaria glacialis</i> Linnaeus, 1761,
p.8	PTERODROMA	Comp. Red. → Compt. Rend.
p.9	BULWERIA	<i>Bulweria</i> , 1842 → <i>Bulweria</i> Bonaparte, 1843,
20	<i>Puffinus pacificus</i>	<i>Puffinus pacificus</i> Gmelin → <i>Puffinus pacificus</i> (Gmelin)
	<i>Puffinus pacificus</i>	<i>Puffinus pacificus</i> Gmelin, 1789, → <i>Procellaria pacifica</i> Gmelin, 1789,
36	<i>Sula leucogaster plotus</i>	<i>Pelecanus Plotus</i> Forster, 1855, → <i>Pelecanus Plotus</i> Forster, 1844,
53	<i>Butorides striatus amurensis</i>	Ogasawara Is. (Haha), → Ogasawara Is. (Chichi),
59	<i>Egretta eulophotes</i>	(Osaka, May, Aug., 1958), → (Osaka, May, Aug., 1956),

No.	Species	Corrections
	<i>Egretta eulophotes</i>	Tsushima (Jan. 1962, → Tsushima (Jan. 1963,
67	<i>Nipponia nippon</i>	Nipponia nippon Temminck → Nipponia nippon (Temminck)
75	<i>Anser caerulescens</i>	Anser caerulescens Linnaeus → Anser caerulescens (Linnaeus)
	<i>Anser caerulescens</i>	<i>Anser caerulescens</i> Linnaeus, 1758, → <i>Anas caerulescens</i> Linnaeus, 1758,
	<i>Anser caerulescens</i> <i>hyperboreus</i>	Miyagi 1951, '65, '74, → Miyagi 1951, '65, '73,
119	<i>Haliaeetus albicilla</i>	After <i>Habitat</i> add: Haliaeetus albicilla albicilla (Linnaeus) Species range except Greenland.
127	<i>Buteo buteo oshiroi</i>	fled in 1978 → fled in 1968
163	<i>Amaurornis</i> <i>phoenicurus chinensis</i>	Shizugawa in Miyagi 1968 → Shizugawa in Miyagi 1967
165	<i>Gallicrex cinerea</i>	Delete: Gallicrex cinerea cinerea (Gmelin) India to China, Taiwan, Korea and Kyushu.
198	<i>Tryngites subruficollis</i>	Aichi 1819, → Aichi 1891,
255	<i>Sterna nilotica</i>	After <i>Habitat</i> add: Sterna nilotica nilotica Gmelin Europe through S. Mongolia to Transbaikalia. Migrates to Africa, Iran, India, S. China; recorded from Sunda Is.
281 p.157	<i>Lunda cirrhata</i>	Funka Bay, → Uchiura Bay, Family Pteroclididae → Family Pteroclididae
318	<i>Jynx torquilla</i> <i>japonica</i>	Jynx torquilla japonica Bonaparte → Jynx torquilla japonica (Bonaparte)
	<i>Jynx torquilla</i> <i>chinensis</i>	<i>Jynx torquilla chinensis</i> Hesse → <i>Jynx torquilla chinensis</i> (Hesse)
324	<i>Dendrocopos major</i> <i>hondoensis</i>	N. and C. Honshu (Aomori to Shimane, Izu Pen.), Tsushima, → Breeds in Honshu, Tsushima,
328	<i>Picoides tridactylus</i> <i>inouyei</i>	Tokachi in 1932. → Tokachi in 1942.
331	<i>Calandrella cinerea</i> <i>longipennis</i>	Kanagawa, Apr. 1958 → Kanagawa, May 1958

No.	Species	Corrections
352	<i>Coracina melaschistos intermedia</i>	Miyazaki, Jan. 1970 → Miyazaki, Jan. 1971
355	<i>Hypsipetes amaurotis borodinonis</i> (Note 2)	with <i>squameiceps</i> → with <i>squamiceps</i>
	<i>Hypsipetes amaurotis squamiceps</i>	<i>Hypsipetes amaurotis squameiceps</i> → <i>Hypsipetes amaurotis squamiceps</i>
	<i>Hypsipetes amaurotis squamiceps</i>	<i>Oriolus squameiceps</i> Kittlitz, → <i>Oriolus squamiceps</i> Kittlitz,
362	<i>Bombycilla japonica</i>	<i>Bombycilla japonica</i> Siebold → <i>Bombycilla japonica</i> (Siebold)
	<i>Bombycilla japonica</i>	<i>Bombycilla japonica</i> Siebold, 1824, → <i>Bombycivora Japonica</i> Siebold, 1824,
369	<i>Erithacus komadori subrufus</i>	<i>Erithacus komadori subrufa</i> (Kuroda) → <i>Erithacus komadori subrufus</i> (Kuroda)
378	<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Tokyo, Nov. 1967, → Tokyo, Nov. 1969,
381	<i>Monticola gularis</i>	(Akita, May 1968). → (Akita, May 1969).

GAKKEN

〈学習研究社〉

3045-168 021-1002