

ISBN978-4-930975-00-3
C3045
日本鳥学会


CHECK-LIST OF JAPANESE BIRDS
7TH REVISED EDITION
THE ORNITHOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
日本鳥類目録 改訂第7版
2012

CHECK-LIST OF JAPANESE BIRDS
7TH REVISED EDITION

日本鳥類目録
改訂第7版

THE ORNITHOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN
日本鳥学会
2012

Locality map of Japan





CHECK-LIST OF JAPANESE BIRDS

7TH REVISED EDITION

PREPARED BY THE COMMITTEE FOR CHECK-LIST OF JAPANESE BIRDS
OF
THE ORNITHOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

日本鳥類目録

改訂第 7 版

編集 日本鳥学会（目録編集委員会）

日本鳥学会創立百周年記念出版

PUBLISHED BY THE ORNITHOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

発行 日本鳥学会

2012

The Committee for Check-List of Japanese Birds (7th ed.)

Chairperson

Norio Yanagisawa

Executive Members

Taxonomy Sub-committee

Takashi Hiraoka, Isao Nishiumi, Takema Saitoh*, Yutaka Watanuki,
Takeshi Yamasaki

Records Sub-committee

Hiroshi Ikenaga, Kazuto Kawakami (*Member since 2010)

Working members for classification

Shigeki Asai, Kazuhiko Hirata, Yasuko Iwami, Satoe Kasahara, Kouta
Kurasawa, Shin Matsui, Sayaka Mori, Gen Morimoto, Yasuyuki Saito,
Norimasa Sugita, Masao Takahashi

目録編集委員会（第 7 版）

委員長

柳澤紀夫

委員

分類担当 平岡考, 西海功, 齋藤武馬*, 綿貫豊, 山崎剛史

記録担当 池長裕史, 川上和人 (*2010 年以降の委員)

分類専門委員

浅井芝樹, 平田和彦, 岩見恭子, 笠原里恵, 倉沢康大, 松井晋,
森さやか, 森本元, 斉藤安行, 杉田典正, 高橋雅雄

Recommended citation:

The Ornithological Society of Japan (2012) Check-list of Japanese Birds, 7th revised edition.
The Ornithological Society of Japan, Sanda.

日本鳥学会 (2012) 日本鳥類目録改訂第 7 版. 日本鳥学会, 三田.

© The Ornithological Society of Japan 2012

ISBN978-4-930975-00-3

Foreword

Ornithological Society of Japan was established in 1912 and this publication was put into practice as one of the memorial works for the 100th anniversary. Science that originated in Europe arrived in Japan in a full scale about 150 years ago with the start of Meiji era, and thereafter our ascendants made every effort to grow and promote our science to a higher level. In Japan the advancement of biology was accelerative during these 50 years, and ornithology was not an exception.

By the way, check-list is not a mere species-list. Determination of species requires up-to-date information on morphology, physiology, behaviour and ecology of the species concerned, and naturally they are to be renewed with development of each field of biology. Thus, species category changes with time and check-list is to be revised almost forever toward the threshold of Truth.

On the other hand, every field of biology starts with determination of species. It means that biology starts with editing of check-list, which is cast to each field, and with the addition of new information there, it is brought back and reflected in a new version of check-list. Thus, check-list plays an important role by its cyclic self-movement.

And also, with the rapid advancement of molecular genetics, much new information is available on phylogeny and hybridization which is reflected in this revision, the editors making every effort to fill up the gap between the world current and our preceding versions. In this opportunity I hope the establishment of a system that enables continuous brushing-up of Japanese avian classification toward Natural System.

Yasuo EZAKI, President
The Ornithological Society of Japan
August 2012

日本鳥類目録第 7 版の刊行によせて

日本鳥類目録改定第 7 版がここに完成した。学会創立は 1912 年（明治 45 年）のことで、目録初版は学会創立 10 周年を記念して 1922 年に出版されたものであり、今回の改定は 100 周年を記念してのことである。

わが国に西洋科学が本格的に上陸したのは明治に入ってから、つまり概ね 150 年前であり、それ以降、科学における途上国から新興国、そして先進国への仲間入りの努力が先輩諸氏によってなされてきた。そのなかで日本鳥学会は 100 年の歴史をもつ。100 年という時間は長いともみえるが、この間の生物学を含む科学の発展は加速度的におこっており、わが国の鳥類学あるいは鳥学においても、きわめて短い期間に飛躍的な発展がなされたと考えられる。

さて、目録は単なる種リストではない。まず、種をどう定めるかには、当該生物に関する形態・生理・行動そして生態に関する最新の知見が必要である。そしてこれらは各学問分野の発展にともない常に更新されていく性質のものであるから、種の確定も時代とともに変化するのが定めである。したがって、目録は真理という漸近線にむかって永遠に改定を繰り返す性格のものであるといえる。そして、分類群にかかわらず生物学は必ず、種を定め命名することから始まるものであるから、言葉をかえるならば、生物学は目録に始まり、各分野に送りだされ、再び目録にいったん帰着したのち、各分野に送りだされるという自己運動を繰り返していることになる。

いっぽう近年の分子遺伝学の発展にともない、種の系統関係や交雑の実態についても続々と新たな知見が積み重ねられている。本目録はこのことを反映した新しいものになっており、世界的な潮流との乖離を縮める努力がなされている。この出版を契機に、絶え間ない改善がなされることを切に望む。むろん、自然分類に向かってである。

2012 年 8 月吉日

日本鳥学会

会長 江崎 保男

Preface

In 2012, the Ornithological Society of Japan is celebrating its centennial year, having been established in 1912. To commemorate its centennial, the decision has been made to publish herein a Seventh Revised Edition of the Check-list of Japanese Birds. The Sixth Revised Edition was published in 2000, making this the first revision in 12 years. The Seventh Edition covers the same regions as the Fifth and Sixth Editions, namely the whole of Japan and its islands. Points worthy of special mention in this revision are the drastic change of taxonomy reflecting the latest developments of molecular phylogeny, and the addition of an abundance of newly recorded species and subspecies.

In compiling the Seventh Revised Edition, the Exploratory Committee for Check-list of Japanese Birds was first established as an extraordinary committee from March 2007 until March 2008, with Noritomo Kawaji as Committee Chairperson. This Committee considered policy and planning for publication of the Seventh Revised Edition. Thereafter, on September 14th, 2008, the Committee for Check-list of Japanese Birds was established as a time-limited committee responsible for working on compilation of the Seventh Revised Edition, and started collecting and studying data, and writing the manuscript based on the policies laid down by the Exploratory Committee. At first it was made up of seven members, but in 2010 another member was added to the Committee. Also, in order to reflect the latest research results in taxonomy, a further 11 members were added in 2011 as working members for classification.

The main text of this Check-List consists of two parts: “Part A. Check-list of Japanese Birds”, which lists the species and subspecies recorded to have occurred naturally inside Japan and “Part B. Introduced Species and Subspecies”, which contains the introduced species and subspecies with breeding records inside Japan. Part A contains 24 orders, 81 families, 260 genus, and 633 species, while Part B contains 8 orders, 15 families, 28 genus, and 43 species. Of the species and subspecies in Part A, “species and subspecies with no records over the last 50 years in Japan” are listed in Appendix A. On the other hand, in cases where we were not able to determine whether the record was of an escapee or a natural origin, or where, because of insufficient

observation information, we considered further investigations to be necessary in order to establish the identity of the bird, the species and subspecies claimed in these reports are listed in “Appendix B. Species and subspecies presently unaccepted”.

Modern taxonomic systems of living things will become outdated by the development of research, since they are based on hypotheses regarding phylogenetic relationships. However, because taxonomic systems are also relied upon by such practical sectors as administration and education, it is essential to avoid unnecessary shifting of taxonomy as a result of hurriedly following new theories. In the face of more and more new research results being published on avian classification using molecular phylogenetic techniques, the Sixth Edition made only minimal changes from the traditional taxonomy of the Fifth Edition, stating “we are in a transition period for research of new taxonomic systems” (The Committee for Check-list of Japanese Birds, 1997). The Seventh Revised Edition arrives 12 years after the publication of the Sixth Edition. As molecular phylogeny technique has become even more refined, so its achievements have further accumulated and there has been a fair amount of consensus among results from research with different techniques and independent characters, which has made it possible to obtain an appropriate level of agreement. Accordingly, the Seventh Revised Edition has completely changed its classification to reflect these achievements, and there have been major changes to the arrangement of orders, and the families that constitute these orders, in comparison with previous editions. Taxonomic notes on the points of change will appear separately in *The Japanese Journal of Ornithology*. Per Alström and Edward C. Dickinson commented on the higher-level taxonomy. Check-lists of many countries where ornithology is active are already adopting results such as these, and I believe that this revision will eradicate many of the inconsistencies relating to international research publications and communications as have been identified in recent years.

In the present edition, the species and subspecies classification sometimes differs from that which is seen in overseas check-lists. From the perspective of producing the Seventh Edition by revising the Sixth Edition with new findings, we have as a general

rule retained classifications from the Sixth Edition for species where taxonomic research results have not been published since that edition. There is much research yet to be done in order to improve the taxonomic system of Japanese birds.

A great number of new species and subspecies have been added to the present edition. These are basically species and subspecies that have been published in literature where it has been possible to confirm morphological and other distinguishing characteristics through the published documentary or photographic evidence. The large number of new accessions can be attributed in part to the spread of digital photography increasing the opportunities for taking photographs that stand up to scientific verification, but must also reflect the increased awareness of observers who actively publish these valuable records in printed matter. The newly added species include the Razorbill *Alca tarda*, the sole record of which was in 1833, which was discovered as a result of carefully examining literature from the past, so it can also be useful to double-check existing literature in order to ensure the thoroughness of the Check-list.

In the Sixth Edition, the policy was not to include the species in cases where subspecies identification of the observed individual was not possible, even if species-level identification was possible. However, such species have been included in the present edition in order to make clear the current level of ornithology and stimulate future research in areas where information is lacking.

The English species names in the Sixth Edition included names that internationally are not widely used. The present edition has adopted the English names prepared by the International Ornithological Congress (Gill, F. and D. Donsker 2012), using other English names only in exceptional cases where the names are deemed inappropriate due to differences in taxonomy. In addition, the English transliteration of Japanese species names and geographical names has in general adhered to the Hepburn system, although exceptions have been made for certain proper nouns that are in common use.

When writing entries regarding status, it was necessary to produce bird lists for each region. Regional bird lists were created by cooperative workers with expertise of the status of birds inhabiting the respective prefectures and island regions of Japan. It

would have been difficult to write the Check-list without this regional information, and I would like to express our heartfelt gratitude to all of those who cooperated. The distributional information was basically added to that of the Sixth Edition, except for instances of clearly reduced distribution. In cases where more than one subspecies occur in Japan and where localities with records of uncertain subspecies exist, the Committee has taken responsibility for determining the subspecies by logical inference through evaluating distributions of subspecies in the vicinity. However, entries of unidentified subspecies were made when it was difficult to reach a conclusion.

The following symbols were used to denote distribution and status. RB = resident breeder, MB = migrant breeder, IB = introduced breeder, CB = casual breeder, FB = former breeder, WV = winter visitor, PV = passage visitor, IV = irregular visitor, AV = accidental visitor. In Part B, symbols such as RB and CB are used instead of IB to show the actual status of the species besides being an introduced bird.

With this revision, the content of the Check-list of Japanese Birds has changed significantly from that of the Sixth Edition. This Check-list, which has incorporated the latest taxonomic research results and has included many new species and subspecies, is likely to strongly influence not only the world of ornithology but also society in general, through publications such as reference books and through administration, etc. I hope that the publication of The Seventh Revised Edition of the Check-list of Japanese Birds will provide an opportunity to further deepen the contributions to society through academic development of ornithology in Japan.

Norio YANAGISAWA, Chairperson
The Committee for Check-List of Japanese Birds
August 2012

Literature cited:

Gill, F. and D. Donsker 2012. IOC World Bird Names (v. 3.1). (<http://www.worldbirdnames.org>)
The Committee for Check-list of Japanese Birds 1997. List of Japanese Birds. Japanese Journal of Ornithology, 46: 59-91.

はじめに

日本鳥学会は 1912 年に創立され、2012 年はちょうど 100 周年にあたる。これを記念して、ここに日本鳥類目録改訂第 7 版を刊行することとなった。目録第 6 版は 2000 年に刊行されており、今回は 12 年ぶりの改訂である。第 7 版で対象とした地域は第 5 版、第 6 版と同じく、島嶼を含めた日本全土である。今回の改訂で特筆すべき点は、最近の分子系統学の発展を受け分類の大幅な見直しを行ったことと、新たに 100 余の種・亜種を追加したことである。

第 7 版の編集にあたって、まず 2007 年 3 月から 2008 年 3 月までの臨時委員会として、川路則友委員長を筆頭とした鳥類目録検討委員会が設置された。ここでは、第 7 版の出版に向けての方針・計画の検討が行われた。その後、第 7 版の編集実務を担当する期間限定の委員会として、2008 年 9 月 14 日に目録編集委員会が発足し、検討委員会での検討結果に基づくデータの収集、検討、執筆を開始した。本委員会は発足当初は 7 名の委員で構成されたが、2010 年に新たに 1 名の委員が加わった。また、分類に最新の研究内容を反映するため、2011 年にはさらに 11 名の委員を分類専門委員として迎えて編集を行った。

本目録では、国内で記録された種のリスト「Part A 日本鳥類目録」と国内で繁殖記録のある外来種のリスト「Part B 外来種・亜種」の 2 つのカテゴリーに整理して示した。Part A には 24 目、81 科、260 属、633 種を、Part B には 8 目、15 科、28 属、43 種を掲載した。Part A に掲載した種・亜種のうち、「最近 50 年以上国内で記録のない種・亜種」を Appendix A に一覧としてまとめた。一方、飼育個体の逸出か自然分布かが判定できない場合や、観察情報が不十分で種の同定のためにさらに調査が必要と判断される場合等は、目録本文への掲載を見送り、「Appendix B 検討中の種・亜種」としてまとめた。

現代的な生物の分類体系は、ふつう類縁関係に関する仮説に基づいて作られるため、あらたな研究の進展によって書き換えられるという性質を帯びる。一方、分類体系は行政、教育などの実務的な面においても準拠されるものなので、この観点からは安定が望ましく、新説に性急に飛びついた結果、分類が不必要に変動することは避けなければならない。分子系統学的手法を用いた分類学の

発展によってさまざまな成果が挙げられているなか、目録第 6 版では、「新しい分類システムが研究の過渡期にある」（日本鳥学会目録編集委員会，1997）との判断から、伝統的な分類による第 5 版からの変更を最小限にとどめて目・科・属・種の分類と配列を行ってきた。第 6 版の刊行後 12 年が経過し、分子系統学的手法がさらに精緻なものになり、その成果の蓄積も進んだ結果、手法や対象とする形質の異なった研究で結果が一致し、相当程度の合意が得られるようになってきたことから、今回の改訂ではこれらの成果を反映して分類と配列を一新することにした。その結果、従来の版とは目の配列や目を構成する科が大きく変更された。変更点については別途解説を加えて日本鳥学会誌に発表することを予定している。なお、高次分類の構築にあたっては Per Alström, Edward C. Dickinson の両氏にご助言いただいた。鳥類学のさかんな諸地域の目録ではすでにこういった成果を取り入れているものが多く、今回の改訂によって、近年指摘されてきた国際的な研究発表やコミュニケーションに関する齟齬も相当程度解消するものと信じている。

なお、種・亜種レベルの分類については、海外の目録と異なる扱いになっている場合もしばしばあるが、我々は、第 6 版をその後の新知見により改訂して第 7 版を作るという立場から、第 6 版以降に分類学的な研究成果が公刊されていない種については第 6 版での扱いを維持することを原則とした。今後、引き続きよりよい分類体系を作ってゆく努力が必要である。

第 7 版では多数の新規掲載種・亜種が追加されることになったが、これらは基本的に論文または写真により形態的特徴が確認可能な出版物に発表された種・亜種である。今回の改訂で新規掲載種が多数に上った背景には、デジタルカメラの普及により学術的な検討に耐える写真が撮影される機会が増えたことが挙げられるが、貴重な記録を積極的に発表するという観察者の意識の高まりを反映してもいるだろう。新規掲載種には、1833 年にのみ記録されたオオハシウミガラスも含まれているが、これは過去の文献を精査した結果見つかったものであり、目録の充実のためには既存文献の再確認も必要である。

第 6 版では、観察個体の種が同定できても亜種が判定できない場合には、掲載しない方針だった。これは一つの見識であるが、第 7 版では現在の鳥類学の

到達点を明確にし、不十分な点について今後の検討を促す目的でこのような種も掲載することとした。これに該当する種としては、ヒメモリバト、ミナミクイナ、オニカクコウ、オウチュウカクコウ、ヒマラヤアナツバメなど 28 種がある。

新規掲載種の和名は、原則として山階（1986）などの権威ある文献に掲載されているものや論文等により提唱されたものを採用することとした。極力既存の和名から選択するようにしたが、既存の和名がない、もしくは適当でないと判断した場合には新称を与えた。なお、和名は本来、目録本体に採用のさいに検討すべきものなので、「Appendix B 掲載検討中の種・亜種」に掲載している種の和名はすべてを妥当と判断したわけではない。

亜種の和名は、第 6 版のルールを踏襲し、(1)亜種のない種 (monotypic species) は、種の和名をもつ、(2)その種に二つ以上の亜種がある (polytypic species) 場合でも、日本にその種の一亜種だけが分布する場合は、種の和名と亜種の和名は同一である、(3)日本に 2 亜種以上が記録されている場合は、日本で繁殖する亜種 (2 亜種以上繁殖する場合は本州、特に本州中部以北の亜種)、もしくはいちばん普通な越冬亜種の和名は種の和名と同じとし、その他の亜種にそれぞれ別の亜種名を与える（その場合の亜種和名は、種の和名に形態的特徴か地域名を形容詞としてつける）などを原則とした。

第 6 版に掲載されていた種の英名には、国際的にあまり使用されていない名称も含まれていた。このため第 7 版では、原則として国際鳥類学会議の目録 (F. Gill and D. Donsker 2012) に掲載されている英名を使用することとし、分類学上の見解の相違からその英名が妥当でない場合などにかぎり例外的に別の英名を用いた。また、英文における和名および地名のローマ字表記は原則としてヘボン式に従ったが、通例として使用されている固有名詞については例外を認めた。

分布記録を執筆する上では、各地域における鳥類リストを作成する必要があった。そこで、それぞれの都道府県および島嶼地域の鳥類生息状況に精通した協力者に、地域別の鳥類リストを作成していただいた。これらの地域別の情報なくしては目録の執筆を行うことはむずかしく、協力者の皆様には心よりの感謝を申し上げたい。目録編集委員会では、協力者による各地の分布情報に基づ

いて、それぞれの種・亜種の生息域を検討した上でとりまとめを行った。生息域の記録は、確実に分布が縮小した場合を除いて、基本的に第 6 版に追加する方針とした。複数の亜種が国内で出現する種について、亜種が不明な記録については、周辺の亜種分布から合理的と考えられる亜種判定を委員会の責任の下に行った。ただし、判断が難しいものについては、亜種不明として掲載した。

分布と生息状況は次の記号で示した。RB = resident breeder, MB = migrant breeder, IB = introduced breeder, CB = casual breeder, FB = former breeder, WV = winter visitor, PV = passage visitor, IV = irregular visitor, AV = accidental visitor. なお、「Part B 外来種・亜種」では IB は用いずに、繁殖の具体的態様を示す RB などを用いた。

今回の改訂により、日本鳥類目録の内容は第 6 版から大きく変わった。分類学の最新の研究成果を取り入れ、多くの種・亜種を新規掲載したこの目録は、鳥類学の世界だけでなく、図鑑等の出版物や行政等を介して、一般の社会にも強い影響を与えることとなるだろう。目録第 7 版の出版が日本の鳥類学の学術的発展と、社会貢献の深化につながる契機となることを願っている。

2012 年 8 月吉日

日本鳥類目録編集委員会

委員長 柳澤紀夫

文献

Gill, F. and D. Donsker 2012. IOC World Bird Names (v. 3.1). (<http://www.worldbirdnames.org>)

日本鳥学会目録編集委員会 1997. 日本産鳥類リスト. 日本鳥学会誌, 46: 59-91.

山階芳麿 1986. 世界鳥類和名辞典. 大学書林, 東京.

Acknowledgments

This revision has been made possible by the cooperation of many people both from inside and outside of the Society. Per Alström and Edward C. Dickinson provided helpful comments regarding higher-level taxonomy.

The following people cooperated in collecting regional distribution records; Seiichi Abe, Hirohisa Akimoto, Yosuke Amano, Susumu Aoki, Chikao Asakawa, Haruhiko Asuka, Hayato Chiba, Yuka Chiba, Noboru Chikira, Jun Chishima, David Cooper, Hisayuki Daimon, Junichi Ebina, Hatsuo Eguchi, Naoko Emura, Tadashi Fujii, Yuzo Fujimaki, Masao Fukagawa, Norio Fukai, Atsunori Fukuda, Kazuo Fukuda, Yukio Fukumoto, Nobuo Fukushima, Ko Funabashi, Hideki Hainiwa, Tetsuichi Hamaguchi, Masahiko Hibino, Takashiro Higuchi, Hideyuki Hijikata, Kenji Hirano, Toshiaki Hirano, Haruo Horie, Masanobu Hotta, Susumu Ikeno, Mitsuo Imai, Tatsuya Imamori, Nobuyuki Inoue, Himaru Iozawa, Teruaki Ishii, Hideo Itami, Atsushi Iwata, Hiroyuki Kagawa, Manabu Kajita, Kayoko Kameda, Tatsuaki Kameya, Michiyuki Kanaya, Tadashi Kasai, Satoshi Katoh, Juntarou Kawabe, Hiroshi Kawachi, Norio Kawano, Hiroshi Kawase, Hiroshi Kimura, Kazunori Kimura, Keisuke Kiriara, Masashi Kiriara, Hiroki Kobayashi, Shigeki Kobayashi, Takeshi Kobune, Noritsugu Kojima, Masanori Komoto, Tomoyuki Komuro, Kenichiro Kondo, Toshio Konishi, Shinji Koyama, Hiroto Kuga, Katsumori Kugai, Kenichi Kusunoki, Kazuyuki Kuwabara, Takao Maeda, Kenji Maruyama, Shoji Masuda, Minako Matsumoto, Toshinobu Matsumoto, Nobuo Matsumura, Hiroshi Misawa, Akio Miya, Takashi Miyake, Keiko Miyamoto, Yasuo Miyazaki, Fumio Mizoguchi, Atsuko Mizuno, Shigeaki Mori, Teruaki Morioka, Eiko Mukai, Kunihiro Nakachi, Satoshi Nakamoto, Yutaka Nakamura, Takeshi Nishi, Yuji Nishimura, Tomoko Nitta, Tomohiko Nonaka, Masahiro Numano, Chieko Oishi, Tomio Okada, Toshihiro Okuno, Toshikazu Onishi, Yasuo Osawa, Yukitoshi Otsuka, Kazuhisa Oue, Yuji Ozaki, Yuki Ozaki, Shigeo Ozawa, Takashi Sadamitsu, Toshihide Sakamoto, Masahiko Sakanashi, Muneki Sakuyama, Sadao Sannohe, Yuji Sasahara, Takao Sasaki, Miyuki Sasuga, Naoya Sasuga, Hitoshi Sato, Kimio Sato, Masahiko Satô, Shigeo Sato, Shin-Ichi Seki, Kazuhiro Sekine, Hitoshi Sekishita, Fumiaki Shibaori, Hiroyuki Simizu, Tatsuya Shiozaki, Akihiko Shiraishi, Hiromu Sora, Seiji Sugano, Hisashi Sugawa, Satoshi Sugihara, Tokio Sugiyama, Ichiro Sunaga, Masaoki Takagi, Keise Takeda, Shin-ichi Takeda, Kenji Takehara,

Katsuro Takemaru, Masafumi Takeshita, Fujio Takigawa, Yoko Tanaka, Hideki Taniguchi, Ichiro Tazawa, Ken-ichi Tokita, Satoshi Tokorozaki, Hisahiro Torikai, Hideo Tsukamoto, Jun Ueda, Yasuo Ueki, Yoshio Ueno, Yoshiyuki Ueyama, Katsuyoshi Umada, Yusuke Umegaki, Daiki Uyama, Takeshi Wada, Manabu Wakayama, Yoshiki Watabe, Hisashi Watanabe, Kenzo Watanabe, Yasuo Watanabe, Fujio Yabata, Shinji Yabuki, Takahito Yamamoto, Yutaka Yamamoto, Toru Yamazaki, Shinpei Yata, Takeshi Yokobori, Toshirou Yoshioka, Koji Yotsuya, Teruhisa Yuasa (names listed in alphabetical order).

Tatsuaki Kameya provided a great deal of advice regarding the consideration of Japanese names. Desmond Allen gave suggestions concerning use of English. We turned to Yukiko Aoyama for assistance in compilation of distributional information, and Mari Kohri assisted in producing maps. We received great support from Yamashina Institute for Ornithology, which provided access to its library with literature that would otherwise have been difficult to obtain. Also, Yuzo Fujimaki, Chairperson of the Committee of Check-list of Japanese Birds for the Sixth Revised Edition, provided digital data of the Sixth Edition manuscript and responded most courteously to various inquiries.

In relation to the activities of the Committee, arrangements were made with great understanding by superiors at organizations with which the Committee members are affiliated. Prior to forming the Committee for Check-list of Japanese Birds for the Seventh Revised Edition, the Exploratory Committee for Check-list of Japanese Birds under Committee Chairperson Noritomo Kawaji studied the content to be revised in this edition of the Check-list.

Last but not least, tremendous support and encouragement was received from former President Hiroshi Nakamura and current President Yasuo Ezaki as well as everyone from the Society Council and Secretariat. We were also supported by countless members. The Committee hereby warmly thanks them all.

謝辞

改訂にあたり学会内外の多くの方々にご協力いただいた。分類の検討結果には、Per Alström, Edward C. Dickinson の両氏から有益なコメントをいただいた。

分布記録の収集については、下記の方々に協力いただいた。阿部誠一，秋本裕寿，天野洋祐，青木進，浅川千佳夫，明日香治彦，千葉勇人，千葉夕佳，千喜良登，千嶋淳，David Cooper，大門久之，蛭名純一，江口初男，栄村奈緒子，藤井忠志，藤巻裕蔵，深川正夫，深井宣男，福田篤徳，福田和夫，福本幸夫，福嶋信夫，船橋功，灰庭英樹，浜口哲一，日比野政彦，樋口孝城，土方秀行，平野賢次，平野敏明，堀江春生，堀田昌伸，池野進，今井光雄，今森達也，井上伸之，五百澤日丸，石井照昭，伊丹英生，岩田篤志，香川裕之，梶田学，亀田佳代子，亀谷辰朗，金谷道行，笠井正，加藤聡，川邊淳太郎，川内博，川野紀夫，川瀬浩，木村宏，木村壱典，桐原佳介，桐原政志，小林広喜，小林繁樹，小船武司，小島規嗣，光本正伯，小室智幸，近藤健一郎，小西敏雄，小山慎司，久我浩人，久貝勝盛，楠木憲一，桑原和之，前田崇雄，丸山健司，増田章二，松本美奈子，松本俊信，松村伸夫，三沢博志，宮彰男，三宅隆，宮本恵子，宮崎八州雄，溝口文男，水野敦子，森茂晃，森岡照明，向井榮子，仲地邦博，中本聡，中村豊，西剛，西村雄二，新田朋子，野中朋彦，沼野正博，大石智榮子，岡田登美男，奥野俊博，大西敏一，大沢八州男，大塚之稔，尾上和久，尾崎雄二，尾崎由起，小澤重雄，貞光隆志，阪本俊英，坂梨仁彦，作山宗樹，三戸貞夫，笹原裕二，佐々木隆夫，貴家美由紀，貴家尚哉，佐藤仁志，佐藤公生，佐藤雅彦，佐藤重穂，関伸一，関根一広，関下斉，柴折史昭，清水博之，塩崎達也，白石昭彦，曾良寛武，菅野聖二，須川恒，杉原敏，杉山時雄，須永伊知郎，高木昌興，武田恵世，竹田伸一，嵩原建二，竹丸勝朗，武下雅文，瀧川二士夫，田中葉子，谷口秀樹，田澤一郎，時田賢一，所崎聡，鳥飼久裕，塚本英夫，植田潤，上木泰男，上野吉雄，上山義之，馬田勝義，梅垣佑介，宇山大樹，和田岳，若山学，渡部良樹，渡辺央，渡辺健三，渡辺靖夫，谷畑藤男，矢吹慎二，山本貴仁，山本裕，山崎亨，矢田新平，横堀武，吉岡俊朗，四ツ家孝司，湯浅輝久。（敬称略，アルファベット順）

和名の検討には、亀谷辰朗氏から多大なご助言を得た。英語の用法などには、Desmond Allen 氏に助言いただいた。分布情報の整理、地図作成には、それぞれ青山夕貴子氏、郡真理氏に協力いただいた。山階鳥類研究所からは、貴重な文献資料の閲覧について、多大なご支援を受けた。第 6 版の編集委員長であった藤巻裕蔵氏には、第 6 版の電子データを提供いただいたほか、さまざまな問い合わせに丁寧にお答えいただいた。

目録編集委員会の活動には、各委員の所属機関長から理解ある取り計らいをいただいた。第 7 版の目録編集委員会の結成にさきだち、川路則友委員長以下の鳥類目録検討委員会では、改訂の内容について検討いただいた。

さらに末筆になったが、中村浩志前会長と江崎保男会長、そして学会の評議員会、事務局の皆さんには多大なご支援と激励をいただいた。また数多くの会員の皆さんからも激励を頂戴した。これらすべての皆様に厚く御礼申し上げる。

Contents

Part A	Check-list of Japanese Birds	日本鳥類目録	1
Galliformes		キジ目	1
Phasianidae		キジ科	1
Anseriformes		カモ目	6
Anatidae		カモ科	6
Podicipediformes		カイツブリ目	37
Podicipedidae		カイツブリ科	37
Phaethontiformes		ネッタイチョウ目	40
Phaethontidae		ネッタイチョウ科	40
Pterocliiformes		サケイ目	42
Pteroclididae		サケイ科	42
Columbiformes		ハト目	42
Columbidae		ハト科	42
Gaviiformes		アビ目	50
Gaviidae		アビ科	50
Procellariiformes		ミズナギドリ目	52
Diomedidae		アホウドリ科	52
Procellariidae		ミズナギドリ科	53
Hydrobatidae		ウミツバメ科	62
Ciconiiformes		コウノトリ目	65
Ciconiidae		コウノトリ科	65
Suliformes		カツオドリ目	67
Fregatidae		グンカンドリ科	67
Sulidae		カツオドリ科	68
Phalacrocoracidae		ウ科	70
Pelecaniformes		ペリカン目	73
Pelecanidae		ペリカン科	73
Ardeidae		サギ科	74
Threskiornithidae		トキ科	87
Gruiformes		ツル目	90
Gruidae		ツル科	90
Rallidae		クイナ科	94

Otidiformes	ノガン目	102
Otididae	ノガン科	102
Cuculiformes	カッコウ目	104
Cuculidae	カッコウ科	104
Caprimulgiformes	ヨタカ目	109
Caprimulgidae	ヨタカ科	109
Apodiformes	アマツバメ目	110
Apodidae	アマツバメ科	110
Charadriiformes	チドリ目	113
Charadriidae	チドリ科	113
Haematopodidae	ミヤコドリ科	122
Recurvirostridae	セイタカシギ科	123
Scolopacidae	シギ科	125
Jacanidae	レンカク科	156
Rostratulidae	タマシギ科	157
Turnicidae	ミフウズラ科	157
Glareolidae	ツバメチドリ科	158
Laridae	カモメ科	159
Stercorariidae	トウゾクカモメ科	182
Alcidae	ウミスズメ科	184
Accipitriformes	タカ目	191
Pandionidae	ミサゴ科	191
Accipitridae	タカ科	192
Strigiformes	フクロウ目	207
Tytonidae	メンフクロウ科	207
Strigidae	フクロウ科	207
Bucerotiformes	サイチョウ目	216
Upupidae	ヤツガシラ科	216
Coraciiformes	ブッポウソウ目	217
Alcedinidae	カワセミ科	217
Meropidae	ハチクイ科	222
Coraciidae	ブッポウソウ科	223
Piciformes	キツツキ目	224
Picidae	キツツキ科	224
Falconiformes	ハヤブサ目	233
Falconidae	ハヤブサ科	233

Passeriformes	スズメ目	239
Pittidae	ヤイロチョウ科	239
Artamidae	モリツバメ科	240
Campephagidae	サンショウクイ科	240
Oriolidae	コウライウグイス科	242
Dicruridae	オウチュウ科	243
Monarchidae	カササギヒタキ科	245
Laniidae	モズ科	247
Corvidae	カラス科	251
Regulidae	キクイタダキ科	259
Remizidae	ツリスガラ科	260
Paridae	シジュウカラ科	261
Panuridae	ヒゲガラ科	266
Alaudidae	ヒバリ科	267
Hirundinidae	ツバメ科	271
Pycnonotidae	ヒヨドリ科	276
Cettiidae	ウグイス科	279
Aegithalidae	エナガ科	282
Phylloscopidae	ムシクイ科	283
Sylviidae	ズグロムシクイ科	290
Zosteropidae	メジロ科	291
Locustellidae	センニュウ科	294
Acrocephalidae	ヨシキリ科	297
Cisticolidae	セッカ科	300
Bombycillidae	レンジャク科	301
Sittidae	ゴジュウカラ科	302
Certhiidae	キバシリ科	303
Troglodytidae	ミソサザイ科	304
Sturnidae	ムクドリ科	305
Cinclidae	カワガラス科	310
Muscicapidae	ヒタキ科	311
Prunellidae	イワヒバリ科	340
Passeridae	スズメ科	342
Motacillidae	セキレイ科	344
Fringillidae	アトリ科	355
Calcariidae	ツメナガホオジロ科	368
Parulidae	アメリカムシクイ科	370
Emberizidae	ホオジロ科	371

Part B	Introduced Species and Subspecies 外来種・亜種	386
Galliformes	キジ目	386
Phasianidae	キジ科	386
Anseriformes	カモ目	388
Anatidae	カモ科	388
Columbiformes	ハト目	389
Columbidae	ハト科	389
Ciconiiformes	コウノトリ目	390
Ciconiidae	コウノトリ科	390
Pelecaniformes	ペリカン目	391
Threskiornithidae	トキ科	391
Charadriiformes	チドリ目	391
Recurvirostridae	セイタカシギ科	391
Psittaciformes	インコ目	392
Psittacidae	インコ科	392
Passeriformes	スズメ目	394
Corvidae	カラス科	394
Zosteropidae	メジロ科	394
Timaliidae	チメドリ科	395
Sturnidae	ムクドリ科	396
Ploceidae	ハタオリドリ科	398
Estrildidae	カエデチョウ科	399
Viduidae	テンニンチョウ科	402
Thraupidae	フウキンチョウ科	402
Appendix A Species and Subspecies with no records over the last 50 years in Japan	最近 50 年以上国内で記録のない種・亜種	404
Appendix B Species and Subspecies Presently Unaccepted	検討中の種・亜種	406
Index	索引	409

Part A
Check-list of Japanese Birds
日本鳥類目録

Order GALLIFORMES キジ目

Family PHASIANIDAE キジ科

TETRASTES Keyserling & Blasius エゾライチョウ属

1. *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758) エゾライチョウ

Ezo-raicho Hazel Grouse

Range: Palearctic. Breeds from Europe east through forested Siberia to the Okhotsk coast, south to the Urals, Altai, Mongolia, Manchuria, Korea, Sakhalin, and Hokkaido.

1-1. *Tetrastes bonasia vicinitas* Riley, 1915 エゾライチョウ

Range: Resident in Hokkaido.

Status: Hokkaido (RB).

Habitat: Mixed and deciduous broad-leaved forests.

北海道 (RB).

おもに針広混交林, 落葉広葉樹林に生息する.

LAGOPUS Brisson ライチョウ属

2. *Lagopus muta* (Montin, 1781) ライチョウ

Raicho Rock Ptarmigan

Range: N Holarctic. Breeds in Iceland, Scotland, Scandinavia, and Siberia east to the Chukot Peninsula and Kamchatka, south to the Pyrenees, Alps, Altai, Mongolia, c Japan, and Kurile Is.; also Commander Is., Aleutian Is., Alaska, arctic Canada, and Greenland. Sedentary.

2-1. *Lagopus muta japonica* Clark, 1907 ライチョウ

Range: Breeds on high mountains in c Honshu. Sedentary but winters to lower elevations.

Status: C Honshu (RB: Niigata, Nagano, Toyama, Yamanashi, Gifu, Shizuoka, CB: Ishikawa). Unspecified records were in Iwate (1969) and Gunma (Oze).

Habitat: Alpine zone above the timber line.

本州中部 (RB: 新潟, 長野, 富山, 山梨, 岐阜, 静岡, CB: 石川). 岩手で 1969 年に, 群馬 (尾瀬) で過去に観察報告があるが, 詳細は不明. ハイマツ帯, 高山草原に生息する.

COTURNIX Garsault ウズラ属

3. *Coturnix japonica* Temminck & Schlegel, 1849 ウズラ

Uzura Japanese Quail

Range: E Palearctic. Breeds from n Mongolia and Transbaikalia to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Japan, south to Hopeh in e China. Migratory and sedentary, wintering to Myanmar, Assam, se Asia, s China, Korea, and Japan, occasionally Taiwan and Philippines.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I.), Honshu (RB: Miyagi, Niigata, Tochigi, Ibaraki. MB: Aomori, Akita, Nagano, Mie. CB: Yamagata. FB: Iwate, Gunma, Saitama. WV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (CB: Fukuoka. WV), Tsushima (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open country, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島), 本州 (RB: 宮城, 新潟, 栃木, 茨城. MB: 青森, 秋田, 長野, 三重. CB: 山形. FB: 岩手, 群馬, 埼玉. WV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (CB: 福岡. WV), 対馬 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 石垣島, 与那国島).

草原や農耕地に生息する.

SYRMATICUS Wagler ヤマドリ属

4. *Syrmaticus soemmerringii* (Temminck, 1830) ヤマドリ

Yamadori Copper Pheasant

Range: E Palearctic. Endemic to Japan. Sedentary.

4-1. *Syrmaticus soemmerringii scintillans* (Gould, 1866) ヤマドリ

Range: Resident in n and w Honshu.

Status: Hokkaido (IB), Honshu (RB: north of 35° 20' N, n Shimane, n Hyogo).

Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests.

北海道 (IB), 本州 (RB: 35° 20' N, 島根北部, 兵庫北部以北). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

森林に生息する.

4-2. *Syrmaticus soemmerringii subrufus* (Kuroda, 1919) ウスアカヤマドリ

Range: Resident on the Pacific side of Honshu and Shikoku.

Status: Hokkaido (IB), Honshu (RB: south of 35° 20' N, Chiba, Shizuoka, Mie, Wakayama, Yamaguchi), Sado (IB), Shikoku (RB: s Ehime). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests.

北海道 (IB), 本州 (RB: 35° 20' N 以南の太平洋側, 千葉, 静岡, 三重, 和歌山, 山口), 佐渡 (IB), 四国 (RB: 愛媛南部). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

森林に生息する.

4-3. *Syrmaticus soemmerringii intermedius* (Kuroda, 1919) シコクヤマドリ

Range: Resident in sw Honshu and Shikoku.

Status: Sw Honshu (RB: s Hyogo, Tottori, s Shimane, Okayama, Hiroshima, e Yamaguchi), Shikoku (RB: Kagawa, Tokushima, Kochi). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests.

本州南西部 (RB: 兵庫南部, 鳥取, 島根南部, 岡山, 広島, 山口東部), 四国 (RB: 香川, 徳島, 高知). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

森林に生息する.

4-4. *Syrmaticus soemmerringii soemmerringii* (Temminck, 1830) アカヤマドリ

Range: Resident in n and c Kyushu.

Status: N and c Kyushu (RB: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, n Kumamoto, n Miyazaki). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests.

九州北・中部 (RB: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本北部, 宮崎北部). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

森林に生息する.

4-5. *Syrmaticus soemmerringii ijimae* (Dresser, 1902) コシジロヤマドリ

Range: Resident in c and s Kyushu.

Status: C and s Kyushu (RB: s Kumamoto, s Miyazaki, Kagoshima). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests.

九州中・南部 (RB: 熊本南部, 宮崎南部, 鹿児島). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

森林に生息する.

PHASIANUS Linnaeus キジ属

5. *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 キジ

Kiji Common Pheasant

Range: C and e Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from the Caucasus to Turkestan, Mongolia, Amur Basin, Ussuriland, Korea, and Japan, south to n Vietnam, s China, and Taiwan. Introduced in Europe, North America, Hawaii, Japan (Hokkaido, Tsushima), and New Zealand. Sedentary.

5-1. *Phasianus colchicus robustipes* Kuroda, 1919 キジ

Range: Resident in n Honshu and Sado.

Status: N Honshu (RB), Sado (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

本州北部 (RB), 佐渡 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

林縁部，草原，農耕地に生息する．

5-2. *Phasianus colchicus tohkaidi* Momiyama, 1922 トウカイキジ

Range: Resident in c and w Honshu and Shikoku.

Status: C Honshu (RB), Shikoku (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Open woodland, cultivated fields.

本州中部 (RB), 四国 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため，検討が必要である．

林縁部，草原，農耕地に生息する．

5-3. *Phasianus colchicus tanensis* Kuroda, 1919 シマキジ

Range: Resident in the Pacific coast of c Honshu, Izu Is., Yakushima I., and Tanegashima I.

Status: Honshu (RB: Izu, Miura and Kii Peninsulas), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB: Oshima I. FB: Niiijima I.). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

本州 (RB: 伊豆半島, 三浦半島, 紀伊半島), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島. FB: 新島). 本亜種の分布域は明確ではないため，検討が必要である．

林縁部，草原，農耕地に生息する．

5-4. *Phasianus colchicus versicolor* Vieillot, 1825 キュウシュウキジ

Range: Resident in sw Honshu, Kyushu, and Goto Is.

Status: Sw Honshu (RB), Kyushu (RB), Goto Is. (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

本州南西部 (RB), 九州 (RB), 五島列島 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため，検討が必要である．

林縁部，草原，農耕地に生息する．

Order ANSERIFORMES カモ目

Family ANATIDAE カモ科

DENDROCYGNA Swainson リュウキュウガモ属

6. *Dendrocygna javanica* (Horsfield, 1821) リュウキュウガモ

Ryukyu-gamo Lesser Whistling Duck

Range: Indomalayan. Breeds in tropical Asia from India to Java, north to s China and s Japan (Ryukyu Is.). Mainly sedentary.

Status: Ryukyu Is. (FB: Okinawajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I.). Record in Aichi (6th ed.) was removed because of suspicion of escaped bird. No reliable records over the last 50 years.

Habitat: Marshes, freshwater pools, flooded rice fields, mangroves.

琉球諸島 (FB: 沖縄島, 石垣島, 西表島, 黒島). 目録6版では愛知での記録を掲載しているが, 飼育個体の逸出の可能性があるため削除した. 最近50年間以上, 確実な国内記録がない.

湿地, 水田, マングローブ林などに生息する.

ANSER Brisson マガン属

7. *Anser cygnoides* (Linnaeus, 1758) サカツラガン

Sakatsura-gan Swan Goose

Range: C and e Palearctic. Breeds from the Altai east through Mongolia and Transbaikalia to the Amur Basin and Ussuriland; formerly has bred in Kamchatka, Commander Is., Okhotsk coast, and Sakhalin. Winters to China and Japan (now very rare). Recorded from the Kurile Is., Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV: Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Fukushima, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Aichi, Ishikawa, Gifu, Shiga, Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (IV), Oki (IV), Shikoku (IV: Tokushima, Ehime), Kyushu (IV: Fukuoka, Oita, Saga, Nagasaki, Kagoshima), Yakushima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ikemajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Inland lakes, marshes, tidal flats, rice fields.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (IV: 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 福島,

群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 愛知, 石川, 岐阜, 滋賀, 京都, 兵庫, 鳥取, 島根, 広島, 山口), 佐渡 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV: 徳島, 愛媛), 九州 (IV: 福岡, 大分, 佐賀, 長崎, 鹿児島), 屋久島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 池間島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

湖沼, 湿原, 河川, 水田などに生息する. 1950 年までは東京湾に定期的に渡来していた.

8. *Anser fabalis* (Latham, 1787) ヒシクイ

Hishikui Bean Goose

Range: N Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to Anadyrland, south to the Altai, Mongolia, and Amur Basin. Winters to temperate regions.

8-1. *Anser fabalis middendorffii* Severtzov, 1873 オオヒシクイ

Range: Breeds in the wooded regions of e Siberia and Russian Far East from the Khatanga to the Kolyma River and Anadyrland, south to the s Altai, nw Mongolia, Lake Baikal region, and n Amur Basin. Winters to China and Japan. Recorded from Sakhalin and Korea.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV: Aomori. WV: Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Ishikawa, Fukui, Shiga, Okayama, Shimane. IV: Tochigi, Gunma, Nagano, Chiba, Kanagawa, Gifu), Sado (IV), Tsushima (PV), Shikoku (IV: Kagawa, Kochi), Kyushu (IV: Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV), Taramajima I. (AV), Iriomotejima I., Yonagunijima I. (AV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Inland lakes, marshes, rivers, rice fields.

北海道 (PV), 本州 (PV: 青森. WV: 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 石川, 福井, 滋賀, 岡山, 島根. IV: 栃木, 群馬, 長野, 千葉, 神奈川, 岐阜), 佐渡 (IV), 対馬 (PV), 四国 (IV: 香川, 高知), 九州 (IV: 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV), 多良間島 (AV), 西表島, 与那国島 (AV), 南大東島 (AV).

湖沼, 湿原, 河川, 水田に生息.

8-2. *Anser fabalis curtus* Lönnberg, 1923 ヒメヒシクイ

Range: Rare and breeding range little known; breeds probably from Novaya Zemlya to the Taimyr Peninsula. Winter range also poorly known.

Status: Honshu (AV: Niigata, Mar. 2003), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I.).

本州 (AV: 新潟, 2003 年 3 月), 小笠原群島 (AV: 聳島).

8-3. *Anser fabalis serrirostris* Swinhoe, 1871 ヒシクイ

Range: Breeds in e Siberian and Russian Far East tundras from the Khatanga to Anadyrland and Koryakland. Winters to China, Korea, and Japan. Recorded from the Kurile Is., Sakhalin, and Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV, IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Iki (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ikemajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland and saltwater lakes, marshes, rivers, rice fields, sea shores.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV, IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (IV), 壱岐 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 座間味島, 宮古島, 池間島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

湖沼, 湿原, 河川, 水田, 海岸に生息する.

9. *Anser anser* (Linnaeus, 1758) ハイイロガン

Haiiro-gan Greylag Goose

Range: Palearctic. Breeds in Iceland, British Isles, Scandinavia, and e Europe east across cold-temperate Eurasia to the Amur Basin, south to Iran. Winters to s Europe, n Africa, India, and s China.

9-1. *Anser anser rubrirostris* Swinhoe, 1871 ハイイロガン

Range: Breeds in Siberia south to the Caspian Sea and east to w China, n Mongolia, and Amur Basin. Winters to Asia Minor, India, Myanmar, n Indochina, and s China.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Saitama, Chiba, Niigata, Ishikawa, Fukui, Nagano, Yamanashi, Aichi, Shiga, Tottori, Shimane), Sado (AV), Shikoku (AV: Kagawa), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tokara Is. (AV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Irabujima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers, marshes, rice fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 埼玉, 千葉, 新潟, 石川, 福井, 長野, 山梨, 愛知, 滋賀, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 香川), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米

島, 伊良部島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).
水田, 湖沼, 河川に生息する.

10. *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) マガン

Ma-gan Greater White-fronted Goose

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in arctic tundras of n Eurasia and North America from Siberia to Alaska, Canada, and w Greenland. Winters to Europe, Iraq, s Caspian region, China, Korea, and Japan; also s US and Mexico.

10-1. *Anser albifrons albifrons* (Scopoli, 1769) マガン

Range: Breeds in n Eurasia from the Kanin Peninsula east to Anadyrland. Winters to Europe, Iraq, s Caspian region, China, Korea, and Japan. Recorded from Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV: Aomori, Akita. WV. IV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Iki (IV), Goto Is. (IV), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (IV: Akusekijima I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland marshes, lakes, rivers, rice fields, tidal flats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV: 青森, 秋田. WV. IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (IV), 壱岐 (IV), 五島列島 (IV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (IV: 悪石島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

湿原, 湖沼, 河川, 水田, 干潟に生息する.

11. *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) カリガネ

Karigane Lesser White-fronted Goose

Range: N Palearctic. Breeds in arctic tundras from n Scandinavia through Siberia to Anadyrland. Winters to se Europe, Black Sea, Caspian Sea, n India, and China. Recorded from the Kurile Is., Sakhalin, Korea, Taiwan, and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Toyama, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Fukui, Mie, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (AV), Tsushima (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kagoshima), Goto Is. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Amami-Oshima

I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Iriomotejima I. (AV).

Habitat: Inland lakes, marshes, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 富山, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 三重, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV), 対馬 (AV), 四国 (AV: 香川, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 鹿児島), 五島列島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 西表島 (AV). 湖沼, 湿原, 水田などに生息し, しばしばマガン群中に見られる.

12. *Anser indicus* (Latham, 1790) インドガン

Indo-gan Bar-headed Goose

Range: Palearctic. Breeds discontinuously in c Asia, mainly Mongolia and China. Winters to Pakistan, India, n Myanmar and s China.

Status: Honshu (AV: Chiba, Nagano), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Feb. - Apr. 1986), Taramajima I. (AV: Oct. 2006), etc.

本州 (AV: 千葉, 長野), 小笠原群島 (AV: 父島 1986 年 2 - 4 月), 多良間島 (AV: 2006 年 10 月) 等.

13. *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) ハクガン

Haku-gan Snow Goose

Range: N Nearctic, marginally Palearctic. Breeds in arctic North America, nw Greenland, and ne Siberia. Winters to the s US, and Mexico, occasionally Japan and Europe.

13-1. *Anser caerulescens caerulescens* (Linnaeus, 1758) ハクガン

Range: Breeds in ne Siberia east of the Indigirka River, n coast of Alaska, and Canadian arctic tundra. Winters south to California, Arizona, Texas, and n Mexico, rarely Japan.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Yamagata, Miyagi, Akita, Fukushima, Tochigi, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Ishikawa, Fukui, Nagano, Shiga, Shimane), Sado (AV), Kyushu (AV: Nagasaki, Miyazaki).

Habitat: Inland lakes, marshes, rivers, rice fields, bay coasts.

北海道 (PV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 山形, 宮城, 秋田, 福島, 栃木, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 新潟, 石川, 福井, 長野, 滋賀, 島根), 佐渡 (AV), 九州 (AV: 長崎, 宮崎). 明治初期には東京湾に大群で渡来していた.

湖沼, 湿原, 河川, 水田などに生息する.

13-2. *Anser caerulescens atlanticus* (Kennard, 1927) オオハクガン

Range: Breeds in islands in n Canada and nw Greenland. Winters to e US.

Status: Hokkaido (AV: Mar. 1994, etc.).

北海道 (AV: 1994 年 3 月等).

14. *Anser canagicus* (Sevastianov, 1802) ミカドガン

Mikado-gan Emperor Goose

Range: N Pacific. Breeds on the arctic Bering Sea coasts in Russian Far East and nw Alaska; also St. Lawrence I. Winters to the Aleutian Is., accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Nov. 1964 - Feb. 1965).

本州 (AV: 宮城, 1964 年 11 月 - 1965 年 2 月). 1 例の記録がある.

BRANTA Scopoli コクガン属

15. *Branta hutchinsii* (Richardson, 1832) シジュウカラガン

Shijukara-gan Cackling Goose

Range: Nearctic, locally Palearctic. Breeds in Canada and Alaska, west to the Aleutian Is., formerly Commander Is., and n Kurile Is. Winters to temperate regions, south to the coasts of the Gulf of Mexico and n Mexico; casual from ne Siberia to Japan and recorded from Hawaiian Is.

15-1. *Branta hutchinsii leucopareia* (Brandt, 1836) シジュウカラガン

Range: Breeds in the Aleutian Is., Commander Is. (until about 1900), and n Kurile Is. (formerly on Ushishir and Ekarma I.). Winters to the Pacific coast of North America from British Columbia to California and Japan (rare).

Status: Hokkaido (IV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Ishikawa, Hyogo, Shimane), Kyushu (AV: Nagasaki).

Habitat: Freshwater marshes, lakes, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 福島, 群馬, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 山梨, 石川, 兵庫, 島根), 九州 (AV: 長崎).

水田, 湿地, 湖沼に生息する.

15-2. *Branta hutchinsii minima* Ridgway, 1885 ヒメシジュウカラガン

Range: Breeds on the Alaskan coasts from the Mackenzie Delta to Bristol Bay and Alaskan Peninsula. Winters from s British Columbia to California; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata, Miyagi, Oct. 1979 - Mar. 1980, Niigata, Nov. 2001, Chiba, Feb. 2007, Kanagawa, 1894, Ishikawa, Jan. 2003, Shiga, Dec. 2002, Jan. 2003, Tottori, Oct. 1994, Shimane, Nov. 1994, Oct. 2006).

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形, 宮城, 1979 年 10 月 - 1980 年 3 月, 新潟, 2001 年 11 月, 千葉, 2007 年 2 月, 神奈川, 1894 年, 石川, 2003 年 1 月, 滋賀, 2002 年 12 月, 2003 年 1 月, 鳥取, 1994 年 10 月, 島根, 1994 年 11 月, 2006 年 10 月).

16. *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) コクガン

Koku-gan Brant Goose

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in arctic tundras from n Scandinavia and coastal Siberia to n Alaska, arctic Canada, and Greenland. Winters to Europe, China, Korea, Japan, and coasts of North America.

16-1. *Branta bernicla orientalis* Tugarinov, 1941 コクガン

Range: Breeds in arctic tundras from e Siberia to w Canada. Winters to Japan, n China, Korea, and w North America.

Status: Hokkaido (PV, WV), s Kurile Is. (PV), n Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (AV), c and sw Honshu (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Izu Is. (AV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Shallow bays, coasts, salt-water lakes, rarely inland lakes.

北海道 (PV, WV), 南千島 (PV), 本州北部 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (AV), 本州中・南西部 (IV), 見島 (AV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 与那国島), 南大東島 (AV).

海岸, 汽水湖に生息する.

CYGNUS Garsault ハクチョウ属

17. *Cygnus olor* (Gmelin, 1789) コブハクチョウ

Kobu-hakucho Mute Swan

Range: Palearctic. Breeds discontinuously from the British Isles, and c Europe to the Black Sea, Asia Minor, Caspian Sea, c Siberia, Mongolia, and nw China. Winters in Europe, Black Sea, nw India, s China, and Korea. Recorded from Taiwan and Japan. Introduced to North America, South Africa, Australia, New Zealand, and Japan.

Status: Hokkaido (IB), Honshu (IB: Aomori, Gunma, Ibaraki, Tokyo, Ishikawa, Osaka, Kyoto, Tottori, Shimane. WV, introduced birds), Sado (IB), Shikoku (IB: Kagawa), Kyushu (IB: Nagasaki, Miyazaki), Izu Is. (AV: Hachijojima I., Nov. 1933). No records of wild races over the last 50 years.

Habitat: Freshwater lakes, marshes, large rivers.

北海道 (IB), 本州 (IB: 青森, 群馬, 茨城, 東京, 石川, 大阪, 京都, 鳥取, 島根, WV: 野生化個体), 佐渡 (IB), 四国 (IB: 香川), 九州 (IB: 長崎, 宮崎), 伊豆諸島 (AV: 八丈島, 1933 年 11 月). 最近 50 年間以上, 確実な国内野生記録がない.

湖沼, 河川に生息する.

18. *Cygnus buccinator* Richardson, 1831 ナキハクチョウ

Naki-hakucho Trumpeter Swan

Range: Nearctic. Breeds in c Alaska, w Canada, and nw US. Winters to the Pacific coasts of s Alaska and Canada; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Iwate, Dec. 1991, Mar. - Apr. 1992, Dec. 1992 - Jan. 1993, Miyagi, Dec. 1991, Dec. 1992, Dec. 2009, Ishikawa, Feb. - Mar. 2009, Shimane, 2008).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 岩手, 1991 年 12 月, 1992 年 3 - 4 月, 1992 年 12 月 - 1993 年 1 月, 宮城, 1991 年 12 月, 1992 年 12 月, 2009 年 12 月, 石川, 2009 年 2 - 3 月, 島根, 2008 年).

19. *Cygnus columbianus* (Ord, 1815) コハクチョウ

Ko-hakucho Tundra Swan

Range: N Holarctic. Breeds on the arctic coasts of Eurasia and North America. Winters in temperate regions south to s Europe, c Asia, c China, and s US.

19-1. *Cygnus columbianus jankowskyi* Alphéraky, 1904 コハクチョウ

Range: Breeds in arctic e Siberia from the Lena River to Anadyrland. Winters in China, Korea, and Japan, occasionally south to Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Sado (IV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Izu Is. (AV: Niijima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Okinoerabujima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Miyakojima I., Kohamajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I.).

Habitat: Freshwater lakes, marshes, rivers, bays, rice fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV: 新島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 沖永良部島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 宮古島, 小浜島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島).

湖沼, 河川, 水田, 湾内の海岸などに生息する.

19-2. *Cygnus columbianus columbianus* (Ord, 1815) アメリカコハクチョウ

Range: Breeds in arctic Alaska and Canada. Recently expanded into ne Siberia and hybridized with *C. c. jankowskyi*. Winters south to c California, Utah, Chesapeake Bay, and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Miyagi, Akita, Yamagata, Niigata, Fukushima, Tochigi, Gunma, Nagano, Toyama, Ibaraki, Chiba, Saitama, Shizuoka, Ishikawa, Shiga, Tottori, Shimane), Shikoku (AV: Tokushima).

Habitat: Fresh and saltwater lakes, bays, large rivers, marshes, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 宮城, 秋田, 山形, 新潟, 福島, 栃木, 群馬, 長野, 富山, 茨城, 千葉, 埼玉, 静岡, 石川, 滋賀, 鳥取, 島根), 四国 (AV: 徳島).

コハクチョウ *C. c. jankowskyi* に混じって, 湖沼, 河川, 水田, 湾内の海岸などに生息する.

20. *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) オオハクチョウ

O-hakucho Whooper Swan

Range: Palearctic. Breeds from Iceland and Scandinavia east across Siberia to Kamchatka and Sakhalin, south to the Kirghiz Steppes, n Mongolia, and Amur Basin. Winters in the British Isles, Europe, Black Sea, Caspian Sea, China, Korea, and Japan. Recorded from the Kurile Is. and Taiwan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (PV), n Honshu (WV), c and sw Honshu (WV: IV), Sado (IV), Awashima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (AV), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Goto Is. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Ikemajima I., Ishigakijima I., Kohamajima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Fresh- and saltwater lakes, bays, large rivers, marshes, rice fields.

北海道 (WV), 南千島 (PV), 本州北部 (WV), 本州中・南西部 (WV: IV), 佐渡 (IV), 粟島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (AV), 九州 (IV), 対馬 (AV), 五島列島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 池間島, 石垣島, 小浜島, 与那国島).

湖沼, 河川, 水田, 湾内の海岸などに生息する.

TADORNA Boie ツクシガモ属

21. *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) ツクシガモ

Tsukushi-gamo Common Shelduck

Range: Palearctic. Breeds in the British Isles, Scandinavia, s Europe and discontinuously from the Balkans east across c Eurasia to Mongolia and n China. Winters to sw Europe, n Africa, Asia Minor, India, s China, and Japan. Recorded from Korea and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), n and c Honshu (IV), sw Honshu (WV), Tsushima (AV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (WV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, IV: Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ikemajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Muddy estuaries, tidal flats, freshwater marshes, lakes, rivers.

北海道 (IV), 本州北・中部 (IV), 本州南西部 (WV), 対馬 (AV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (WV: 福岡, 佐賀, 長崎, IV: 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 池間島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

河口部, 干潟, 湖沼などに生息する.

22. *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) アカツクシガモ

Aka-tsukushi-gamo Ruddy Shelduck

Range: Palearctic. Breeds in s Spain, nw Africa, Balkans, and Asia Minor east to s Russia, Altai, Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, and Manchuria. Winters to n Africa, India, s China, and Korea, occasionally Japan.

Status: Hokkaido (AV), Rishirito I. (AV), Honshu (AV), Sado (AV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Goto Is. (IV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland and coastal marshes, tidal flats, lakes, rivers, rice fields.

北海道 (AV), 利尻島 (AV), 本州 (AV), 佐渡 (AV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (AV), 五島列島 (IV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

湖沼, 河川, 干潟, 広い水田などに生息する.

23. *Tadorna cristata* (Kuroda, 1917) カンムリツクシガモ

Kammuri-tsukushi-gamo Crested Shelduck

Range: E Palearctic. Breeds probably in Ussuriland, e China, and Korea. Rare with only three specimen records from Vladivostok, Busan, and Kum River and several sight records in the Rimskii-Korsakov Is., sw of Vladivostok.

Status: Hokkaido (AV: Hakodate, Oct. 1822). No reliable records over the last 50 years.

北海道 (AV: 函館). 1822 年 10 月函館市亀田で捕獲された雌雄の写生画にもとづく. 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

AIX Boie オシドリ属

24. *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758) オシドリ

Oshidori Mandarin Duck

Range: E Palearctic. Breeds from e China to Manchuria, Amur Basin, Ussuriland, Korea, Sakhalin, and Japan. Winters south to s China and Taiwan. Mainly sedentary, but may migrate for short distance. Introduced in England.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (RB, MB), c and sw Honshu (WV, RB), Sado (RB), Oki (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV, RB: Kagawa, Tokushima), Kyushu (WV, RB: Fukuoka), Tsushima (RB), Iki (IV), Goto Is. (IV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Miyake-

jima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (CB: Amami-Oshima I. WV: Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I. WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Wooded lakes, mountain streams, ponds in city parks. Breeds in broad-leaved forests near mountain streams, lake sides.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (RB. MB), 本州中・南西部 (WV. RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (IV), 見島 (AV), 四国 (WV. RB: 香川, 徳島), 九州 (WV. RB: 福岡), 対馬 (RB), 壱岐 (IV), 五島列島 (IV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (CB: 奄美大島. WV: 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島. WV: 沖縄島, 伊平屋島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

森林で囲まれた湖沼, 溪流, 都市内の公園などに生息する. 平地から山地にかけての森林で繁殖する.

NETTAPUS Brandt ナンキンオシ属

25. *Nettapus coromandelianus* (Gmelin, 1789) ナンキンオシ

Nankin-oshi Cotton Pygmy Goose

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from India through se Asia to s China and Australia. Mainly sedentary, but northern birds winter southward.

25-1. *Nettapus coromandelianus coromandelianus* (Gmelin, 1789) ナンキンオシ

Range: Breeds from India through se Asia to s China. Mainly sedentary, but northern birds winter southward. Accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Osaka, Jun. 2010), Taramajima I. (AV: Jun. 2010), Yonagunijima I. (AV: Mar. 1972).

本州 (AV: 大阪, 2010 年 6 月), 多良間島 (AV: 2010 年 6 月), 与那国島 (AV: 1972 年 3 月).

ANAS Linnaeus マガモ属

26. *Anas strepera* Linnaeus, 1758 オカヨシガモ

Oka-yoshi-gamo Gadwall

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, Europe, Siberia to Kamchatka, and Sakhalin, south to the Caspian Sea and n Japan; also North America from Alaska to the c US. Winters to n Africa, Iran, India, s China, Korea, Japan, and s North America. Also recorded from the Fanning Group in the Pacific (where it became extinct).

26-1. *Anas strepera strepera* Linnaeus, 1758 オカヨシガモ

Range: Range of the species except the Fanning Group.

Status: Hokkaido (PV, MB), s Kurile Is. (IV), Honshu (WV. CB: Tokyo, Chiba), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Iki (IV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Hahajima I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Iheyajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland marshes, rivers, lakes, sea coasts.

北海道 (PV, MB), 南千島 (IV), 本州 (WV. CB: 東京, 千葉), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 壱岐 (IV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 母島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 伊平屋島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川などに生息する.

27. *Anas falcata* Georgi, 1775 ヨシガモ

Yoshi-gamo Falcated Duck

Range: E Palearctic. Breeds in se Siberia from the Enisei River to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to Ussuriland, n China, Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido. Winters in se China, Korea, and Japan, south to n Vietnam; casual in Europe and North America.

Status: Hokkaido (PV. Locally MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (IV), Goto Is. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland marshes, lakes, sea coasts.

北海道 (PV, 一部 MB), 南千島 (MB), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (IV), 五島列島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

湖沼, 河川, 海岸に生息する.

28. *Anas penelope* Linnaeus, 1758 ヒドリガモ

Hidori-gamo Eurasian Wigeon

Range: N Palearctic. Breeds in n Eurasia from Iceland, Scandinavia, and Siberia east to Kamchatka. Winters to warmer regions of Eurasia south to s Europe, n Africa, Caspian Sea, India, s China, and Japan. Recorded from Sakhalin, Kurile Is., Taiwan, and North America.

Status: Hokkaido (PV, WV), s Kurile Is. (PV, WV), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (WV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Iheyajima I., Izenajima I., Kohamajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland and saltwater lakes, marshes, rivers, rice fields, sea shores.

北海道 (PV, WV), 南千島 (PV, WV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島), 硫黄列島 (WV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊平屋島, 伊是名島, 小浜島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川, 海岸などに生息する.

29. *Anas americana* Gmelin, 1789 アメリカヒドリ

Amerika-hidori American Wigeon

Range: Nearctic. Breeds in Alaska, Canada and northern US. Winters to Cali-

fornia, Middle America, West Indies, and Hawaiian Is.; occasionally in Japan.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (IV), Sado (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers, sea shores.

北海道 (PV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 小笠原群島 (AV: 父島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島).

湖沼, 河川, 海岸などに生息する.

30. *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 マガモ

Ma-gamo Mallard

Range: Holarctic. Breeds in Eurasia from w Europe to Kamchatka and Japan, south to the Mediterranean region, Asia Minor, Afghanistan, Tibet, and n China; also North America south to the US and Mexico. Northern birds migratory, wintering to temperate and subtropical regions south to n Africa, c India, s China, s US, and n Mexico.

30-1. *Anas platyrhynchos platyrhynchos* Linnaeus, 1758 マガモ

Range: Range of the species except Greenland, se US, and Mexico.

Status: Hokkaido (RB, PV), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB: Iwate, Tochigi, Nagano, Yamanashi, Shiga, Kyoto, Yamaguchi. CB: Yamagata. WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (RB: Fukuoka, Nagasaki. WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (RB).

Habitat: Wet rice fields, marshes, ponds, rivers, lakes, also seaside. Breeds in northern and high altitude lakes, marshes.

北海道 (RB, PV), 南千島 (MB), 本州 (RB: 岩手, 栃木, 長野, 山梨, 滋賀, 京都, 山口. CB: 山形. WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (RB: 福岡, 長崎. WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (RB).

北日本の平野または山地の湖沼や湿原に繁殖し, 冬には湖沼, 河川, 水田, 海上に生息する.

31. *Anas luzonica* Fraser, 1839 アカノドカルガモ

Akanodo-karugamo Philippine Duck

Range: E Indomalayan. Endemic to Philippines; accidental in Ryukyu Is.
 Status: Yonagunijima I. (AV: Mar. 1987, Apr. 2005).
 与那国 (AV: 1987 年 3 月, 2005 年 4 月).

32. *Anas zonorhyncha* Swinhoe, 1866 カルガモ

Karu-gamo Eastern Spot-billed Duck

Range: E Asiatic. Breeds from Transbaikalia to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, s Sakhalin, and Japan, south to s and w China. Migratory and sedentary, wintering to s China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I. WV), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Izenajima I., Ikemajima I., WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Inland lakes, rivers, marshes, seacoast, rice fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 択捉島, 国後島, 色丹島), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島. WV), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊是名島, 池間島. WV), 大東諸島 (IV).

湖沼, 河川. 水田などに生息する.

33. *Anas discors* Linnaeus, 1766 ミカヅキシマアジ

Mikazuki-shimaaji Blue-winged Teal

Range: Nearctic. Breeds from s Alaska to c US. Winters southward to Middle and South Americas; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Gifu, Jan. 1996).

本州 (AV: 岐阜, 1996 年 1 月).

34. *Anas clypeata* Linnaeus, 1758 ハシビロガモ

Hashibiro-gamo Northern Shoveler

Range: Holarctic. Breeds from the British Isles, nw Europe and Siberia to Kamchatka, south to the Caspian Sea, Mongolia, Amur Basin, and Sakhalin; also North America from Alaska to California and North Carolina. Winters south to

s Europe, n Africa, India, s China, Japan, Philippines, and Americas to the s US, Middle America, and West Indies.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Sado (WV), Higurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Izenajima I., Akashima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers, sea shores.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊是名島, 阿嘉島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川, 海岸などに生息する.

35. *Anas acuta* Linnaeus, 1758 オナガガモ

Onaga-gamo Northern Pintail

Range: Holarctic. Breeds from Iceland, Europe and Siberia to Kamchatka, south to Spain, Turkestan, Iran, Amur Basin, and Sakhalin; also North America. Winters to n Africa, India, Sri Lanka, Myanmar, s China, Japan, Philippines, and North and Middle America, West Indies and Hawaiian Is.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Sado (WV), Higurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Iki (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I., Mukojima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Iheyajima I., Izenajima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.,

Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers, marshes, sea shores.

北海道 (WV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 壱岐 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島, 聳島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊平屋島, 伊是名島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川, 海岸などに生息する.

36. *Anas querquedula* Linnaeus, 1758 シマアジ

Shimaaji Garganey

Range: Palearctic. Breeds from Europe east across s Russia and c Asia to n China, Sakhalin, and Kamchatka south to n Japan. Winters to nw Africa, India, and se Asia, Recorded from Australia.

Status: Hokkaido (MB, PV), s Kurile Is. (MB: Etorofuto I., Kunashirito I.), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Iki (PV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV: Tairajima I., Nakanoshima I.), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Kumejima I., Agunijima I., Iheyajima I., Izenajima I., Tokashikijima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Kohamajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers and marshes.

北海道 (MB, PV), 南千島 (MB: 択捉島, 国後島), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 壱岐 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV: 平島, 中之島), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 久米島, 粟国島, 伊平屋島, 伊是名島, 渡嘉敷島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 小浜島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

湖沼, 河川, 湿原などに生息する.

37. *Anas formosa* Georgi, 1775 トモエガモ

Tomoe-gamo Baikal Teal

Range: E Palearctic. Breeds in e Siberia from the Enisei River to Anadyrland south to Lake Baikal, Amur Basin, and Kamchatka. Winters to e and s China, Korea, and Japan. Recorded from the s Kurile Is. and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Iki (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland marshes, lakes, rivers, rice fields, sea coasts.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 壱岐 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

湖沼や河川に生息する.

38. *Anas crecca* Linnaeus, 1758 コガモ

Ko-gam Teal

Range: Holarctic. Breeds in boreal and temperate regions of Eurasia and North America. Winters to temperate and subtropical regions.

38-1. *Anas crecca crecca* Linnaeus, 1758 コガモ

Range: Breeds from Iceland and Europe to the Okhotsk coast, Kamchatka, Kurile Is., and Sakhalin, south to the Caucasus, Mongolia, Transbaikalia, n China, and n Japan. Winters to n Africa, Iran, India, s China, Japan and Philippines. Recorded from Korea, Taiwan, and Marianas (Pagan).

Status: Hokkaido (PV. Locally rare RB), s Kurile Is. (RB, PV), Honshu (WV. RB: Nagano), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Danjo Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Inland and saltwater lakes, marshes, rivers, rice fields, coastal seas. Breeds in northern and high altitude lakes, marshes.

北海道 (PV, 一部 RB), 南千島 (RB, PV), 本州 (WV, RB: 長野), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV),

小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), 男女群島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

湖沼, 河川, 海岸に生息する.

38-2. *Anas crecca carolinensis* Gmelin, 1789 アメリカコガモ

Range: Breeds in North America south to California on the Pacific coast and Maine on the Atlantic coast. Winters to the s US, Mexico, West Indies, and Columbia in South America; casual in Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Sado (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Ogasawara Is. (AV: Minamijima I.), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Inland and saltwater lakes, marshes, rivers.

北海道 (IV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 小笠原群島 (AV: 南島), 沖縄島 (IV).

湖沼や河川に生息する.

NETTA Kaup アカハシハジロ属

39. *Netta rufina* (Pallas, 1773) アカハシハジロ

Akahashi-hajiro Red-crested Pochard

Range: W and c Palearctic. Breeds locally from s Europe to the Caspian region and Turkestan across Mongolia to Transbaikalia. Winters to n Africa, Iran, India, and Myanmar. Recorded from Japan.

Status: Honshu (AV: Iwate, Miyagi, Gunma, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Osaka, Hyogo, Shimane, Okayama), Shikoku (AV: Kagawa), Kyushu (AV: Fukuoka, Kumamoto), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I.).

本州 (AV: 岩手, 宮城, 群馬, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 静岡, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 大阪, 兵庫, 島根, 岡山), 四国 (AV: 香川), 九州 (AV: 福岡, 熊本), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島).

AYTHYA Boie スズガモ属

40. *Aythya valisineria* (Wilson, 1814) オオホシハジロ

O-hoshi-hajiro Canvasback

Range: Nearctic. Breeds in Alaska, w Canada, and nw US. Winters to s Canada, s US, and Mexico; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Iwate, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Shiga, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Okinawajima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 岩手, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 滋賀, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島), 四国 (AV: 香川, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 熊本), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 沖縄島 (AV).

41. *Aythya americana* (Eyton, 1838) アメリカホシハジロ

Amerika-hoshi-hajiro Redhead

Range: Nearctic. Breeds in Alaska, w Canada, and w US, sporadically in e Canada and ne US. Winters south to Mexico and Florida; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Tokyo, Jan. 1985).

本州 (AV: 東京, 1985 年 1 月).

42. *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) ホシハジロ

Hoshi-hajiro Common Pochard

Range: Palearctic. Breeds in the British Isles, continental Europe, and s Siberia east to Lake Baikal; also Sakhalin and Hokkaido. Winters to s Europe, n Africa, Iran, India, s China, Korea, and Japan. Recorded from Taiwan.

Status: Hokkaido (PV. MB: Kushiro), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Izu Is. (IV: Shikinejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Inland lakes, marshes, rivers, sea shores.

北海道 (PV. MB: 釧路), 南千島 (PV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (IV: 式根島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 宮

古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).
湖沼, 河川, 海岸などに生息する.

43. *Aythya baeri* (Radde, 1863) アカハジロ

Aka-hajiro Baer's Pochard

Range: E Palearctic. Breeds in the Amur Basin, c Manchuria, and Ussuriland. Winters in e China, occasionally south to ne India, n Myanmar, and n Thailand. Recorded from England, Korea, Japan, Kamchatka, and North America.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Sado (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers.

北海道 (IV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 与那国島).

湖沼, 河川に生息する.

44. *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770) メジロガモ

Mejiro-gamo Ferruginous Duck

Range: W and c Palearctic. Breeds in c and s Europe and n Africa east through Asia Minor, Caspian Sea, and s Russia to w China. Winters to s Europe, n Africa, India, and s China, rarely to Japan.

Status: Honshu (AV: Yamagata, Niigata, Tochigi, Gunma, Ibaraki, Chiba, Saitama, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Mie, Nara, Osaka, Tottori, Okayama, Hiroshima), Shikoku (AV: Kagawa, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki), Miyako Is. (AV: Ikemajima I.), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

本州 (AV: 山形, 新潟, 栃木, 群馬, 茨城, 千葉, 埼玉, 山梨, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 三重, 奈良, 大阪, 鳥取, 岡山, 広島), 四国 (AV: 香川, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎), 宮古諸島 (AV: 池間島), 八重山諸島 (AV: 石垣島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

45. *Aythya collaris* (Donovan, 1809) クビワキンクロ

Kubiwa-kinkuro Ring-necked Duck

Range: Nearctic. Breeds in e Alaska and Canada to the n US. Winters to the s US, Mexico, Panama, and West Indies; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Iwate, Niigata, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Shiga, Wakayama, Osaka, Tottori, Shimane), Shikoku (AV: Kochi).

北海道 (AV), 本州 (AV: 岩手, 新潟, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 愛知, 滋賀, 和歌山, 大阪, 鳥取, 島根), 四国 (AV: 高知).

46. *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) キンクロハジロ

Kinkuro-hajiro Tufted Duck

Range: Palearctic. Breeds from Iceland, Europe, Siberia to Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, and n Japan, south to the Caspian Sea. Winters to n Africa, s Europe, Caspian Sea, India, s China, Korea, Japan, Taiwan, and Philippines.

Status: Hokkaido (RB, PV), s Kurile Is. (MB, PV), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwoto I. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland lakes, rivers, sea shores.

北海道 (RB, PV), 南千島 (MB, PV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊平屋島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川, 海岸に生息する.

47. *Aythya marila* (Linnaeus, 1761) スズガモ

Suzu-gamo Greater Scaup

Range: N Holarctic. Breeds in Iceland, Europe to Siberia, Kamchatka, Aleutian Is., Alaska, and n Canada. Winters to temperate regions of Eurasia and North America.

47-1. *Aythya marila marila* (Linnaeus, 1761) スズガモ

Range: Breeds in Iceland, Europe to Siberia, and Kamchatka. Winters to temperate regions of Eurasia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Sea shores, lakes, rivers.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (AV).

内湾, 海岸, 湖沼, 河川に生息する.

48. *Aythya affinis* (Eyton, 1838) コスズガモ

Ko-suzu-gamo Lesser Scaup

Range: Nearctic. Breeds in Alaska, Canada, and n US. Winters to the s US, Middle America, West Indies, Columbia in South America, and Hawaiian Is.; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata, Miyagi, Mar. 1988, Feb. 1989, Mar. 1991, Feb. 2000, Dec. 2009, Niigata, Jan. 1993, Jan. 1994, Ibaraki, Mar. 1988, Mar. and Apr. 2003, Feb. 2009, Tokyo, 1986, Jan. 1990, Kanagawa, Nov. 1986, Aichi, Feb. 1992, Apr. 1994, Apr. 1995), Okinawajima I. (AV: Dec. 1983).

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形, 宮城, 1988年3月, 1989年2月, 1991年3月, 2000年2月, 2009年12月, 新潟, 1993年1月, 1994年1月, 茨城, 1988年3月, 2003年3月, 4月, 2009年2月, 東京, 1986年, 1990年1月, 神奈川, 1986年11月, 愛知, 1992年2月, 1994年4月, 1995年4月), 沖縄島 (AV: 1983年12月).

POLYSTICTA Eyton コケワタガモ属**49. *Polysticta stelleri* (Pallas, 1769) コケワタガモ**

Ko-kewata-gamo Steller's Eider

Range: E Palearctic and w Nearctic. Breeds on the coast of Siberia from Novaya Zemlya to the Chukot Peninsula, St. Lawrence I., and Alaskan coasts. Winters to the coast of Lapland, Kamchatka, Aleutian Is., Kurile Is., and Alaskan Peninsula.

Status: E Hokkaido (IV), s Kurile Is. (WV), Honshu (AV: Miyagi, Feb. 1964).

Habitat: Open sea, sea coasts, rocky shores.

北海道東部 (IV), 南千島 (WV), 本州 (AV: 宮城, 1964 年 2 月).
海上, 海岸に生息する.

SOMATERIA Leach ケワタガモ属**50. *Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758) ケワタガモ**

Kewata-gamo King Eider

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds on coasts and islands of the Arctic Ocean from Spitsbergen and Novaya Zemlya through the Siberian coast to n Alaska, n Canada, and Greenland. Winters in Iceland, n Scandinavia, Kamchatka, Kurile Is., Aleutian Is., Alaskan coast, and s Greenland, occasionally south to n California and New York.

Status: E Hokkaido (AV: Nemuro, Mar. 1970, Mar. 1981, Mar. 1983, Bekkai, May 1986, etc.).

北海道東部 (AV: 根室, 1970 年 3 月, 1981 年 3 月, 1983 年 3 月, 別海, 1986 年 5 月等).

HISTRIONICUS Lesson シノリガモ属**51. *Histrionicus histrionicus* (Linnaeus, 1758) シノリガモ**

Shinori-gamo Harlequin Duck

Range: Holarctic. Breeds in e Siberia from Lena River to Anadyrland and Kamchatka, south to Lake Baikal, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan; also Aleutian Is., Alaska, w Canada to California, s Greenland, Iceland, Baffin I., and Labrador. Winters in Okhotsk coast, China, Korea, Japan, Kurile Is., and Aleutian Is.; also coasts of North America south to California and New York.

Status: Hokkaido (WV, RB), s Kurile Is. (WV. MB: Kunashirito I.), Honshu (WV. RB: Aomori, Miyagi, Akita), Hegurajima I. (WV), Sado (WV), Mishima I. (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Zamamijima I. (AV).

Habitat: Rocky sea coasts. Breeds in northern mountain forests with rapid streams.

北海道 (WV, RB), 南千島 (WV. MB: 国後島), 本州 (WV. RB: 青森, 宮城, 秋田), 舩倉島 (WV), 佐渡 (WV), 見島 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 座間味島 (AV).

北海道, 本州北部の山地溪流で少数が繁殖し, 岩礁の多い海岸に生息する.

MELANITTA Boie ビロードキンクロ属

52. *Melanitta perspicillata* (Linnaeus, 1758) アラナミキンクロ

Aranami-kinkuro Surf Scoter

Range: Nearctic. Breeds in Alaska and Canada east to Hudson Bay and Quebec. Winters to the Pacific and Atlantic coasts of North America, Aleutian Is., and Kamchatka; accidental in Europe and Japan.

Status: Hokkaido (AV: Nemuro, Mar. 1970), Honshu (AV: Iwate, Jan. 1975, Yamagata, Miyagi, Jan. 2000, Ibaraki, Mar. 1975, Mar. 2003, Jan. 2006, Ishikawa, Dec. 1996 - Jan. 1997).

北海道 (AV: 根室, 1970 年 3 月), 本州 (AV: 岩手, 1975 年 1 月, 山形, 宮城, 2000 年 1 月, 茨城, 1975 年 3 月, 2003 年 3 月, 2006 年 1 月, 石川, 1996 年 12 月 - 1997 年 1 月).

53. *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) ビロードキンクロ

Birodo-kinkuro Velvet Scoter

Range: N Holarctic. Breeds in Scandinavia, Siberia to Kamchatka, n Sakhalin, n Kurile Is., Alaska, and Canada. Winters south to the Iberian Peninsula, Caspian Sea, China, Japan, California, and South Carolina.

53-1. *Melanitta fusca stejnegeri* (Ridgway, 1887) ビロードキンクロ

Range: Breeds in e Siberia from Anadyrland to Kamchatka and Commander

Is., n Kurile Is., and n Sakhalin, south to the Altai. Winters to Sakhalin, Kurile Is., Japan, Korea, and China.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Hachijojima I.).

Habitat: Sea coasts, bays, estuaries.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 八丈島).

海上, 海岸, 河口部に生息する.

54. *Melanitta americana* (Swainson, 1832) クロガモ

Kuro-gamo Black Scoter

Range: E Palearctic and Nearctic. Breeds in arctic e Siberia from the Lena Delta east to Kamchatka, Kurile Is., Commander Is., w Alaska, and Canada (locally). Winters to e China, Korea, Japan, and California in the Pacific and Newfoundland to Chesapeake Bay in the Atlantic coasts.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Hegurajima I. (IV), Sado (WV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.).

Habitat: Sea coasts, bays, estuaries.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 舩倉島 (IV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島).

海岸, 沿岸に生息する.

CLANGULA Leach コオリガモ属

55. *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) コオリガモ

Kori-gamo Long-tailed Duck

Range: N Holarctic. Breeds in Iceland, Scandinavia, Siberia east to the Chukot Peninsula and Koryakland, Alaskan coast, arctic Canada, and Greenland. Winters in n Europe, Iceland, Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, n Japan, Aleutian Is., and coasts of North America south to Washington and South Carolina.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV: Aomori, Iwate. IV: Akita, Yamagata, Miyagi, Toyama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Yamanashi, Shi-

zuoka, Aichi, Shiga, Mie, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Kyushu (AV: Fukuoka), Izu Is. (IV: Hachijojima I.).

Habitat: Sea coasts, bays, rarely inland lakes.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV: 青森, 岩手. IV: 秋田, 山形, 宮城, 富山, 茨城, 千葉, 東京, 山梨, 静岡, 愛知, 滋賀, 三重, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 九州 (AV: 福岡), 伊豆諸島 (IV: 八丈島).

海上, 海岸に生息する.

BUCEPHALA Baird ホオジロガモ属

56. *Bucephala albeola* (Linnaeus, 1758) ヒメハジロ

Hime-hajiro Bufflehead

Range: Nearctic. Breeds from Alaska to Canada and nw US. Winters to the Pacific coast from Alaska to the c and s US and Mexico; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Jan. 2006, Iwate, Miyagi, Jan. and Mar. 1980, Niigata, Dec. 1956, Dec. 1984, Ibaraki, Jan. 1995 etc., Chiba, Tokyo, Nov. 2008, Hyogo, Feb. 2009, Okayama), Kyushu (AV: Fukuoka, 1992).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 2006 年 1 月, 岩手, 宮城, 1980 年 1 月, 3 月, 新潟, 1956 年 12 月, 1984 年 12 月, 茨城, 1995 年 1 月等, 千葉, 東京, 2008 年 11 月, 兵庫, 2009 年 2 月, 岡山), 九州 (AV: 福岡, 1992 年).

57. *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) ホオジロガモ

Hojiro-gamo Common Goldeneye

Range: Holarctic. Breeds in Scandinavia, Siberia east to Kamchatka, south to Germany, Lake Baikal, Amur Basin, Ussuriland, and n Sakhalin; also Alaska and Canada south to the n US. Winters to temperate regions of Eurasia and North America.

57-1. *Bucephala clangula clangula* (Linnaeus, 1758) ホオジロガモ

Range: Range of the species except North America. Winters to Europe, Black Sea, Caspian Sea, e China coast south to Fukien, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (MB, PV), Honshu (WV), Hegurajima I. (IV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV),

Tsushima (IV), Goto Is. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I.), Miyako Is. (AV: Ikemajima I., Taramajima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, bays, inland lakes, big rivers.

北海道 (WV), 南千島 (MB, PV), 本州 (WV), 舩倉島 (IV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 五島列島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島), 宮古諸島 (AV: 池間島, 多良間島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

海岸や大きな湖沼, 大きな河川に生息する.

MERGELLUS Selby ミコアイサ属

58. *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758) ミコアイサ

Miko-aisa Smew

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to Kamchatka, Sakhalin, and Hokkaido. Winters to c Europe, Black Sea, Caspian Sea, China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (PV. MB: n Hokkaido), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Hegurajima I. (IV), Sado (WV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Iki (WV), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV), Miyakojima I. (IV), Ishigakijima I. (IV).

Habitat: Shallow bays, lakes, rivers. Breeds in freshwater lakes.

北海道 (PV. MB: 北部), 南千島 (PV), 本州 (WV), 舩倉島 (IV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 壱岐 (WV), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV), 宮古島 (IV), 石垣島 (IV).

湖沼, 河川下流部に生息する.

MERGUS Linnaeus ウミアイサ属

59. *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 カワアイサ

Kawa-aisa Common Merganser

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, Europe east through Siberia to Koryakland and Kamchatka, south to n Germany, Pamir, Himalayas to Tibet and nw China, Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido; also North America

from Alaska and Canada to n US. Northern birds migratory, wintering to temperate regions.

59-1. *Mergus merganser merganser* Linnaeus, 1758 カワアイサ

Range: Breeds in n Eurasia from n Europe to Kamchatka and Commander Is., south to Amur Basin and Ussuriland; also Kurile Is. (Paramushir I. to Etorofuto I.), Sakhalin, and Hokkaido. Winters to the Mediterranean region, Black and Caspian seas, n India, Assam, s China and Japan.

Status: Hokkaido (RB. PV), s Kurile Is. (RB), n Honshu (WV), sw Honshu (WV. IV), Sado (WV), Oki (IV), Shikoku (WV. IV), Kyushu (WV. IV), Tsushima (PV), Izu Is. (AV: Hachijojima I., Torishima I.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawajima I. (IV), Miyakojima I. (AV), Ishigakijima I. (AV).

Habitat: Lakes, rivers.

北海道 (RB. PV), 南千島 (RB), 本州北部 (WV), 本州南西部 (WV. IV), 佐渡 (WV), 隠岐 (IV), 四国 (WV. IV), 九州 (WV. IV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島, 鳥島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 沖縄島 (IV), 宮古島 (AV), 石垣島 (AV).

湖沼, 河川, まれに海岸に生息する.

59-2. *Mergus merganser orientalis* Gould, 1845 コカワアイサ

Range: Breeds from ne Afghanistan and Pamir east through Tibet and adjacent Himalayas to Sikang, Tsinghai and w Kansu. Winters in the Himalayas, n Myanmar, w China in Szechwan and Yunnan; casual in Korea and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Kanagawa), Kyushu (AV: Fukuoka).

北海道 (AV), 本州 (AV: 神奈川), 九州 (AV: 福岡).

60. *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 ウミアイサ

Umi-aisa Red-breasted Merganser

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, Scandinavia, Siberia east to Kamchatka, and Anadyrland, south to Germany, Mongolia, and Amur Basin; also North America from Alaska to n US and Greenland. Winters to temperate regions of Eurasia and North America.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (IV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV: Oshima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima

I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I.), Miyako Is. (AV: Miyakojima I.).

Habitat: Sea coasts, bays, occasionally inland lakes.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (IV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島), 宮古諸島 (AV: 宮古島).

海岸, 海上, まれに湖沼に生息する.

61. *Mergus squamatus* Gould, 1864 コウライアイサ

Korai-aisa Scaly-sided Merganser

Range: E Palearctic. Breeds in Ussuriland in the Sikhote-Alin Range and Khor River Basin, Amur Basin and ne Manchuria, also probably in n Korea. Rather sedentary, but recorded in winter in Vietnam, c and e China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Niigata, Tochigi, Toyama, Gunma, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Ryukyu Is. (AV: Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.). First record was in Gifu (Kiso River, Feb. 1986).

北海道 (AV), 本州 (AV: 新潟, 栃木, 富山, 群馬, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 三重, 奈良, 和歌山, 鳥取, 島根, 岡山, 広島, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 琉球諸島 (AV: 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島). 岐阜県木曾川 (1986 年 2 月) が初記録.

Order PODICIPEDIFORMES カイツブリ目

Family PODICIPEDIDAE カイツブリ科

TACHYBAPTUS Reichenbach カイツブリ属

62. *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764) カイツブリ

Kaitsuburi Little Grebe

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds in temperate and tropical Eurasia from w Europe east to China, Korea, and Japan, south to India, Sri Lanka, and Malay Peninsula; also most of Africa, Madagascar, Philippines, Indonesia, and New Guinea. Mainly sedentary.

62-1. *Tachybaptus ruficollis poggei* (Reichenow, 1902) カイツブリ

Range: Breeds in se China, sw Ussuriland, Korea, and Japan except Minami-Daitojima I.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Yurishima I., Suishoto I.), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (WV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (RB), Okinawa Is. (RB), Miyako Is. (RB), Yaeyama Is. (WV).

Habitat: Wide ranges of water from the coast to inland waters.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 勇留島, 水晶島), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (WV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (RB), 沖縄諸島 (RB), 宮古諸島 (RB), 八重山諸島 (WV).

河川や湖沼に生息する.

62-2. *Tachybaptus ruficollis kunikyonis* (Kuroda, 1927) ダイトウカイツブリ

Range: Breeds on the Daito Is.

Status: Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland waters.

大東諸島 (RB: 北大東島, 南大東島).

湖沼に生息する。

PODICEPS Latham カンムリカイツブリ属

63. *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783) アカエリカイツブリ

Aka-eri-kaitsuburi Red-necked Grebe

Range: Holarctic. Breeds in c Europe generally east to 80° E in s Siberia, then with a gap in distribution, in e Siberia from 120° E to the Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido; also Alaska, Canada, and n US. Winters to the temperate zone.

63-1. *Podiceps grisegena holbollii* Reinhardt, 1854 アカエリカイツブリ

Range: Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Anadyrland, Kamchatka, Sakhalin, and Hokkaido; also North America.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Etorofuto I., Kunashirito I.), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (WV: Niijima I.), Yaeyama Is. (AV: Yonaguni-jima I.).

Habitat: Coastal seas, rivers, lakes, occasionally in inland waters.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 択捉島, 国後島), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV: 新島), 八重山諸島 (AV: 与那国島).

海岸部, 河川や湖沼に生息する。

64. *Podiceps cristatus* (Linnaeus, 1758) カンムリカイツブリ

Kammuri-kaitsuburi Great Crested Grebe

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds in Europe generally, east across Siberia to the Okhotsk coast, south to Turkestan, Tibet, w China, Mongolia, Manchuria, Ussuriland, and Japan; also Africa, Australia, and New Zealand. Northern birds migratory, wintering to temperate Eurasia.

64-1. *Podiceps cristatus cristatus* (Linnaeus, 1758) カンムリカイツブリ

Range: Range of the species in Eurasia; also n Africa.

Status: Hokkaido (WV), Honshu (WV. MB: Aomori, Ibaraki, Shiga), Sado (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV),

Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV).

Habitat: Coast to inland waters.

北海道 (WV), 本州 (WV. MB: 青森, 茨城, 滋賀), 佐渡 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV).

海岸部, 湖沼に生息する.

65. *Podiceps auritus* (Linnaeus, 1758) ミミカイツブリ

Mimi-kaitsuburi Horned Grebe

Range: Holarctic. Breeds from Iceland, Scotland and Scandinavia east across Siberia to the Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to the Altai, Lake Baikal, Amur Basin, and n Sakhalin; also North America south to the n US. Winters to the temperate zone.

65-1. *Podiceps auritus auritus* (Linnaeus, 1758) ミミカイツブリ

Range: Range of the species except North America.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Ikemajima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Coast, occasionally in inland rivers and lakes.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 池間島, 与那国島).

海岸部, 河川, 湖沼に生息する.

66. *Podiceps nigricollis* Brehm, 1831 ハジロカイツブリ

Hajiro-kaitsuburi Black-necked Grebe

Range: Holarctic and Afrotropical. Breeds in Europe generally but sporadic, east across Siberia to the Ob River, then with a broad gap in distribution, in Manchuria and Ussuriland; also e and s Africa and w North America. Winters to the temperate zone.

66-1. *Podiceps nigricollis nigricollis* Brehm, 1831 ハジロカイツブリ

Range: Range of the species except Africa and North America. Winters in s Europe, e Africa, and temperate Asia.

Status: Hokkaido (WV), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (WV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Shallow waters of coastal areas, occasionally in inland waters.

北海道 (WV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 与那国島), 南大東島 (IV).

河川や湖沼に生息する.

Order PHAETHONTIFORMES ネットタイチョウ目

Family PHAETHONTIDAE ネットタイチョウ科

PHAETHON Linnaeus ネットタイチョウ属

67. *Phaethon rubricauda* Boddaert, 1783 アカオネットタイチョウ

Aka-o-nettaicho Red-tailed Tropicbird

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific and Indian oceans. Breeds on islands in subtropical and tropical oceans. Sedentary, but wanders about widely.

67-1. *Phaethon rubricauda rothschildi* (Mathews, 1915) アカオネットタイチョウ

Range: Breeds from the Iwo Is. to Micronesia, Minami-Torishima I., and Hawaiian Is.; occasionally drifted to Japan by typhoon.

Status: Honshu (AV: Iwate, Akita, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Gifu, Shiga, Osaka, Kyoto, Hyogo), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Miyazaki), Ogasawara

Is. (IV. CB: Nishinoshima I.), Iwo Is. (MB: Kita-Iwoto I., Minami-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (MB), Amami Is. (AV), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (IV: Nakanokamishima I., AV: Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Pelagic, aerial.

本州 (AV: 岩手, 秋田, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 静岡, 愛知, 岐阜, 滋賀, 大阪, 京都, 兵庫), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 宮崎), 小笠原群島 (IV. CB: 西之島), 硫黄列島 (MB: 北硫黄島, 南硫黄島), 南鳥島 (MB), 奄美諸島 (AV), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (IV: 仲ノ神島, AV: 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

大洋島で繁殖し, 海上に生息する.

68. *Phaethon lepturus* Daudin, 1802 シラオネッタイチョウ

Shira-o-nettaicho White-tailed Tropicbird

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in tropical oceans. Sedentary.

68-1. *Phaethon lepturus dorotheae* Mathews, 1913 シラオネッタイチョウ

Range: Breeds in the Pacific from the Marianas and Hawaiian Is. to the Tuamotu Is. Recorded north to the Ogasawara Is. and Taiwan; occasionally drifted to Japan by typhoon.

Status: Honshu (AV: Iwate, Nagano, Toyama, Gunma, Yamanashi, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Okayama), Kyushu (AV: Oita, Miyazaki), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Minami-Torishima I. (IV), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I.), Miyakojima I. (IV), Yaeyama Is. (IV: Nakanokamishima I.).

Habitat: Pelagic, aerial.

本州 (AV: 岩手, 長野, 富山, 群馬, 山梨, 静岡, 岐阜, 石川, 岡山), 九州 (AV: 大分, 宮崎), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), 南鳥島 (IV), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島), 宮古島 (IV), 八重山諸島 (IV: 仲ノ神島).

海上に生息する.

Order PTEROCLIFORMES サケイ目

Family PTEROCLIDAE サケイ科

SYRRHAPTES Illiger サケイ属

69. *Syrrhaptes paradoxus* (Pallas, 1773) サケイ

Sakei Pallas's Sandgrouse

Range: C and e Palearctic. Breeds in deserts and steppes of c Asia from the n Caspian Sea to nw China, Mongolia, and nw Manchuria. Mainly sedentary but irruptive, migrating to w Europe, Asia Minor, India, China, and Korea; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Yamagata, Tokyo, Niigata, Aichi, Shiga), Kyushu (AV: Nagasaki), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I.).

本州 (AV: 宮城, 山形, 東京, 新潟, 愛知, 滋賀), 九州 (AV: 長崎), 八重山諸島 (AV: 石垣島).

Order COLUMBIFORMES ハト目

Family COLUMBIDAE ハト科

COLUMBA Linnaeus カワラバト属

70. *Columba oenas* Linnaeus, 1758 ヒメモリバト

Hime-moribato Stock Dove

Range: W Palearctic. Breeds from Britain to Scandinavia and Finland, south to nw Africa and s Caspian Sea, east to Tien Shan. Northern birds wintering to south area.

70-U. *Columba oenas* ssp. 亜種不明

Status: Tobishima I. (AV: Nov. 1984), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Tsushima (AV), Kyushu (AV: Kagoshima, Dec. 1995), Amami-Oshima I. (AV:

Jun. 1993), Okinawajima I. (AV: Nov. 1992).

飛島 (AV: 1984 年 11 月), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 対馬 (AV), 九州 (AV: 鹿児島, 1995 年 12 月), 奄美大島 (AV: 1993 年 6 月), 沖縄島 (AV: 1992 年 11 月).

71. *Columba janthina* Temminck, 1830 カラスバト

Karasu-bato Japanese Wood Pigeon

Range: E Palearctic. Breeds in Japan from c Honshu south to the Ryukyu Is., Ogasawara Is., and Iwo Is.; also Dagelet I. and islets off the south coast in Korea. Sedentary but somewhat erratic.

71-1. *Columba janthina janthina* Temminck, 1830 カラスバト

Range: Resident on adjacent islands of c Honshu and Kyushu, south to the Izu Is., Amami Is., and Okinawa Is.; also Dagelet I. and islets off the south coast in Korea.

Status: Honshu (IV: Akita, Yamagata, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Fukui, Mie, Osaka, Hyogo, Tottori, Shimane), Awashima I. (IV), Sado (IV), Kanmurijima I. (RB), Ushijima I. (RB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (WV), Shikoku (IV: Ehime, Tokushima), Sukumo-Okinoshima I. (RB), Biroto I. (RB), Sukumo-Himeshima I. (RB), Oki (RB), Chikuzen-Okinoshima I. (RB), Chikuzen-Oshima I. (RB), Jinoshima I. (RB), Ainoshima I. (RB), Shirashima I. (RB), Miyazaki-Oshima I. (RB), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (IV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Koshiki Is. (RB), Kuchinoerabujima I. (IV), Izu Is. (RB: Oshima I., Toshima I., Shikinejima I., Nijijima I., Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Agunijima I., Izenajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Zamamijima I., Yakabijima I., Akashima I.).

Habitat: Dense evergreen forests.

本州 (IV: 秋田, 山形, 千葉, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 三重, 大阪, 兵庫, 鳥取, 島根), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 冠島 (RB), 牛島 (RB), 舩倉島 (PV), 見島 (WV), 四国 (IV: 愛媛, 徳島), 宿毛沖の島 (RB), 蒲葵島 (RB), 宿毛姫島 (RB), 隠岐 (RB), 筑前沖ノ島 (RB), 筑前大島 (RB), 地島 (RB), 藍島 (RB), 白島 (RB), 宮崎大島 (RB), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (IV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 甌島諸島 (RB), 口永良部島 (IV), 伊豆諸島 (RB: 大島, 利島, 式根島, 新島, 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 青ヶ島), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 沖

縄諸島 (RB: 沖縄島, 粟国島, 伊是名島, 伊平屋島, 久米島, 渡嘉敷島, 座間味島, 屋嘉比島, 阿嘉島).

常緑広葉樹林に生息する.

71-2. *Columba janthina nitens* (Stejneger, 1887) アカガシラカラスバト

Range: Resident on the Ogasawara Is. and Iwo Is.

Status: Ogasawara Is. (WV: Mukojima I., RB: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (RB: Kita-Iwoto I., Iwoto I., Minami-Iwoto I.).

Habitat: Dense evergreen forests.

小笠原群島 (WV: 賀島, RB: 父島, 母島), 硫黄列島 (RB: 北硫黄島, 硫黄島, 南硫黄島).

常緑広葉樹林に生息する.

71-3. *Columba janthina stejnegeri* (Kuroda, 1923) ヨナグニカラスバト

Range: Resident on the Sakishima Is.

Status: Sakishima Is. (RB: Miyakojima I., Taramajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Dense evergreen forests.

先島諸島 (RB: 宮古島, 多良間島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

常緑広葉樹林に生息する.

72. *Columba versicolor* Kittlitz, 1832 オガサワラカラスバト

Ogasawara-karasu-bato Bonin Wood Pigeon

Range: E Palearctic. Endemic to the Ogasawara Is. Sedentary.

Status: Ogasawara Is. (FB: Chichijima I., Nakodojima I.). 4 specimens were collected on Chichijima I. in 1827, in 1828 and on Nakodojima I. in 1889. Extinct.

Habitat: Dense evergreen forests.

小笠原群島 (FB: 父島, 媒島). Beechey が父島で 1827 年に 1 羽, Kittlitz が父島で 2 羽, Holst が媒島で 1889 年に雄 1 羽を採集した. 絶滅.

森林に生息していた.

73. *Columba jouyi* (Stejneger, 1887) リュウキュウカラスバト

Ryukyu-karasu-bato Ryukyu Wood Pigeon

Range: E Palearctic. Endemic to the Okinawa Is. and Daito Is. Sedentary.

Status: Okinawa Is. (FB: Iheyajima I., Izenajima I., Okinawajima I., Yagajishima I., Zamamijima I.), Daito Is. (FB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima

I.). Extinct.

Habitat: Dense evergreen forests.

沖縄諸島 (FB: 伊平屋島, 伊是名島, 沖縄島, 屋我地島, 座間味島),
大東諸島 (FB: 北大東島, 南大東島). 絶滅.

森林に生息していた.

STREPTOPELIA Bonaparte キジバト属

74. *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790) キジバト

Kiji-bato Oriental Turtle Dove

Range: Asiatic. Breeds in e Asia from the Urals eastward to the Okhotsk coast, Sakhalin, and Japan, north to n Lake Baikal and s Russian Far East, south to s India, Myanmar, and Indochina. Migratory and sedentary, northern birds wintering to warmer areas.

74-1. *Streptopelia orientalis orientalis* (Latham, 1790) キジバト

Range: Breeds in s Siberia, Sakhalin, Japan south to Yakushima I., Korea, and China. Recorded from the Kurile Is. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB: Oshima I. - Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields, near human habitations, parks.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (PV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島 - 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

森林, 農耕地, 村落, 公園などに生息する.

74-2. *Streptopelia orientalis stimpsoni* (Stejneger, 1887) リュウキュウキジバト

Range: Resident on the Amami Is. and Ryukyu Is.

Status: Yakushima I. (AV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Kakeromajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is.

(RB: Okinawajima I., Izenajima I., Iheyajima I., Zamamijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Taketomijima I., Kuroshima I., Nakanokamishima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields, near human habitations.

屋久島 (AV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 加計呂麻島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊是名島, 伊平屋島, 座間味島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 竹富島, 黒島, 仲ノ神島, 与那国島, 波照間島).

森林, 農耕地, 村落に生息する.

75. *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838) シラコバト

Shirako-bato Eurasian Collared Dove

Range: Temperate and tropical Eurasian. Breeds in Eurasia from the British Isles and s Scandinavia east across the Balkans and Asia Minor to India, Sri Lanka, and Myanmar, and from Turkestan to Hopeh, Korea, and Japan. Mainly sedentary.

75-1. *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky, 1838) シラコバト

Range: Range of the species except Myanmar to e China.

Status: Honshu (IB: Ibaraki, Tochigi, Saitama, Chiba. IV: Niigata, Fukushima, Tokyo, Kanagawa, Wakayama, Shimane. FB: Gunma), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Oita, Kagoshima), Ryukyu Is. (AV: Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.). Records outside Kanto region might also include introduced birds.

Habitat: Woodlands, farmlands, cultivated fields.

本州 (IB: 茨城, 栃木, 埼玉, 千葉. IV: 新潟, 福島, 東京, 神奈川, 和歌山, 島根. FB: 群馬), 見島 (AV), 九州 (AV: 大分, 鹿児島), 琉球諸島 (AV: 久米島, 宮古島, 石垣島, 与那国島). 関東北部の集団以外は自然分布としたが, 移入分布の可能性もある.

林のある農耕地に生息する.

76. *Streptopelia tranquebarica* (Hermann, 1804) ベニバト

Beni-bato Red Turtle Dove

Range: Asiatic. Breeds in e and se Asia from nw India east to n China and Taiwan, south to s India, Indochina, and n Philippines. Mainly sedentary.

76-1. *Streptopelia tranquebarica humilis* (Temminck, 1824) ベニバト

Range: Breeds in Tibet, China, and Taiwan, south to the Andaman Is., Indochina, and n Philippines. Migratory and sedentary, northern birds wintering to warmer areas, occasionally in Japan.

Status: Rishirito I. (AV), Honshu (AV: Saitama, Kanagawa, Aichi, Mie, Wakayama, Osaka, Okayama, Shimane), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Danjo Is. (AV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV).

利尻島 (AV), 本州 (AV: 埼玉, 神奈川, 愛知, 三重, 和歌山, 大阪, 岡山, 島根), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 男女群島 (AV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV).

CHALCOPHAPS Gould キンバト属

77. *Chalcophaps indica* (Linnaeus, 1758) キンバト

Kin-bato Emerald Dove

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from nw India eastward to se Asia, s Ryukyu Is., Philippines, south to s India, Sri Lanka, Andaman Is., Nicobar Is., Sunda Is., Moluccas, New Guinea, n and e Australia, Vanuatu, New Caledonia, Sedentary.

77-1. *Chalcophaps indica yamashinai* Hachisuka, 1939 キンバト

Range: Resident on Miyako Is. and Yaeyama Is.

Status: Sakishima Is. (RB: Miyakojima I., Taramajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

先島諸島 (RB: 宮古島, 多良間島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 与那国島).

常緑広葉樹林に生息する.

TRERON Vieillot アオバト属**78. *Treron sieboldii* (Temminck, 1835) アオバト**

Ao-bato Japanese Green Pigeon

Range: E Asiatic. Breeds from Japan to Taiwan, Hainan, and n and c Vietnam, locally in sw China. Migratory and sedentary, northern birds wintering to warmer areas.

78-1. *Treron sieboldii sieboldii* (Temminck, 1835) アオバト

Range: Breeds in Japan from Hokkaido and s Kurile Is. to Kyushu. Winters in s Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Oshima I., Niiijima I., Shikinejima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Okinawajima I. (IV), Miyakojima I. (IV).

Habitat: Broad-leaved forests, mixed forests.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 新島, 式根島, 八丈島, 青ヶ島), 小笠原群島 (IV: 父島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 沖縄島 (IV), 宮古島 (IV).

針広混交林, 落葉広葉樹林. 常緑広葉樹林に生息する.

79. *Treron formosae* Swinhoe, 1863 ズアカアオバト

Zuaka-ao-bato Whistling Green Pigeon

Range: E Asiatic. Breeds from Yakushima I. and Ryukyu Is., south to Taiwan, Lan Yu I., and n Philippines. Sedentary.

79-1. *Treron formosae permagnus* Stejneger, 1887 ズアカアオバト

Range: Resident on Yakushima I. to the Okinawa Is.

Status: Kyushu (IV: Kagoshima), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Agunijima I., Izenajima I., Iheyajima I., Kumejima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, cultivated fields.

九州 (IV: 鹿児島), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄諸島 (RB: 沖縄島, 粟国島, 伊是名島, 伊平屋島, 久米島).

常緑広葉樹林に生息する.

79-2. *Treron formosae medioximus* (Bangs, 1901) チュウダイズアカオバト

Range: Resident on Miyakojima I. and Yaeyama Is.

Status: Sakishima Is. (RB: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Taketomijima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, cultivated fields.

先島諸島 (RB: 宮古島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 竹富島, 黒島, 与那国島, 波照間島).

常緑広葉樹林に生息する.

PTILINOPUS Swainson ヒメアオバト属

80. *Ptilinopus leclancheri* (Bonaparte, 1855) クロアゴヒメアオバト

Kuroago-hime-aobato Black-chinned Fruit Dove

Range: E Indomalayan. Breeds from Taiwan to Philippines.

80-1. *Ptilinopus leclancheri taiwanus* Ripley, 1962 クロアゴヒメアオバト

Range: Breeds in Taiwan.

Status: Iriomotejima I. (AV: Aug. 2004).

西表島 (AV: 2004 年 8 月).

Order GAVIIFORMES アビ目

Family GAVIIDAE アビ科

GAVIA Forster アビ属

81. *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) アビ

Abi Red-throated Loon

Range: N Holarctic. Breeds south to Iceland, Scotland and s Scandinavia in w Europe, east across Siberia to the Okhotsk coast, Kamchatka, Sakhalin, and Kurile Is.; also Alaska, n Canada, and Greenland, south to British Columbia, Hudson Bay, and Newfoundland. Winters to the temperate zone.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Oshima I.), Amami Is. (IV), Okinawa Is. (IV).

Habitat: Coastal seas, inshore waters, occasionally inland.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島), 奄美諸島 (IV), 沖縄諸島 (IV).

沿岸, 湾内, 河口, 海岸近くの湖沼に生息する.

82. *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) オオハム

Ohamu Black-throated Loon

Range: N Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from Scotland and Scandinavia east to Cape Prince of Wales in w Alaska, south to n Kazakhstan, Mongolia, lower Amur Basin, n Sakhalin, and Kamchatka. Winters to the temperate zone.

82-1. *Gavia arctica viridigularis* Dwight, 1918 オオハム

Range: Breeds from about the Lena River and Transbaikalia eastward. Winters in the nw Pacific.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (IV), Amami Is. (IV).

Habitat: Coastal seas, bays, occasionally rivers, coastal lakes.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (IV), 奄美諸島 (IV).

沿岸，内湾，河口，海岸近くの湖沼に生息する．

83. *Gavia pacifica* (Lawrence, 1858) シロエリオオハム

Shiroeri-ohamu Pacific Loon

Range: N Nearctic, marginally Palearctic. Breeds from ne Siberia to Alaska and Canada south to Hudson Bay. Winters on both coasts of the Pacific.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Niijima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.).

Habitat: Coastal seas, bays, occasionally rivers, coastal lakes.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 新島), 小笠原群島 (AV: 父島).

沿岸，内湾，河口，海岸近くの湖沼に生息する．太平洋沿岸への渡来が多い．

84. *Gavia immer* (Brünnich, 1764) ハシグロアビ

Hashiguro-abi Great Northern Loon

Range: Mainly Nearctic and marginally Palearctic. Breeds from Aleutian through n North America to Greenland, Iceland and Bear I. Winters to the coasts of North America and w Europe.

Status: Hokkaido (AV: Wakkanai, Apr. 2003).

北海道 (AV: 稚内, 2003 年 4 月).

85. *Gavia adamsii* (Gray, 1859) ハシジロアビ

Hashijiro-abi Yellow-billed Loon

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds from n Finland and Novaya Zemlya east across n Siberia to n Alaska and nw Canada, south to Magadan on the Okhotsk coast and Great Slave Lake in Canada. Winters in cold current waters along the Pacific and Atlantic coasts.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Nagasaki, Oita, Miyazaki).

Habitat: Coastal seas.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 見島 (AV), 九州 (AV: 長崎, 大分, 宮崎).

沿岸に生息する．

Order PROCELLARIIFORMES ミズナギドリ目

Family DIOMEDEIDAE アホウドリ科

PHOEBASTRIA Reichenbach アホウドリ属

86. *Phoebastria immutabilis* (Rothschild, 1893) コアホウドリ

Ko-ahodori Laysan Albatross

Range: Oceanic in the n and c Pacific, north to Aleutian waters. Breeds on the Izu and Ogasawara Is., the w Hawaiian Is., especially abundantly on Laysan, Midway, etc., and islands off w Mexico and disperses at sea in the non-breeding season.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Izu Is. (FB: Torishima I., IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (MB: Mukojima Is.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Kikaijima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Miyakojima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 伊豆諸島 (FB: 鳥島, IV: 八丈島), 小笠原群島 (MB: 聳島列島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 喜界島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 宮古島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

大洋の島で繁殖し, 海上に生息する.

87. *Phoebastria nigripes* (Audubon, 1839) クロアシアホウドリ

Kuro-ashi-ahodori Black-footed Albatross

Range: Oceanic in the n and c Pacific north to the Kurile Is. and Gulf of Alaska, east to the California coast and west to Japanese waters. Breeds on the Hawaiian Is., Ogasawara Is., Iwo Is., and Torishima I.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Izu Is. (MB: Torishima I.), Ogasawara Is. (MB: Mukojima I., Mukojima-Torishima I., Nakodojima I., Yomejima I., Magojima I., Futagojima I., Anejima-Minamitorishima I., Imotojima-Torishima I.), Iwo Is. (FB), Tokara Is. (AV), Sakishima Is. (IV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Nakanokamishima I.), Senkaku Is. (MB: Kita-Kojima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (IV), 四国 (IV), 伊豆諸島 (MB: 鳥島), 小笠原群島 (MB: 聳島, 聳島鳥島, 媒島, 嫁島, 孫島, 二子島, 姉島南鳥島, 妹島鳥島), 硫黄列島 (FB), トカラ列島 (AV), 先島諸島 (IV: 宮古島, 石垣島, 仲ノ神島), 尖閣列島 (MB: 北小島).

大洋の島で繁殖し, 海上に生息する.

88. *Phoebastria albatrus* (Pallas, 1769) アホウドリ

Ahodori Short-tailed Albatross

Range: Oceanic in the n and c Pacific, north to the Bering Sea. Breeds on Torishima I. in the Izu Is. and Minami-Kojima I. and Kita-Kojima I. in the Senkaku Is.; also reported to have bred on the Ogasawara Is., Pescadore Is., etc., but no recent observations. A pair bred on the Midway Atoll in 2010-2011 and 2011-2012.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (IV), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Izu Is. (MB: Torishima I.), Ogasawara Is. (FB), Iwo Is. (IV), Senkaku Is., (MB). Reintroduced into Ogasawara Is. since 2008.

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 択捉島, 国後島, 色丹島), 本州 (IV), 九州 (IV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (MB: 鳥島), 小笠原群島 (FB), 硫黄列島 (IV), 尖閣列島 (MB). 小笠原群島では2008年から雛の再導入が行われている.
大洋の島で繁殖し, 海上に生息する.

Family PROCELLARIIDAE ミズナギドリ科

FULMARUS Stephens フルマカモメ属

89. *Fulmarus glacialis* (Linnaeus, 1761) フルマカモメ

Furuma-kamome Northern Fulmar

Range: Oceanic in the n Pacific and Atlantic. Breeds on arctic and subarctic coasts and islands.

89-1. *Fulmarus glacialis rodgersii* Cassin, 1862 フルマカモメ

Range: Breeds on the Bering Sea coasts and islands, south to the Kurile Is.

and s coast of the Alaska Peninsula. Winters south to Hokkaido waters and Baja California.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Shikoku (AV: Tokushima), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 四国 (AV: 徳島), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 沖縄島 (AV).

冬に北海道, 本州北部の海上に生息する. 北海道北部・東部では夏にも飛来する.

PTERODROMA Bonaparte シロハラミズナギドリ属

90. *Pterodroma solandri* (Gould, 1844) ハジロミズナギドリ

Hajiro-mizunagidori Providence Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, migrating north to Japan. Breeds on Lord Howe I. and Philip I., formerly also on Norfolk I. Recorded from n Honshu.

Status: Se Hokkaido (AV: Sep. 1983), Honshu (AV: Sanriku, Aug. 1982, Ibaraki, Sep. 1997, Saitama, Kanagawa, Sep. 2007, Wakayama, Tottori, Jan. 2004), Tokara Is. (AV).

北海道南東部 (AV: 1983 年 9 月), 本州 (AV: 三陸沖, 1982 年 8 月, 茨城, 1997 年 9 月, 埼玉, 神奈川, 2007 年 9 月, 和歌山, 鳥取, 2004 年 1 月), トカラ列島 (AV).

91. *Pterodroma externa* (Salvin, 1875) オオシロハラミズナギドリ

O-shirohara-mizunagidori Juan Fernandez Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, wintering mainly in the c Pacific. Breeds on Mas Afuera, Juan Fernandez Group.

Status: Honshu (AV: Tokyo, Aichi, Jul. 1962, Osaka), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I., Feb. 2004).

本州 (AV: 東京, 愛知, 1962 年 7 月, 大阪), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島, 2004 年 2 月).

92. *Pterodroma neglecta* (Schlegel, 1863) カワリシロハラミズナギドリ

Kawari-shirohara-mizunagidori Kermadec Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, migrating north to the temperate n Pacific.

Breeds on islands in the s Pacific Ocean from Lord Howe I. to the Juan Fernandez Is.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, Sep. 2011, Yamanashi, Sep. 2011, Shizuoka, Nov. 1989), Shikoku (AV: Tokushima, Oct. 1987, Kochi), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I., Aug. 1931).

本州 (AV: 茨城, 2011 年 9 月, 山梨, 2011 年 9 月, 静岡, 1989 年 11 月), 四国 (AV: 徳島, 1987 年 10 月, 高知), 大東諸島 (AV: 南大東島, 1931 年 8 月).

93. *Pterodroma phaeopygia* (Salvin, 1876) ハワイシロハラミズナギドリ

Hawai-shirohara-mizunagidori Dark-rumped Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, wintering in warm waters in the n and c Pacific. Breeds on the Galapagos Archipelago and Hawaiian Is.

93-1. *Pterodroma phaeopygia sandwichensis* (Ridgway, 1884) ハワイシロハラミズナギドリ

Range: Breeds on the Hawaiian Is. Winters in the n and c Pacific.

Status: N and c Honshu (AV: Iwate, Sep. 1976, Chiba).

本州北・中部 (AV: 岩手, 1976 年 9 月, 千葉).

94. *Pterodroma inexpectata* (Forster, 1844) マダラシロハラミズナギドリ

Madara-shirohara-mizunagidori Mottled Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, migrating north to the Aleutian Is. and Alaska. Breeds on the Snares Is. and islets off Stewart I., formerly also on New Zealand.

Status: Sw Honshu (AV: Hiroshima, Jun. 1986).

本州南西部 (AV: 広島, 1986 年 6 月).

95. *Pterodroma nigripennis* (Rothschild, 1893) ハグロシロハラミズナギドリ

Haguro-shirohara-mizunagidori Black-winged Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, wintering in New Zealand waters north to the Hawaiian Is. Breeds on Norfolk I., Lord Howe I., New Caledonia, Kermadec Is., Chatham Is., and Three King Is.

Status: Hokkaido (AV: Hakodate, Sep. 1980), Wakayama (AV).

北海道 (AV: 函館, 1980 年 9 月), 和歌山 (AV).

96. *Pterodroma hypoleuca* (Salvin, 1888) シロハラミズナギドリ

Shirohara-mizunagidori Bonin Petrel

Range: Oceanic in the nw and c Pacific. Breeds on the Ogasawara Is., Iwo Is., and Leeward Hawaiian Is.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (MB: Kitanoshima I., FB: Chichijima Is.), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., MB: Minami-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (IV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (MB: 北之島, FB: 父島列島), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島, MB: 南硫黄島), 南鳥島 (IV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

大洋の島で繁殖し, 海上に生息する.

97. *Pterodroma longirostris* (Stejneger, 1893) ヒメシロハラミズナギドリ

Hime-shirohara-mizunagidori Stejneger's Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, wintering in subtropical seas. Breeds on Mas Afuera, Juan Fernandez Group.

Status: Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Sep. 1981, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Kyoto), Shikoku (AV: Tokushima, Oct. 1987, Kochi), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I.).

本州 (AV: 青森, 宮城, 1981 年 9 月, 茨城, 千葉, 神奈川, 京都), 四国 (AV: 徳島, 1987 年 10 月, 高知), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島).

CALONECTRIS Mathews & Iredale オオミズナギドリ属

98. *Calonectris leucomelas* (Temminck, 1836) オオミズナギドリ

O-mizunagidori Streaked Shearwater

Range: Oceanic in the w Pacific, wintering south to the Philippines, Moluccas,

and New Guinea. Breeds mainly on off-shore islands from s Hokkaido through Honshu to Kyushu, Izu Is., and s Ryukyu Is.; also coasts of Korea and China south to the Pescadore Is.

Status: Hokkaido (IV), Oshima-Oshima I. (MB), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV), Sanganjima I. (MB), Hideshima I. (MB), Kutsujima I. (MB), Awashima I. (MB), Nanatsujima I. (MB), Kanmurijima I. (MB), Oki (MB: Hoshinokamishima I., Shirashima I., Omorijima I., Ohakashima I., Okinoshima I.), Masuda-Takashima I. (MB), Shikoku (IV), Ojishima I. (MB), Birotto I. (MB), Kyushu (IV), Chikuzen-Okinoshima I. (MB), Ajikajima I. (MB), Okinokuroshima I. (MB), Danjo Is. (MB: Oshima I., Meshima I.), Kusagaki Is. (MB: Kaminoshima I.), Koshiki Is. (MB: Futagojima I., Nojima I.), Uji Is. (MB: Mukoujima I.), Sata-Birojima I. (MB), Izu Is. (MB: Oshima I., Toshima I., Niijima I., Miyakejima I., Kozushima I., Mikurajima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (MB: Akusekijima I., Kodakarajima I., Kaminonejima I.), Amami Is. (MB: Hanmyajima I.), Yaeyama Is. (MB: Nakanokamishima I.), Senkaku Is. (MB).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 渡島大島 (MB), 南千島 (IV), 本州 (IV), 三貫島 (MB), 日出島 (MB), 杓島 (MB), 栗島 (MB), 七ツ島 (MB), 冠島 (MB), 隠岐 (MB: 星神島, 白島, 大森島, 大波加島, 沖ノ島), 益田高島 (MB), 四国 (IV), 小地島 (MB), 蒲葵島 (MB), 九州 (IV), 筑前沖ノ島 (MB), 阿値賀島 (MB), 沖黒島 (MB), 男女群島 (MB: 男島, 女島), 草垣諸島 (MB: 上ノ島), 甕島諸島 (MB: 双子島, 野島), 宇治群島 (MB: 向島), 佐多枇榔島 (MB), 伊豆諸島 (MB: 大島, 利島, 新島, 三宅島, 神津島, 御蔵島, 八丈島), トカラ列島 (MB: 悪石島, 小宝島, 上ノ根島), 奄美諸島 (MB: ハンミヤ島), 八重山諸島 (MB: 仲ノ神島), 尖閣列島 (MB).

北海道から九州までの周辺の島で繁殖し, 海上に生息する.

PUFFINUS Brisson ハイイロミズナギドリ属

99. *Puffinus pacificus* (Gmelin, 1789) オナガミズナギドリ

Onaga-mizunagidori Wedge-tailed Shearwater

Range: Oceanic in the c and s Pacific and Indian oceans. Breeds on islands in the subtropical and tropical Pacific and Indian oceans.

99-1. *Puffinus pacificus cuneatus* Salvin, 1888 オナガミズナギドリ

Range: Breeds on the Ogasawara Is., Iwo Is., and Hawaiian Is. Winters in the

subtropical and tropical Pacific.

Status: Honshu (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kochi), Izu Is. (IV: Torishima I.), Ogasawara Is. (MB), Iwo Is. (MB), Tokara Is. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Kerama Is., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Pelagic.

本州 (AV), 四国 (AV: 徳島, 高知), 伊豆諸島 (IV: 鳥島), 小笠原群島 (MB), 硫黄列島 (MB), トカラ列島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 慶良間諸島, 宮古島, 石垣島, 与那国島, 波照間島).

大洋の島で繁殖し, 海上に生息する.

100. *Puffinus bulleri* Salvin, 1888 ミナミオナガミズナギドリ

Minami-onaga-mizunagidori Buller's Shearwater

Range: Oceanic in the Pacific, migrating north to Japan and Alaska. Breeds on islands off North Island, New Zealand.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Chiba, Jun. 2004, Kanagawa, Jun. 1984, Aichi).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 千葉, 2004 年 6 月, 神奈川, 1984 年 6 月, 愛知).

101. *Puffinus griseus* (Gmelin, 1789) ハイイロミズナギドリ

Haiiro-mizunagidori Sooty Shearwater

Range: Oceanic in the Pacific, Atlantic and Antarctic oceans, migrating north to the Arctic Sea. Breeds on New Zealand and adjacent islands, islands on the Chilean coast, and Falkland Is.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Kyushu (PV), Izu Is. (PV), Amami Is. (PV), Okinawa Is. (PV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 九州 (PV), 伊豆諸島 (PV), 奄美諸島 (PV), 沖縄諸島 (PV).

海上に生息する.

102. *Puffinus tenuirostris* (Temminck, 1836) ハシボソミズナギドリ

Hashiboso-mizunagidori Short-tailed Shearwater

Range: Oceanic in the Pacific, migrating north to the Bering Sea. Breeds on Tasmania, islands in the Bass Strait, and se coast of Australia. Recorded from

Sakhalin, Kurile Is., and Korea.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (PV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Kumejima I., Kerama Is., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Pelagic, coastal seas.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (PV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 久米島, 慶良間諸島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

海上に生息する.

103. *Puffinus creatopus* Coues, 1864 シロハラアカアシミズナギドリ

Shirohara-akaashi-mizunagidori Pink-footed Shearwater

Range: Oceanic in the e Pacific. Breeds on Juan Fernandez Is. and Mocha I.

Status: Honshu (AV: Chiba, Feb. 1999, Jun. 2008).

本州 (AV: 千葉, 1999 年 2 月, 2008 年 6 月).

104. *Puffinus carneipes* Gould, 1844 アカアシミズナギドリ

Aka-ashi-mizunagidori Flesh-footed Shearwater

Range: Oceanic in the Pacific and Indian oceans, wintering in the Arabian Sea and Japanese and Hawaiian waters. Breeds on islands off sw Australia, off North Island, New Zealand and Lord Howe I.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Kyushu (WV), Izu Is. (PV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (PV), Okinawajima I. (WV), Yonagunijima I. (IV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 九州 (WV), 伊豆諸島 (PV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (PV), 沖縄島 (WV), 与那国島 (IV).

海上に生息する.

105. *Puffinus nativitatis* Streets, 1877 コミズナギドリ

Ko-mizunagidori Christmas Shearwater

Range: Oceanic in the subtropical and tropical c Pacific. Breeds from the Hawaiian Is. to Easter I.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Nagano, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Wakaya-

ma). Minami-Torishima I. (FB).

Habitat: Pelagic.

本州 (AV: 宮城, 長野, 千葉, 神奈川, 石川, 和歌山). 南鳥島 (FB).
海上に生息する.

106. *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764) マンクスミズナギドリ

Mankusu-mizunagidori Manx Shearwater

Range: Oceanic in the Atlantic, migrating south to off Argentina and south Africa. Breeds on islets off the east coast of the US and the west coast of the Europe and n Africa.

Status: Honshu (AV: Mie, Jun. - Jul. 2004).

本州 (AV: 三重, 2004 年 6 - 7 月).

107. *Puffinus newelli* Henshaw, 1900 ハワイセグロミズナギドリ

Hawai-seguro-mizunagidori Newell's Shearwater

Range: Oceanic in the c Pacific. Breeds on Hawaiian Is.

Status: Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Nov. 2006).

小笠原群島 (AV: 父島, 2006 年 11 月).

108. *Puffinus lherminieri* Lesson, 1839 セグロミズナギドリ

Seguro-mizunagidori Audubon's Shearwater

Range: Oceanic in the subtropical and tropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in the c and sw Pacific, Indian Ocean, and Caribbean Sea; also Galapagos Is. Mainly sedentary.

108-1. *Puffinus lherminieri bannermani* Mathews & Iredale, 1915 セグロミズナギドリ

Range: Breeds on the Ogasawara Is. and Minami-Iwoto I. Winters at sea mainly in the vicinities of the breeding area.

Status: Honshu (AV: Ibaraki), Ogasawara Is. (MB: Higashijima I.), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., MB: Minami-Iwoto I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kerama Is., Ishigakijima I.).

Habitat: Pelagic, offshore waters around breeding ground.

本州 (AV: 茨城), 小笠原群島 (MB: 東島), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島, MB: 南硫黄島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 慶良間諸島, 石垣島).
海上に生息する.

109. *Puffinus bryani* Pyle, Welch & Fleischer, 2011 オガサワラヒメミズナギドリ

Ogasawara-hime-mizunagidori Bryan's Shearwater

Range: Recorded on the Midway Atoll and Ogasawara Is. Breeding and wintering ranges are unknown.

Status: Ogasawara Is. (IV: Hahajima I., Apr. 1997, Chichijima I., Jan. 2005, etc.).

Habitat: Pelagic.

小笠原群島 (IV: 母島, 1997 年 4 月, 父島, 2005 年 1 月等).

海上に生息する.

BULWERIA Bonaparte アナドリ属

110. *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828) アナドリ

Anadori Bulwer's Petrel

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Atlantic, Indian and Pacific oceans. Breeds on the Ogasawara Is., Iwo Is., w Hawaiian Is., Phoenix Is., and Marquesas; also on the Azores, Madeiras, Salvages, Canaries, and Cape Verde.

Status: Honshu (AV: Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Chiba, Kanagawa, Ishikawa, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shimane), Shikoku (AV: Tokushima, Kochi), Kyushu (MB: Miyazaki. AV: Kagoshima), Mageshima I. (AV), Izu Is. (MB), Ogasawara Is. (MB: Mukojima Is., Chichijima Is., Hahajima Is., Nishinoshima I.), Iwo Is. (MB: Minami-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (MB: Hanmyajima I., WV: Tokunoshima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I.), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., MB: Nakanokamishima I.).

Habitat: Pelagic.

本州 (AV: 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 千葉, 神奈川, 石川, 大阪, 京都, 兵庫, 島根), 四国 (AV: 徳島, 高知), 九州 (MB: 宮崎. AV: 鹿児島), 馬毛島 (AV), 伊豆諸島 (MB), 小笠原群島 (MB: 聳島列島, 父島列島, 母島列島, 西之島), 硫黄列島 (MB: 南硫黄島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (MB: ハンミヤ島, WV: 徳之島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (AV: 石垣島, 西表島, 与那国島, MB: 仲ノ神島).

海上に生息する.

Family HYDROBATIDAE ウミツバメ科

OCEANITES Keyserling & Blasius アシナガウミツバメ属

111. *Oceanites oceanicus* (Kuhl, 1820) アシナガウミツバメ

Ashinaga-umitsubame Wilson's Storm Petrel

Range: Oceanic in the Pacific, Indian, Atlantic oceans and Antarctic Sea, migrating north to the n Pacific, n Indian and n Atlantic oceans. Breeds on Antarctica and islands in the antarctic and subantarctic zones.

111-1. *Oceanites oceanicus exasperatus* Mathews, 1912 アシナガウミツバメ

Range: Breeds on the South Orkneys, South Shetlands, South Sandwich Is., and along coasts of the Antarctic Continent. Migrates to the n Pacific, Arabian Sea, and n Atlantic; casual in Japan.

Status: Honshu (AV: Iwate, Miyagi, Chiba, Ibaraki, Jul. 2008), Izu Is. (AV: Torishima I.).

本州 (AV: 岩手, 宮城, 千葉, 茨城, 2008 年 7 月), 伊豆諸島 (AV: 鳥島).

OCEANODROMA Reichenbach オーストンウミツバメ属

112. *Oceanodroma castro* (Harcourt, 1851) クロコシジロウミツバメ

Kuro-koshijiro-umitsubame Band-rumped Storm Petrel

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific and Atlantic oceans north to Japan. Breeds on Hideshima I. and Sanganjima I. off n Honshu, Hawaiian Is., Galapagos Is., Azores Is. and islands off w Africa.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (PV: Aomori, Iwate, Miyagi, Ibaraki. AV: Akita, Yamagata, Niigata, Tochigi, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Fukui, Nara), Hideshima I. (MB), Sanganjima I. (MB), Kyushu (AV: Kagoshima), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Pelagic, on warm currents.

北海道 (AV), 本州 (PV: 青森, 岩手, 宮城, 茨城. AV: 秋田, 山形, 新潟, 栃木, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 岐阜, 石川, 福井, 奈良), 日出島 (MB), 三貫島 (MB), 九州 (AV: 鹿児島), 沖縄島 (AV).

島で繁殖し, 海上に生息する.

113. *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867) ヒメクロウミツバメ

Hime-kuro-umitsubame Swinhoe's Storm Petrel

Range: Oceanic in the w Pacific and n Indian oceans, migrating to the coasts of the Malay Peninsula, Sumatra, Java, and Arabian Peninsula. Breeds on islands of Japan, se Russia, Korea, e China, and Taiwan.

Status: Honshu (MB: Aomori), Sanganjima I. (MB), Nanatsujima-Oshima I. (FB), Kutsujima I. (MB), Oki (MB), Chikuzen-Okinoshima I. (MB), Izu Is. (MB: Onbasejima I., Kojine I., PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Pelagic, on warm currents.

本州 (MB: 青森), 三貫島 (MB), 七ツ島大島 (FB), 沓島 (MB), 隠岐 (MB), 筑前沖ノ島 (MB), 伊豆諸島 (MB: 恩馳島, 小池根, PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 石垣島, 西表島).

島で繁殖し, 海上に生息する.

114. *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818) コシジロウミツバメ

Koshijiro-umitsubame Leach's Storm Petrel

Range: Oceanic in the n Pacific and n Atlantic oceans, wintering mainly in tropical waters and occasionally reaching the Cape Sea, Indian Ocean, Australia, and New Zealand. Breeds on islands in the n Pacific and n Atlantic.

114-1. *Oceanodroma leucorhoa leucorhoa* (Vieillot, 1818) コシジロウミツバメ

Range: Breeds on Daikokujima I. in Hokkaido, Kurile Is., Commander Is., and Aleutian Is. to the w coast of Alaska; also Atlantic coasts south to Massachusetts and British Isles. Recorded from the Pacific coasts and islands of Japan south to the Ogasawara Is. and Hawaiian Is.

Status: Hokkaido (WV), Daikokujima I. (MB), Habomaimoshirito I. (MB), s Kurile Is. (WV. MB: Shikotanto I., Suishoto I., Akiyurito I.), Honshu (WV: Aomori, Iwate. AV: Yamagata, Miyagi, Niigata, Fukushima, Toyama, Chiba, Shizuoka, Gifu, Mie), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Miyazaki), Izu Is. (AV), Ogasawara Is. (AV), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Pelagic, on warm (in winter) to cold (in summer) currents.

北海道 (WV), 大黒島 (MB), ハボマイモシリ島 (MB), 南千島 (WV. MB: 色丹島, 水晶島, 秋勇留島), 本州 (WV: 青森, 岩手. AV: 山形, 宮城, 新潟, 福島, 富山, 千葉, 静岡, 岐阜, 三重), 四国 (AV: 徳島), 九州

(AV: 宮崎), 伊豆諸島 (AV), 小笠原群島 (AV), 沖縄島 (AV).
大黒島や南千島で繁殖し, それ以外の海域では冬に生息する.

115. *Oceanodroma tristrami* Salvin, 1896 オーストンウミツバメ

Osuton-umitsubame Tristram's Storm Petrel

Range: Oceanic in the c Pacific north to Japanese waters. Breeds on the Izu Is. (Kozu Group and Torishima I.), Iwo Is. (Kita-Iwoto I.), and Leeward Hawaiian Is. (Laysan and Midway).

Status: Honshu (PV: Aomori, Iwate, Miyagi, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Niigata, Shizuoka, Wakayama, Shimane), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Kagoshima), Izu Is. (MB: Hachijo-Kojima I., Hebijima I., Onbasejima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (MB), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I.), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Pelagic, on cooler warm currents.

本州 (PV: 青森, 岩手, 宮城, 茨城, 千葉, 神奈川, 新潟, 静岡, 和歌山, 島根), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 鹿児島), 伊豆諸島 (MB: 八丈小島, 蛇島, 恩馳島, 鳥島), 小笠原群島 (MB), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島), 沖縄島 (AV).

島で繁殖し, 海上に生息する.

116. *Oceanodroma matsudairae* Kuroda, 1922 クロウミツバメ

Kuro-umitsubame Matsudaira's Storm Petrel

Range: Oceanic in the w Pacific and n Indian oceans, migrating to the e African coast. Known to breed only on the Iwo Is.

Status: Honshu (IV: Miyagi, Ibaraki, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Ishikawa), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., MB: Minami-Iwoto I.), Miyakojima I. (AV), Ishigakijima I. (AV).

Habitat: Pelagic, on warm and tropical waters.

本州 (IV: 宮城, 茨城, 千葉, 埼玉, 神奈川, 静岡, 石川), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島, MB: 南硫黄島), 宮古島 (AV), 石垣島 (AV).

島で繁殖し, 海上に生息する.

117. *Oceanodroma furcata* (Gmelin, 1789) ハイイロウミツバメ

Haiiro-umitsubame Fork-tailed Storm Petrel

Range: Oceanic in the n Pacific, wintering south to n Japan, Hawaiian Is., and

s California. Breeds on coasts and islands in the n Pacific and Bering Sea south to the n and c Kurile Is. and n California.

117-1. *Oceanodroma furcata furcata* (Gmelin, 1789) ハイイロウミツバメ

Range: Breeds on the n and c Kurile Is. (south to Simushir I.), Kamchatka, Commander Is., and Aleutian Is. Winters in Japanese and Hawaiian waters.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV: Aomori, PV. AV: Akita, Iwate, Miyagi, Niigata, Nagano, Ibaraki, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Ishikawa, Hyogo), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Nijijima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV), Minami-Torishima I. (AV).

Habitat: Pelagic, on cold waters.

北海道 (WV), 南千島 (PV), 本州 (WV: 青森, PV. AV: 秋田, 岩手, 宮城, 新潟, 長野, 茨城, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 石川, 兵庫), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 新島, 八丈島), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV), 南鳥島 (AV).

海上に生息する.

Order CICONIIFORMES コウノトリ目

Family CICONIIDAE コウノトリ科

CICONIA Brisson コウノトリ属

118. *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) ナベコウ

Nabe-ko Black Stork

Range: Palearctic and Afrotropical. Breeds from s and c Europe across Eurasia to the Amur Basin and Ussuriland, south to Asia Minor, Iran, nw China, Mongolia, Manchuria, and n Korea; also s Africa. Winters to tropical Africa, Middle East, n India, se Asia, and e China. Recorded from Sakhalin, Japan, and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Niigata, Gunma, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Gifu, Fukui, Mie, Kyoto, Hyogo, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Futaojima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Oita, Mi-

yazaki, Kagoshima), Tanegashima I. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Tokara Is. (AV), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I.), Sakishima Is. (IV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Rice fields, marshes.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 新潟, 群馬, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 静岡, 愛知, 岐阜, 福井, 三重, 京都, 兵庫, 岡山, 島根, 広島, 山口), 蓋井島 (AV), 四国 (AV: 香川, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 種子島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), トカラ列島 (AV), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島), 先島諸島 (IV: 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

水田や湿原に生息する.

119. *Ciconia boyciana* Swinhoe, 1873 コウノトリ

Konotori Oriental Stork

Range: E Palearctic. Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan (formerly locally resident in c and w Honshu). Winters to e China south to Fukien, occasionally to Japan and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV. FB: Saitama, Tokyo, Fukui, Hyogo, IB: Hyogo), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Kohamajima I., Hatomajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.). Reintroduced into Hyogo since 2005. Released individuals were recorded in Nagano, Yamanashi, Fukui, etc.

Habitat: Rice fields, river bed, shallow lakes.

北海道 (IV), 本州 (IV. FB: 埼玉, 東京, 福井, 兵庫, IB: 兵庫), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 小浜島, 鳩間島, 西表島, 与那国島). 兵庫では 2005 年から飼育個体を放鳥している. 長野, 山梨, 福井などで放鳥個体の飛来が観察されている.

水田, 河川敷, 湖沼に生息する.

Order SULIFORMES カツオドリ目

Family FREGATIDAE ゲンカンドリ科

FREGATA Lacépède ゲンカンドリ属

120. *Fregata minor* (Gmelin, 1789) オオゲンカンドリ

O-gunkandori Great Frigatebird

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in tropical seas. Non-migratory, but disperses in tropical seas and strays frequently.

120-1. *Fregata minor minor* (Gmelin, 1789) オオゲンカンドリ

Range: Breeds on the Chagos Is., Cocos-Keeling Is., and Christmas I. in the Indian Ocean and Paracel Is. in the South China Sea. Distributed from the e Indian Ocean to the sw Pacific.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Iwate, Niigata, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Nara, Wakayama, Hyogo, Hiroshima), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Oita, Miyazaki, Kagoshima), Izu Is. (AV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Minami-Torishima I. (FB), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Nakanokamishima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (AV), 本州 (AV: 岩手, 新潟, 千葉, 神奈川, 静岡, 愛知, 奈良, 和歌山, 兵庫, 広島), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 大分, 宮崎, 鹿児島), 伊豆諸島 (AV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), 南鳥島 (FB), 奄美諸島 (AV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 仲ノ神島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

海上に生息し, まれに港湾で観察される.

121. *Fregata ariel* (Gray, 1845) コゲンカンドリ

Ko-gunkandori Lesser Frigatebird

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic

oceans, chiefly the s Pacific. Breeds on islands in tropical and subtropical seas. Non-migratory, but disperses in tropical seas and strays frequently.

121-1. *Fregata ariel ariel* (Gray, 1845) コグンカンドリ

Range: Breeds on islands in the Indian Ocean and c and sw Pacific, south to Australia and New Zealand. Recorded from China and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV), Sado (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV), Kyushu (AV), Kusagaki Is. (IV), Izu Is. (IV: Oshima I., Nijima I.), Ogasawara Is. (IV), Minami-Torishima I. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Oceanic islands and coast, aerial.

北海道 (AV), 本州 (AV), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV), 九州 (AV), 草垣諸島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 新島), 小笠原群島 (IV), 南鳥島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 喜界島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

海上に生息し, まれに港湾で観察される.

Family SULIDAE カツオドリ科

SULA Brisson カツオドリ属

122. *Sula dactylatra* Lesson, 1831 アオツラカツオドリ

Aotsura-katsuodori Masked Booby

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in tropical and subtropical seas. Sedentary.

122-1. *Sula dactylatra personata* Gould, 1846 アオツラカツオドリ

Range: Breeds on islands in the tropical Pacific south to Australia and east to the Easter Is.; recorded from Japan.

Status: Honshu (AV: Chiba), Shikoku (AV: Kagawa), Kyushu (AV: Nagasaki), Sado (AV), Izu Is. (AV: Shikinejima I.), Ogasawara Is. (MB: Nishinoshima I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I.), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (AV: Iriomotejima I., Nakanokamishima I.,

Yonagunijima I.).

Habitat: Oceanic islands and sea.

本州 (AV: 千葉), 四国 (AV: 香川), 九州 (AV: 長崎), 佐渡 (AV), 伊豆諸島 (AV: 式根島), 小笠原群島 (MB: 西之島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (AV: 西表島, 仲ノ神島, 与那国島).

洋上に生息し, 島で繁殖をする.

123. *Sula sula* (Linnaeus, 1766) アカアシカツオドリ

Aka-ashi-katsuodori Red-footed Booby

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in tropical and subtropical seas. Sedentary.

123-1. *Sula sula rubripes* Gould, 1838 アカアシカツオドリ

Range: Breeds on islands in the Indian and tropical w Pacific oceans, north to the s Ryukyu Is.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Miyagi, Niigata, Gunma, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Shiga, Osaka), Sado (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki), Ogasawara Is. (CB: Hahajima I., Jun. 1996. IV), Iwo Is. (WV: Kita-Iwoto I., Minami-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (IV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I.), Okinawajima I. (IV), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (CB: Nakanokamishima I. AV: Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Islands, sea coasts.

北海道 (AV), 本州 (AV: 宮城, 新潟, 群馬, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 滋賀, 大阪), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 福岡, 長崎), 小笠原群島 (CB: 母島, 1996 年 6 月. IV), 硫黄列島 (WV: 北硫黄島, 南硫黄島), 南鳥島 (IV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島), 沖縄島 (IV), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (CB: 仲ノ神島. AV: 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

島や沿岸海域に生息する.

124. *Sula leucogaster* (Boddaert, 1783) カツオドリ

Katsuodori Brown Booby

Range: Oceanic in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Breeds on islands in tropical and subtropical seas. Sedentary.

124-1. *Sula leucogaster plotus* (Forster, 1844) カツオドリ

Range: Breeds from islands in the Red Sea and Indian Ocean east to Australia and Tuamotu Is., north to s Japan and Ogasawara Is.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Fukui, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shimane, Yamaguchi), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga. WV: Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki), Tsushima (AV), Danjo Is. (WV), Kusagaki Is. (MB), Yakushima I. (IV), Izu Is. (MB: Inambajima I., Sumisujima I.), Ogasawara Is. (MB), Iwo Is. (MB), Tokara Is. (MB: Gajajima I.), Amami Is. (IV), Okinawa Is. (MB: Agunijima I. IV: Okinawajima I.), Miyakojima I. (CB), Yaeyama Is. (MB: Nakanokamishima I., IV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Senkaku Is. (MB), Daito Is. (AV).

Habitat: Oceanic islands, sea shores.

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 福井, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 島根, 山口), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀. WV: 長崎, 熊本, 宮崎), 対馬 (AV), 男女群島 (WV), 草垣諸島 (MB), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (MB: 藺難波島, 須美寿島), 小笠原群島 (MB), 硫黄列島 (MB), トカラ列島 (MB: 臥蛇島), 奄美諸島 (IV), 沖縄諸島 (MB: 粟国島. IV: 沖縄島), 宮古島 (CB), 八重山諸島 (MB: 仲ノ神島, IV: 石垣島, 西表島, 与那国島), 尖閣列島 (MB), 大東諸島 (AV).

太平洋島や海上に生息する.

124-2. *Sula leucogaster brewsteri* Goss, 1888 シロガシラカツオドリ

Range: Breeds on islands in the Gulf of California and w Mexico.

Status: Yaeyama Is. (AV: Nakanokamishima I., May 2009).

八重山諸島 (AV: 仲ノ神島, 2009 年 5 月).

Family PHALACROCORACIDAE ウ科

PHALACROCORAX Brisson ウ属

125. *Phalacrocorax pelagicus* Pallas, 1811 ヒメウ

Hime-u Pelagic Cormorant

Range: Holarctic. Breeds in the n Pacific from Wrangel I. across the Bering Sea coast to sw Alaska and California, south to the Okhotsk coast, Kamchatka, Commander Is., Sakhalin, Kurile Is., and n Japan. Northern birds winter to temperate regions south to the coasts of Kyushu, s Korea, e China to Kwangtung, and Vancouver I. in Canada.

125-1. *Phalacrocorax pelagicus pelagicus* Pallas, 1811 ヒメウ

Range: Range of the species except the Pacific coast of the US and Baja California.

Status: Hokkaido (PV), Teurito I. (RB), Moyururito I. (RB), s Kurile Is. (RB, PV), n Honshu (RB: Iwate, Niigata, PV), c and sw Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (RB: Oita. WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (AV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Island, pelagic, coastal regions.

北海道 (PV), 天売島 (RB), モユルリ島 (RB), 南千島 (RB, PV), 本州北部 (RB: 岩手, 新潟, PV), 本州中・南西部 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (RB: 大分. WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (AV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV).

島, 海上, 海岸に生息する.

126. *Phalacrocorax urile* (Gmelin, 1789) チシマウガラス

Chishima-ugarasu Red-faced Cormorant

Range: N Holarctic. Breeds on the Aleutian Is., subarctic Bering Sea islands, and coast of s Alaska, south to the Kurile Is. and Hokkaido. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (WV), Yururito I. (MB), Moyururito I. (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (WV: Aomori, Iwate, Miyagi, Niigata), c Honshu (AV: Ishikawa).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), ユルリ島 (MB), モユルリ島 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (WV: 青森, 岩手, 宮城, 新潟), 本州中部 (AV: 石川).

島, 海上, 海岸に生息する.

127. *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) カワウ

Kawa-u Great Cormorant

Range: Afro-Eurasian, Australasian and Nearctic. Breeds in discontinuous distribution from ne Europe to India, China and Japan; also Iceland, sw Greenland, Atlantic coast of Canada, Africa, Australia, and New Zealand, Mainly sedentary.

127-1. *Phalacrocorax carbo hanedae* Kuroda, 1925 カワウ

Range: Breeds in Japan, but rare in Hokkaido and breeding colonies locally in Honshu, Shikoku, and Kyushu. Recorded from Sakhalin, Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV), Honshu (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB, WV), Tsushima (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rivers, lakes, coastal waters.

北海道 (MB), 南千島 (IV), 本州 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB, WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV: 鴛島, 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

河川, 湖沼, 海岸に生息する.

128. *Phalacrocorax capillatus* (Temminck & Schlegel, 1849) ウミウ

Umi-u Japanese Cormorant

Range: E Palearctic. Confined to Japan and adjacent Asian coasts. Disperses in winter throughout the Japanese coast, some reaching the coast of e China and Taiwan.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB, WV), Sado (RB), Oki (WV), Tsunoshima I. (RB), Shikoku (WV), Kyushu (RB, WV), Tsushima (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I.).

Habitat: Coastal-pelagic, lakes, lower parts of rivers.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB, WV), 佐渡 (RB), 隠岐 (WV), 角島 (RB), 四国 (WV), 九州 (RB, WV), 対馬 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV), トカラ列島 (IV), 奄美

諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 宮古島, 西表島, 黒島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島).

沿岸部, 河川下流部に生息する.

Order PELECANIFORMES ペリカン目

Family PELECANIDAE ペリカン科

PELECANUS Linnaeus ペリカン属

129. *Pelecanus onocrotalus* Linnaeus, 1758 モモイロペリカン

Momoiro-perikan Great White Pelican

Range: Temperate and tropical Eurasian and Afrotropical. Breeds in se Europe, sporadically in the Middle East, c Asia, and tropical and s Africa. Wanders in areas from the Mediterranean to se China and Malay Peninsula; also wanders widely in Africa.

Status: Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Jul. 1983, Tokashikijima I., Jul. 1983, Ishigakijima I., Mar. 1979, Iriomotejima I., Apr. 1979).

琉球諸島 (AV: 沖縄島, 1983 年 7 月, 渡嘉敷島, 1983 年 7 月, 石垣島, 1979 年 3 月, 西表島, 1979 年 4 月).

130. *Pelecanus philippensis* Gmelin, 1789 ホシバシペリカン

Hoshibashi-perikan Spot-billed Pelican

Range: Indomalayan. Formerly widespread in s and se Asia, but now breeds in Sri Lanka, se India, Cambodia, and probably Sumatra.

Status: Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Jul. - Sep. 2006, Kikaijima I., Aug. 2006).

奄美諸島 (AV: 奄美大島, 2006 年 7 - 9 月, 喜界島, 2006 年 8 月).

131. *Pelecanus crispus* Bruch, 1832 ハイイロペリカン

Haiiro-perikan Dalmatian Pelican

Range: Temperate and tropical Eurasian. Breeds from se Europe to c Asia, Mongolia, and nw China. Winters in s Iran and n India; casual in Italy, Egypt,

and se China. Recorded from Korea, Japan, and Taiwan.

Status: Honshu (AV: Niigata, Ibaraki, Apr. 1969, Dec. 1998, Chiba, Shizuoka, Dec. 1998, Ishikawa, Oct. 1998, Tottori, Shimane, May 1978, Apr. 1998, Yamaguchi, Apr. 1998), Kyushu (AV: Fukuoka, 1941, Miyazaki, Kagoshima), Miyakojima I. (AV: Jan. 2000), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I.).

本州 (AV: 新潟, 茨城, 1969 年 4 月, 1998 年 12 月, 千葉, 静岡, 1998 年 12 月, 石川, 1998 年 10 月, 鳥取, 島根, 1978 年 5 月, 1998 年 4 月, 山口, 1998 年 4 月), 九州 (AV: 福岡, 1941 年, 宮崎, 鹿児島), 宮古島 (AV: 2000 年 1 月), 八重山諸島 (AV: 石垣島).

Family ARDEIDAE サギ科

BOTAURUS Stephens サンカノゴイ属

132. *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) サンカノゴイ

Sankano-goi Eurasian Bittern

Range: Palearctic, locally Afrotropical. Breeds discontinuously from Europe and nw Africa east across Eurasia to the Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and n Japan, south to Asia Minor, Iran, Mongolia, and Hopeh in e China; also s Africa. Winters in temperate and tropical Eurasia and e and c Africa.

132-1. *Botaurus stellaris stellaris* (Linnaeus, 1758) サンカノゴイ

Range: Range of the species except s Africa.

Status: Hokkaido (FB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), n and c Honshu (FB: Iwate. CB: Ibaraki, Ishikawa. RB: Chiba, Shiga. WV), sw Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Iki (WV), Tsushima (IV), Chikuzen-Okinoshima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Marshes.

北海道 (FB), 南千島 (IV: 国後島), 本州北・中部 (FB: 岩手. CB: 茨城, 石川. RB: 千葉, 滋賀. WV), 本州南西部 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 壱岐 (WV), 対馬 (IV), 筑前沖ノ島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (AV), 奄

美大島 (IV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 伊平屋島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

広大なヨシ原にすむ.

IXOBRYCHUS Billberg ヨシゴイ属

133. *Ixobrychus sinensis* (Gmelin, 1789) ヨシゴイ

Yoshi-goi Yellow Bittern

Range: Asiatic, marginally Australasian. Breeds in temperate to tropical Asia, east to Sakhalin and Japan, south to India, Sri Lanka, Malay Peninsula, Philippines, Micronesia, Indonesia, and New Guinea. Northern bird migratory.

133-1. *Ixobrychus sinensis sinensis* (Gmelin, 1789) ヨシゴイ

Range: Breeds in India, Sri Lanka, se Asia, China from Manchuria southward, and Japan from Hokkaido to Kyushu. Migratory and sedentary, Japanese birds wintering to the Ryukyu Is. and Taiwan. Recorded from Sakhalin, s Kurile Is., Korea, and Botel Tobago.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I.), Honshu (MB), Sado (MB), Oki (MB), Mishima I. (IV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (RB).

Habitat: Reed beds, grown rice fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島), 本州 (MB), 佐渡 (MB), 隠岐 (MB), 見島 (IV), 四国 (MB), 九州 (MB), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (RB).

ヨシ原や水田に生息する.

133-2. *Ixobrychus sinensis bryani* (Seale, 1901) マリアナヨシゴイ

Range: Breeds on the Palau Is., Mariana Is., and Caroline Is.; straggles to Japan.

Status: Honshu (AV: Shizuoka, Oct. 1937). No reliable records over the last 50 years.

本州 (AV: 静岡, 1937 年 10 月). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

134. *Ixobrychus eurhythmus* (Swinhoe, 1873) オオヨシゴイ

O-yoshi-goi Von Schrenck's Bittern

Range: E Asiatic. Breeds in s Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuri-land, Korea, e China to Kwangtung and Szechwan, Sakhalin, and Japan. Winters to s China, Malay Peninsula, Philippines, and Indonesia. Recorded from Quelpart I. and Taiwan.

Status: Hokkaido (FB, IV), n and c Honshu (CB. PV), Sado (FB), Oki (FB), sw Honshu (WV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Danjo Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Reed bed, but also in drier grasslands.

北海道 (FB, IV), 本州北・中部 (CB. PV), 佐渡 (FB), 隠岐 (FB), 本州南西部 (WV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), 男女群島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (IV).

ヨシ原や草原に生息する.

135. *Ixobrychus cinnamomeus* (Gmelin, 1789) リュウキュウヨシゴイ

Ryukyu-yoshi-goi Cinnamon Bittern

Range: Asiatic. Breeds from India, Sri Lanka and Myanmar to se Asia, e China, Ryukyu Is., and Taiwan, south to the Malay Peninsula, Philippines, Greater and Lesser Sunda Is., Borneo, and Sulawesi. Sedentary.

Status: Honshu (AV: Aomori, Niigata, Saitama, Shimane), Kita-Iwoto I. (IV), Minami-Torishima I. (IV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (RB), Tokara Is. (AV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Kumejima I., Agunijima I., Izenajima I., Iheyajima I., Yagajishima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I. PV: Yonagunijima I.), Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, grassy marshes.

本州 (AV: 青森, 新潟, 埼玉, 島根), 北硫黄島 (IV), 南鳥島 (IV), 男女群島 (PV), 種子島 (RB), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 久米島, 粟国島, 伊是名島, 伊平屋島, 屋我地島, 渡嘉敷島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 竹富島. PV: 与那国島), 大東諸島 (RB: 北大

東島, 南大東島).
水田や草原に生息する.

136. *Ixobrychus flavicollis* (Latham, 1790) タカサゴクロサギ

Takasago-kuro-sagi Black Bittern

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from Pakistan and India through se Asia to s China, Taiwan, Philippines, Indonesia, New Guinea, Solomon islands, and Australia. Mainly sedentary, but northern birds may winter in the southern parts of the range.

136-1. *Ixobrychus flavicollis flavicollis* (Latham, 1790) タカサゴクロサギ

Range: Western part of the species range east to the Philippines and Sulawesi.

Status: Honshu (AV: Aomori, May 1997, Kanagawa, Nov. 2006, Hiroshima, Apr. 1990), Awashima I. (AV: May 1981), Mishima I. (AV: May 2006), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Danjo Is. (AV), Tokara Is. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Jun. 1997, Jun. 2003, Jun. 2008, Yonagunijima I., 2003, 2004, 2006, 2007).

本州 (AV: 青森, 1997 年 5 月, 神奈川, 2006 年 11 月, 広島, 1990 年 4 月), 粟島 (AV: 1981 年 5 月), 見島 (AV, 2006 年 5 月), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 男女群島 (AV), トカラ列島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 1997 年 6 月, 2003 年 6 月, 2008 年 6 月, 与那国島, 2003 年, 2004 年, 2006 年, 2007 年).

GORSACHIUS Bonaparte ミゾゴイ属

137. *Gorsachius goisagi* (Temminck, 1836) ミゾゴイ

Mizo-goï Japanese Night Heron

Range: E Palearctic. Breeds in Japan. Winters in the Ryukyu Is., Taiwan, s China, Philippines, and Moluccas. Recorded from Sakhalin (Moneron I.) and Palau Is. (Koror).

Status: Hokkaido (AV), Matsumae-Kojima I. (AV), Honshu (MB), Sado (MB), Oki (MB), Mishima I. (IV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Kikaijima I.), Ryukyu Is. (WV, PV: Okinawajima I., Kumejima I., Agunijima I., Iejima I., Mi-

yakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Broad-leaved forests at low elevations.

北海道 (AV), 松前小島 (AV), 本州 (MB), 佐渡 (MB), 隠岐 (MB), 見島 (IV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 喜界島), 琉球諸島 (WV, PV: 沖縄島, 久米島, 粟国島, 伊江島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

低山の広葉樹林に生息する.

138. *Gorsachius melanolophus* (Raffles, 1822) **ズグロミゾゴイ**

Zuguro-mizo-goi Malayan Night Heron

Range: Indomalayan. Breeds from India and Sri Lanka to se Asia, w and s China in Yunnan and Kwangsi, Hainan, Philippines, Greater Sunda Is., and Borneo, north to the s Ryukyu Is. Mainly sedentary; straggles to Shikoku and Palau Is.

Status: Rishirito I. (AV: Jan. 2000), Shikoku (AV: Tokushima), Miyakojima I. (RB), Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Forests, rarely reed beds.

利尻島 (AV: 2000 年 1 月), 四国 (AV: 徳島), 宮古島 (RB), 八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 与那国島).

森林に生息する. 徳島県阿南市ではヨシ原に出現.

NYCTICORAX Forster **ゴイサギ属**

139. *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) **ゴイサギ**

Goi-sagi Black-crowned Night Heron

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds in temperate and tropical Eurasia from s Europe to c Asia, India, Sri Lanka, se Asia, e China, Hainan, Taiwan, and Japan, south to Africa (locally), Madagascar, and Indonesian islands; also North America from s Canada southward, Middle America, West Indies, whole South America, and Hawaiian Is. Northern birds migratory, wintering in warmer areas.

139-1. *Nycticorax nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) ゴイサギ

Range: Range of the species except s South America. Japanese birds migrate to Taiwan and Philippines.

Status: Hokkaido (CB), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (PV), Iwo Is. (PV), Tokara Is. (MB), Amami-Oshima I. (RB), Ryukyu Is. (RB: Oki-nawajima I., Miyakojima I. WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Paddy fields, marshes, salt water bays, inland waters. Nests in colonies in forest and bamboo thickets.

北海道 (CB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (PV), 硫黄列島 (PV), トカラ列島 (MB), 奄美大島 (RB), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 宮古島. WV), 大東諸島 (WV).

森林にコロニーで繁殖し, 水田, 湿地, 河川, 湖沼などに生息する.

140. *Nycticorax caledonicus* (Gmelin, 1789) ハシブトゴイ

Hashibuto-goi Nankeen Night Heron

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from Java and Philippines to the Lesser Sunda Is., Borneo, Sulawesi, Micronesian Is., Moluccas, New Guinea, Australia, and Melanesia. Formerly also the Ogasawara Is. Sedentary.

140-1. *Nycticorax caledonicus crassirostris* Vigors, 1839 ハシブトゴイ

Range: Resident on the Ogasawara Is.

Status: Ogasawara Is. (FB: Nakodojima I., Chichijima I.). Extinct.

Habitat: Forests.

小笠原群島 (FB: 媒島, 父島). 絶滅.

森林に生息していた.

BUTORIDES Blyth ササゴイ属

141. *Butorides striata* (Linnaeus, 1758) ササゴイ

Sasa-goi Striated Heron

Range: Nearly Cosmopolitan except North America. Breeds in Asia from India and Sri Lanka to e China, Manchuria, Korea, Ussuriland, and Japan, south to Malaysia, Indonesia, Australia, and Polynesia; also Somalia and tropical West Africa, Madagascar, and central and south Americas from e Panama south to c

Argentina. Northern birds winter to warmer areas.

141-1. *Butorides striata amurensis* (Schrenck, 1860) ササゴイ

Range: Breeds in the lower Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Winters to s China, Taiwan, Philippines, Borneo, and Palau Is. Recorded from Sakhalin.

Status: Hokkaido (AV), Teurito I. (IV), Honshu (MB), Sado (IV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB, WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (MB: Niiijima I., Shikinejima I., Miyakejima I. Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV, PV), Okinawa Is. (WV, PV), Sakishima Is. (WV, PV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (PV).

Habitat: Ponds, river beds, streams, marshes, rice fields.

北海道 (AV), 天売島 (IV), 本州 (MB), 佐渡 (IV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB, WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (MB: 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV, PV), 沖縄諸島 (WV, PV), 先島諸島 (WV, PV: 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV).

林や大木で繁殖し, 川や池に生息し, 水田などでも採餌する.

ARDEOLA Boie アカガシラサギ属

142. *Ardeola bacchus* (Bonaparte, 1855) アカガシラサギ

Akagashira-sagi Chinese Pond Heron

Range: E Asiatic. Breeds in China from c Manchuria southward, n Vietnam, Thailand, Myanmar, Assam, and Andaman Is., Winters in s China, Malay Peninsula, and Indonesia.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (CB: Akita, 1986. IV), Awashima I. (IV), Hegurajima I. (IV), Shikoku (IV), Kyushu (CB: Kumamoto, 1981, 1995, PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Agunijima I., Izenajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Irabujima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima

I., Yonagunijima I., Haterumajima I.). Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, ponds, creeks, marshes.

北海道 (IV), 本州 (CB: 秋田, 1986 年, IV), 粟島 (IV), 舩倉島 (IV), 四国 (IV), 九州 (CB: 熊本, 1981, 1995 年, PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 粟国島, 伊是名島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 伊良部島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島). 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

水田, 牧草地で採食し, サギ類のコロニーで繁殖例がある.

BUBULCUS Bonaparte アマサギ属

143. *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) アマサギ

Ama-sagi Cattle Egret

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds from s Europe to Asia Minor, Pakistan, India, se Asia, s China, Hainan, Taiwan, and s and c Japan; also Africa, Madagascar, Philippines, Indonesia, Australia, New Zealand, and Americas. Northern birds migratory, wintering to warmer areas.

143-1. *Bubulcus ibis coromandus* (Boddaert, 1783) アマサギ

Range: Breeds west to Pakistan and east to Japan, Taiwan, Moluccas, Australia, and New Zealand. Recorded from Ussuriland.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (MB), Sado (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Oshima I., Nii-jima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (PV), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Pastures, rice fields, marshes.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 国後島, 色丹島), 本州 (MB), 佐渡 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV),

屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (PV), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

サギ類のコロニーで繁殖し, 水田や牧草地で採餌する.

ARDEA Linnaeus アオサギ属

144. *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 アオサギ

Ao-sagi Grey Heron

Range: Eurasian and Afrotropical. Breeds from w Europe east across Eurasia to India, Sri Lanka, Myanmar, e China, Korea, Ussuriland, Sakhalin, and Japan; also Malay Peninsula, Sumatra, Java, greater part of Africa, and Madagascar. Migratory and sedentary, wintering to warmer areas.

144-1. *Ardea cinerea jouyi* Clark, 1907 アオサギ

Range: Breeds in Mongolia, e China, Korea, Sakhalin, and Japan, west to Myanmar. Recorded from the Kurile Is. (Urup I.) and Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (PV, WV: Oshima I., Miyakejima I., Nijima I., Shikinejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I., Mukojima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Izenajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Salt and freshwater marshes, river beds, reservoirs, paddy fields. Breeds in colony singly or mixed with other egrets.

北海道 (MB), 南千島 (IV), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (PV, WV: 大島, 三宅島, 新島, 式根島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島, 聳島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊是名島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

主に湖沼沿岸の森林またはサギ類のコロニーで営巣し, 干潟, 湖沼,

河川敷，水田などで採餌する。

145. *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 ムラサキサギ

Murasaki-sagi Purple Heron

Range: Temperate and tropical Eurasia and tropical Africa. Breeds in temperate and tropical Eurasia from sw Europe to India, se Asia, e China, Manchuria, s Ussuriland, and s Japan; also Philippines and Indonesia east to Sulawesi, Africa except the Sahara, and Madagascar. Mainly sedentary but disperses widely.

145-1. *Ardea purpurea manilensis* Meyen, 1834 ムラサキサギ

Range: Eastern part of the species range west to India. Northern birds partly migratory, wintering in s China, se Asia, and Philippines. Recorded from Sakhalin and Korea.

Status: Hokkaido (AV), Rishirito I. (AV), Honshu (AV), Sado (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV), Kyushu (AV), Danjo Is. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I., Iheya-jima I., Tokashikijima I., Kumejima I.), Sakishima Is. (WV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Kohamajima I., Yonagunijima I. RB: Ikemajima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Coastal marshes, tidal flat, mangroves.

北海道 (AV), 利尻島 (AV), 本州 (AV), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV), 九州 (AV), 男女群島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 沖永良部島, 与論島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 久米島), 先島諸島 (WV: 宮古島, 石垣島, 小浜島, 与那国島. RB: 池間島, 西表島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

沼や湿原，マングローブ林に生息する。

146. *Ardea alba* Linnaeus, 1758 ダイサギ

Dai-sagi Great Egret

Range: Cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds in temperate and tropical Eurasia from se Europe to India, e China, and Japan, south in se Asia to Australia and New Zealand; also Africa south of the Sahara, Madagascar, and s North America to South America. Northern birds migratory, wintering to warmer regions.

146-1. *Ardea alba alba* Linnaeus, 1758 ダイサギ

Range: Breeds from c and se Europe east to Transbaikalia, Amur Basin, and Ussuriland. Winters to c Africa, n India, Mongolia, China, and Korea, occasionally Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Oki (IV), Kyushu (IV), Ogasawara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Coastal reed beds, mud flats, marshes, river, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (IV), 隠岐 (IV), 九州 (IV), 小笠原群島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

アシ原, 干潟, 湿地, 河川, 水田などに生息し, 少数飛来する.

146-2. *Ardea alba modesta* Gray, 1831 チュウダイサギ

Range: Breeds from Pakistan and India to se Asia, e China, Korea, and Japan, south to the Philippines, Indonesia, Australia, and New Zealand. Mainly sedentary, but Japanese birds winter south to the Ryukyu Is., and Philippines.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Etorofuto I., Akiyurito I.), Honshu (RB, MB), Sado (CB), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB, MB), Kyushu (RB, MB), Tsushima (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (IV), Amami Is. (WV, PV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Agunijima I., Izenajima I., Iheyajima I., Kerama Is., Miyakojima I., Ishigakijima I., Kuroshima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Ponds, marshes, lakes, river beds, rice fields, tidal flats.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 択捉島, 秋勇留島), 本州 (RB, MB), 佐渡 (CB), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (RB, MB), 九州 (RB, MB), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (IV), 奄美諸島 (WV, PV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 粟国島, 伊是名島, 伊平屋島, 慶良間諸島, 宮古島, 石垣島, 黒島, 西表島, 与那国島).

サギ類のコロニーで繁殖し, 水田, 河川敷, 沼, 干潟などで採食する.

EGRETTA Forster コサギ属147. *Egretta intermedia* (Wagler, 1829) チュウサギ

Chu-sagi Intermediate Egret

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds in Asia from India and Sri Lanka to w and s China and c Japan; also Java, Australia, and Africa south of the Sahara. Northern birds migratory, wintering to s Japan, Taiwan, Philippines,

Thailand, and Indonesia.

147-1. *Egretta intermedia intermedia* (Wagler, 1829) チュウサギ

Range: Range of the species except Africa. Recorded from Ussuriland, Sakhalin, Korea, and Micronesia.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (MB, WV, FB: Tokyo, Osaka), Sado (MB), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB, WV), Kyushu (MB, WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Oshima I., Kozushima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is., Iwo Is. (WV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Izenajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Breeds in mixed colony with other egrets in bamboos, light woods. Inland marshes, rice fields.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (MB, WV, FB: 東京, 大阪), 佐渡 (MB), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (MB, WV), 九州 (MB, WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 神津島, 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島, 硫黄列島 (WV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 伊是名島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

サギ類のコロニーで繁殖し, 水田, 河川敷, 沼などで採餌する.

148. *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) コサギ

Ko-sagi Little Egret

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds from s Europe across Asia Minor to India, se Asia, e China, Philippines, Taiwan and Japan; also from Java to Australia and Africa (locally). Migratory and sedentary, wintering in warmer areas.

148-1. *Egretta garzetta garzetta* (Linnaeus, 1766) コサギ

Range: Range of the species except Java to Australia. Winters south to tropical Africa, Persian Gulf, se Asia, Malay Peninsula, and Philippines.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (RB, MB: n Honshu), Sado (RB), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV: Nijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (WV: Kita-Iwoto I.),

Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (CB: Okinawajima I., WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV, PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Breeds in mixed colony in bamboo bushes, light forests. Rice fields, inland marshes, tidal flats.

北海道 (IV), 本州 (RB, 北部で MB), 佐渡 (RB), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島), 硫黄列島 (WV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (CB: 沖縄島, WV: 沖縄島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV, PV: 北大東島, 南大東島).

サギ類のコロニーで繁殖し, 水田, 河川敷, 沼, 干潟などで採餌する.

149. *Egretta sacra* (Gmelin, 1789) クロサギ

Kuro-sagi Pacific Reef Heron

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from Myanmar and Malaysian coasts north to se China and s Japan, east through the Philippines and Indonesia to Micronesia, New Guinea, n Australia, New Zealand, and Polynesian islands. Sedentary.

149-1. *Egretta sacra sacra* (Gmelin, 1789) クロサギ

Range: Range of the species except New Caledonia and Loyalty I. Recorded from s Korea, Taiwan, Pescadore Is., Lu Tao I., and Lan Yu I.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (RB. CB: Ibaraki), Sado (RB), Awashima I. (RB), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB. FB: Fukuoka), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB).

Habitat: Rocky and muddy tidal coasts, island.

北海道 (AV), 本州 (RB. CB: 茨城), 佐渡 (RB), 粟島 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB. FB: 福岡), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 男女群島 (PV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB).

海岸の岩場, 砂浜, 干潟に生息する.

150. *Egretta eulophotes* (Swinhoe, 1860) カラシラサギ

Kara-shira-sagi Chinese Egret

Range: E Asiatic. Breeds in se China in Fukien and Kwantung, Hainan, and n Korea. Winters to the Malay Peninsula, Philippines, and Borneo, Recorded from Ussuriland, Japan, Taiwan, and Hong Kong.

Status: Hokkaido (AV), n and c Honshu (IV: Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Ishikawa, Aichi, Fukui), sw Honshu (PV: Mie, Osaka, Wakayama, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (PV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (PV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (PV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Tidal flats, sandy coasts, shallow waters.

北海道 (AV), 本州北・中部 (IV: 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 石川, 愛知, 福井), 本州南西部 (PV: 三重, 大阪, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (PV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (PV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (PV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

海岸の干潟, 砂浜, 浅瀬に生息する.

Family THRESKIORNITHIDAE トキ科

THRESKIORNIS Gray クロトキ属

151. *Threskiornis melanocephalus* (Latham, 1790) クロトキ

Kuro-toki Black-headed Ibis

Range: Asiatic. Breeds in Nepal, India, Sri Lanka, Indonesia, and e China in Hopeh and s Manchuria. Winters to se Asia, Malay Peninsula, s China, Philippines, and Borneo; occasionally in Japan and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Izu Is. (AV: Niiijima I., Mikurajima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I.), Yaeyama Is. (IV: Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Marshes, rice fields.

北海道 (AV), 本州 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 伊豆諸島 (AV: 新島, 御

蔵島), 小笠原群島 (AV: 父島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島), 八重山諸島 (IV: 石垣島, 西表島).

湿原や水田に生息する.

NIPPONIA Reichenbach トキ属

152. *Nipponia nippon* (Temminck, 1835) トキ

Toki Crested Ibis

Range: E Palearctic. Breeds in temperate ne Asia, formerly has bred in Ussuriland, Manchuria, e China, and Japan, now small populations being confined to n China. Recorded from Korea and Taiwan.

Status: Honshu (FB), Sado (FB, IB). Extinct in wild (recorded from Hokkaido, Honshu, Sado, Oki, Shikoku, Kyushu, Izu Is., Ryukyu Is.). Reintroduced into Sado since 2008. Released individuals were recorded in n and c Honshu.

Habitat: Forests, rice fields, marshes.

本州 (FB), 佐渡 (FB, IB). 野生絶滅 (北海道, 本州, 佐渡, 隠岐, 四国, 九州, 伊豆諸島, 琉球諸島). 佐渡では 2008 年から飼育個体を放鳥している. 放鳥個体は本州北部と中部で確認されている.

森林, 水田, 湿原に生息していた.

PLATALEA Linnaeus ヘラサギ属

153. *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 ヘラサギ

Herasagi Eurasian Spoonbill

Range: Temperate and tropical Eurasian, locally Afrotropical. Breeds from s Europe and Balkans to India and Sri Lanka, and from s Russia and sw Siberia to Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland; also ne Africa and Banc d'Arguin off coast of Mauritania. Northern birds migratory, wintering to tropical Africa, Persian Gulf, India, Myanmar, and e China south of the Yangtze Basin.

153-1. *Platalea leucorodia leucorodia* Linnaeus, 1758 ヘラサギ

Range: Range of the species except Africa. Occasional in Japan, Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Etorofuto I.), n and c Honshu (AV), sw Honshu (IV), Sado (AV), Shikoku (AV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Oga-

sawara Is. (AV: Mukojima I.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, marshes, tidal flats.

北海道 (AV), 南千島 (AV: 択捉島), 本州北・中部 (AV), 本州南西部 (IV), 佐渡 (AV), 四国 (AV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 小笠原群島 (AV: 聶島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

水田, 湿原, 干潟に生息する.

154. *Platalea minor* Temminck & Schlegel, 1849 クロツラヘラサギ

Kurotsura-herasagi Black-faced Spoonbill

Range: E Asiatic. Breeds in c Manchuria, Korea, and e China south to coastal Fukien. Winters to Vietnam, s China, Hainan, Taiwan and s Japan; accidental in Philippines.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Tsushima (IV), Shikoku (IV), Kyushu (WV), Goto Is. (IV), Izu Is. (IV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Rice fields, marshes, tidal flats.

北海道 (AV), 本州 (IV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 対馬 (IV), 四国 (IV), 九州 (WV), 五島列島 (IV), 伊豆諸島 (IV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (AV).

水田, 湿原, 干潟に生息する.

Order GRUIFORMES ツル目

Family GRUIDAE ツル科

GRUS Brisson ツル属

155. *Grus leucogeranus* Pallas, 1773 ソデグロヅル

Sodeguro-zuru Siberian Crane

Range: C and e Palearctic. Breeds in the Konda and Sosva river basins of the lower Ob and discontinuously in ne Siberia from the lower Yana to the Indigirka River and Kolyma delta. Winters to the Caspian region, nw India, Mongolia, and China; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Iwate, Miyagi, Chiba, Ishikawa, Shimane, Yamaguchi), Kyushu (AV: Nagasaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Iriomotejima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 岩手, 宮城, 千葉, 石川, 島根, 山口), 九州 (AV: 長崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 西表島 (AV).

156. *Grus canadensis* (Linnaeus, 1758) カナダヅル

Kanada-zuru Sandhill Crane

Range: Nearctic, marginally Palearctic. Breeds from Alaska to Canada and n US, south locally in Texas (formerly), Florida, and Cuba; also Aleutian Is. and ne Russian Far East. Northern birds winter to temperate regions.

156-1. *Grus canadensis canadensis* (Linnaeus, 1758) カナダヅル

Range: Breeds in n Russian Far East from the mouth of the Alazeya River and Anadyrland to the Chukot Peninsula, Wrangel I., St. Lawrence I., and n Alaska to Baffin I., south to the Mackenzie Basin and Southampton I. Winters to the US and c Mexico; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Aichi, Mie, Yamaguchi), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki. IV: Kagoshima), Tsushima (AV), Ogasawara Is. (AV: Hahajima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉,

愛知, 三重, 山口), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 佐賀, 長崎. IV: 鹿児島), 対馬 (AV), 小笠原群島 (AV: 母島).

157. *Grus vipio* Pallas, 1811 マナヅル

Mana-zuru White-naped Crane

Range: E Palearctic. Breeds from Transbaikalia east to the Amur Basin, n Manchuria, and Ussuriland. Winters in e China to the Yangtze Basin, Korea, and sw Japan.

Status: Hokkaido (AV. CB: Yubari), Honshu (AV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Nagano, Toyama, Chiba, Saitama, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Wakayama, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Sado (AV), Shikoku (AV: Kagawa. WV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (PV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita. WV: Kagoshima), Tsushima (PV), Tanegashima I. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Marshes, rice fields, cultivated fields.

北海道 (AV. CB: 夕張郡), 本州 (AV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 長野, 富山, 千葉, 埼玉, 東京, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 和歌山, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 香川. WV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (PV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分. WV: 鹿児島), 対馬 (PV), 種子島 (AV), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 大東諸島 (AV: 南大東島).

農耕地, 湿地に生息する.

158. *Grus japonensis* (Müller, 1776) タンチョウ

Tancho Red-crowned Crane

Range: E Palearctic. Breeds from ne Mongolia to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland (Lake Khanka), e Hokkaido, and s Kurile Is. Migratory and sedentary, wintering to e China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Shibotsuto I., Yurishima I.), Honshu (AV: Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Fukushima, Tochigi, Gunma, Nagano, Ibaraki, Chiba, Saitama, Ishikawa, Fukui, Shiga, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Kagoshima), Miyakojima I. (AV).

Habitat: Marshes, cultivated fields, rivers.

北海道 (RB), 南千島 (MB: 国後島, 志発島, 勇留島), 本州 (AV: 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 福島, 栃木, 群馬, 長野, 茨城, 千葉, 埼玉, 石川, 福井, 滋賀, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 鹿児島), 宮古島 (AV).

湿原, 河川敷などで営巣し, 農耕地でも採食する.

159. *Grus grus* (Linnaeus, 1758) クロヅル

Kuro-zuru Common Crane

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to the Amur Basin, south to Ukraine, Transcaucasia, Kirghiz Steppes, Turkestan, Mongolia, and n Manchuria; formerly bred in the British Isles and c and s Europe. Winters in temperate Eurasia and n Africa.

159-1. *Grus grus lilfordi* Sharpe, 1894 クロヅル

Range: Range of the species except Europe and w Russia. Winters to Asia Minor eastward to Indochina and s China, occasionally in Korea and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Ibaraki, Chiba, Saitama, Shizuoka, Ishikawa, Shiga, Hyogo, Tottori, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kagawa), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto. IV: Kagoshima), Tsushima (AV), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Marshes, cultivated fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 宮城, 茨城, 千葉, 埼玉, 静岡, 石川, 滋賀, 兵庫, 鳥取, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 徳島, 香川), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本. IV: 鹿児島), 対馬 (AV), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV).

湿原, 農耕地に生息する.

160. *Grus monacha* Temminck, 1835 ナベヅル

Nabe-zuru Hooded Crane

Range: C and e Palearctic. Breeds in s Siberia from around the Tomsk region and upper Enisei River eastward to Transbaikalia and nw Manchuria. Winters to China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Chiba, Saitama, Tokyo, Yamanashi, Shizuoka,

Aichi, Ishikawa, Fukui, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima. WV: Yamaguchi), Sado (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa. WV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (PV: Fukuoka, Saga. WV: Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima. IV: Miyazaki), Tsushima (PV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Rice fields, cultivated fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 千葉, 埼玉, 東京, 山梨, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島. WV: 山口), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 香川. WV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (PV: 福岡, 佐賀. WV: 長崎, 大分, 熊本, 鹿児島. IV: 宮崎), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

水田, 畑に生息する.

ANTHROPOIDES Vieillot アネハヅル属

161. *Anthropoides virgo* (Linnaeus, 1758) アネハヅル

Aneha-zuru Demoiselle Crane

Range: Palearctic. Breeds from s Russia east through c Asia to n Mongolia, Transbaikalia, and nw Manchuria; also locally in s Spain, nw Africa, and se Europe. Winters to n Africa, Middle East, India, Assam to se Asia, and s China; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Shikotanto I., Etorofuto I.), Honshu (AV: Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Fukui, Wakayama, Kyoto, Tottori, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima), Hachijojima I. (AV), Tokara Is. (AV), Tokunoshima I. (AV).

北海道 (AV), 南千島 (AV: 色丹島, 択捉島), 本州 (AV: 青森, 秋田, 岩手, 宮城, 茨城, 千葉, 東京, 静岡, 岐阜, 石川, 福井, 和歌山, 京都, 鳥取, 島根, 広島, 山口), 粟島 (AV), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 熊本, 鹿児島), 八丈島 (AV), トカ

ラ列島 (AV), 徳之島 (AV).

Family RALLIDAE クイナ科

COTURNICOPS Gray シマクイナ属

162. *Coturnicops exquisitus* (Swinhoe, 1873) シマクイナ

Shima-kuina Swinhoe's Rail

Range: Holarctic. Breeds in Transbaikalia, Manchuria, and Ussuriland. Winters to e China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Miyagi, Niigata, Tochigi, Toyama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Wakayama, Hyogo, Tottori, Shimane), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki), Tsushima (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Marshes, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 宮城, 新潟, 栃木, 富山, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 島根), 粟島 (AV), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 佐賀, 長崎), 対馬 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 西表島).

水田, 湿地に生息する.

RALLINA Gray オオクイナ属

163. *Rallina eurizonoides* (Lafresnaye, 1845) オオクイナ

O-kuina Slaty-legged Crane

Range: Indomalayan. Breeds from Pakistan and India to n Indochina, Philippines, and Sulawesi, north to Taiwan and s Ryukyu Is. Sedentary but partially wintering to Sri Lanka, Malay Peninsula, and Sumatra.

163-1. *Rallina eurizonoides sepiaria* (Stejneger, 1887) オオクイナ

Range: Resident in the Sakishima Is.

Status: Okinawajima I. (IV), Miyako Is. (RB: Miyakojima I., Taramajima I.), Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Lowland woods.

沖縄島 (IV), 宮古諸島 (RB: 宮古島, 多良間島), 八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 与那国島).
森林, 灌木林に生息する.

GALLIRALLUS Lafresnaye ヤンバルクイナ属

164. *Gallirallus okinawae* (Yamashina & Mano, 1981) ヤンバルクイナ

Yambaru-kuina Okinawa Rail

Range: E Palearctic. Endemic to Okinawajima I. Resident.

Status: Okinawajima I. (RB).

Habitat: Evergreen forests, forest edges.

沖縄島 (RB).

森林に生息する.

165. *Gallirallus striatus* (Linnaeus, 1766) ミナミクイナ

Minami-kuina Slaty-breasted Rail

Range: Indomalayan. Breeds from s to se Asia.

165-U. *Gallirallus striatus* ssp. 亜種不明

Status: Okinawajima I. (AV: Oct. 2007), Miyako Is. (AV: Ikemajima I., May 2010).

沖縄島 (AV: 2007 年 10 月), 宮古諸島 (AV: 池間島, 2010 年 5 月).

RALLUS Linnaeus クイナ属

166. *Rallus aquaticus* Linnaeus, 1758 クイナ

Kuina Water Rail

Range: Palearctic. Breeds from Iceland, British Isles. and w Europe east to c Asia and Himalayas, south to n Africa, and discontinuously from the Baikal region to Sakha, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and n and c Japan. Winters south to the Mediterranean region, Caucasus, Caspian region, n India, Indochina, China, and Japan.

166-1. *Rallus aquaticus indicus* Blyth, 1849 クイナ

Range: Easternmost part of the species range from Lake Baikal eastward.

Winters in China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB: Aomori, Iwate. RB: Miyagi, Tochigi, Yamanashi. CB: Akita, Ibaraki. WV), Sado (CB), Hegurajima I. (IV), Oki (WV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I. AV: Ikemajima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Swamps, marshes, rice fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB: 青森, 岩手. RB: 宮城, 栃木, 山梨. CB: 秋田, 茨城. WV), 佐渡 (CB), 舩倉島 (IV), 隠岐 (WV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島. AV: 池間島, 与那国島).

湿原, 水田など水辺に生息する.

AMAUORNIS Reichenbach シロハラクイナ属

167. *Amaurornis phoenicurus* (Pennant, 1769) シロハラクイナ

Shirohara-kuina White-breasted Waterhen

Range: Asiatic. Breeds from India and Sri Lanka to Myanmar, se Asia, s China, Hainan, Taiwan, Philippines, and Sunda Is. east to the Moluccas, north to s Japan. Mainly sedentary.

167-1. *Amaurornis phoenicurus phoenicurus* (Pennant, 1769) シロハラクイナ

Range: Breeds in Pakistan, India, Myanmar to s China, Indochina, Malay Peninsula, Hainan, Taiwan, and s Japan. Sedentary but somewhat erratic.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV. CB: Niigata, Saitama, Shizuoka, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi), Kyushu (CB: Kumamoto, AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Danjo Is. (PV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (CB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I. PV), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Kumejima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Taketomijima I., Kuroshima I., Kohamajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Rice fields, marshes, swamps.

北海道 (AV), 本州 (AV. CB: 新潟, 埼玉, 静岡, 山口), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 香川, 愛媛, 高知), 九州 (CB: 熊本, AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), トカラ列島 (CB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島. PV), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 久米島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 竹富島, 黒島, 小浜島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (AV).

水田, 湿潤な草地に生息する.

PORZANA Vieillot ヒメクイナ属

168. *Porzana pusilla* (Pallas, 1776) ヒメクイナ

Hime-kuina Baillon's Crake

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds from Europe east across temperate Eurasia to Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Japan, south locally to the Himalayas, n India, and Iran; also e and s Africa, Madagascar, New Guinea, Australia, and New Zealand. Northern birds migratory, wintering to tropical regions.

168-1. *Porzana pusilla pusilla* (Pallas, 1776) ヒメクイナ

Range: Breeds in s Siberia from Ukraine east to Lake Baikal, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan, south to Hopeh in e China; also Thailand. Winters to se Asia, s China, and Philippines.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV. FB: Akita, Chiba. MB: Iwate), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I. IV: Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Rice fields, wet grasslands.

北海道 (IV), 本州 (IV. FB: 秋田, 千葉. MB: 岩手), 粟島 (AV), 舩倉島 (AV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島. IV: 与論島), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊江島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

水田, 水域に近い草地などに生息する.

169. *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) コモンクイナ

Komon-kuina Spotted Crake

Range: W Palearctic. Breeds from British Is and Spain east across s Scandinavia, n Mediterranean and Balkans to w and c Russia, Caucasus and Iran, continuing to Kazakhstan, sw Siberia (Suva) and nw China (w Xinjiang). Winters from Mediterranean and Middle East south to w Africa, and from Ethiopia south to South Africa and west to Angola and Namibia; Pakistan, India and w Myanmar; irregularly on sw Caspian Sea.

Status: Okinawajima I. (AV: Nov. 2008).

沖縄島 (AV: 2008 年 11 月).

170. *Porzana fusca* (Linnaeus, 1766) ヒクイナ

Hi-kuina Ruddy-breasted Crake

Range: Asiatic. Breeds from India and Sri Lanka to Myanmar, se Asia, Malay Peninsula, Philippines, Sunda Is., and Sulawesi, north to s Manchuria and Japan. Northern birds migratory, wintering to tropical regions.

170-1. *Porzana fusca erythrothorax* (Temminck & Schlegel, 1849) ヒクイナ

Range: Breeds in China from s Manchuria to Kwangtung and Kwangsi, Korea, and Japan south to Kyushu. Winters to Myanmar, Thailand, Indochina, and s China. Recorded from Tsushima, Yakushima I., and Tanegashima I.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), n Honshu (MB), c and sw Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (IV), Oki (MB), Mishima I. (IV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (IV: Mikurajima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (IV).

Habitat: Rice fields and grassy marshes, occasionally cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (IV: 国後島), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (IV), 隠岐 (MB), 見島 (IV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (IV: 御蔵島, 八丈島), トカラ列島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 石垣島, 西表島), 大東諸島 (IV).

水田, 水辺の草地に生息する.

170-2. *Porzana fusca phaeopyga* Stejneger, 1887 リュウキュウヒクイナ

Range: Breeds on the Amami Is., Ryukyu Is., and Daito Is. Recorded from Yakushima I.

Status: Yakushima I. (AV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Kikaijima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, grassy marshes, cultivated fields.

屋久島 (AV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 徳之島, 喜界島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 与那国島), 大東諸島 (RB: 北大東島, 南大東島).

水田, 水辺の草地に生息する.

171. *Porzana paykullii* (Ljungh, 1813) コウライクイナ

Korai-kuina Band-bellied Crane

Range: E Palearctic. Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and n Korea. Winters to s China, Malay Peninsula, and Greater Sunda Is; accidental in Japan.

Status: Oshima-Oshima I. (AV: May 1993), Okinawajima I. (AV: Oct. 1998).

渡島大島 (AV: 1993 年 5 月), 沖縄島 (AV: 1998 年 10 月).

172. *Porzana cinerea* (Vieillot, 1819) マミジロクイナ

Mamijiro-kuina White-browed Crane

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds in the Malay Peninsula, Philippines, Sunda Is., New Guinea, n Australia, and islands in the sw Pacific, north to the Iwo Is. Sedentary.

172-1. *Porzana cinerea brevipes* Ingram, 1911 マミジロクイナ

Range: Resident on the Iwo Is. (Iwoto I.).

Status: Iwo Is. (FB: Iwoto I.). Extinct.

Habitat: Sandy beaches.

硫黄列島 (FB: 硫黄島). 絶滅.

砂浜に生息していた.

GALLICREX Blyth ツルクイナ属**173. *Gallicrex cinerea* (Gmelin, 1789) ツルクイナ**

Tsuru-kuina Watercock

Range: Asiatic. Breeds from India and Sri Lanka to Indochina, Malay Peninsula, Philippines, Sunda Is., and Sulawesi, north to e China, s Manchuria, Korea, s Japan, and probably Ussuriland. Northern birds migratory, wintering to se Asia, Philippines, and Indonesia.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Etorofuto I.), Honshu (IV: Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Nara, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Oki (AV), Shikoku (PV: Kochi. AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (PV: Fukuoka. IV: Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima. CB: Saga), Tsushima (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I., Nishinoshima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Kohamajima I., Iriomotejima I. CB: Ishigakijima I. IV: Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Rice fields, marshes, occasionally cultivated fields.

北海道 (AV), 南千島 (AV: 択捉島), 本州 (IV: 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 奈良, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 舩倉島 (AV), 隠岐 (AV), 四国 (PV: 高知. AV: 徳島, 愛媛), 九州 (PV: 福岡. IV: 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島. CB: 佐賀), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島, 西之島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 小浜島, 西表島. CB: 石垣島. IV: 宮古島, 与那国島).

水田, 湿原に生息する.

GALLINULA Brisson バン属**174. *Gallinula chloropus* (Linnaeus, 1758) バン**

Ban Common Moorhen

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds in temperate and

tropical Eurasia from Europe to India, e China, and Japan, south to the Malay Peninsula, whole Africa except the Sahara, Madagascar, and from temperate North America to c South America; also Philippines, Sunda Is., and Marianas. Mainly sedentary.

174-1. *Gallinula chloropus chloropus* (Linnaeus, 1758) バン

Range: Breeds from Europe, N Africa, Azores, and Canary Is., east to Japan, south to Sri Lanka and Indochina, north to Manchuria. Some birds winter further south.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Yurishima I.), n Honshu (MB), c and sw Honshu (RB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB: Oshima I., Shikinejima I., Nijima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (CB: Iwoto I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iejima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Zamamijima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, marshes, rivers, ponds.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 勇留島), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (RB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 男女群島 (PV), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島, 式根島, 新島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島), 硫黄列島 (CB: 硫黄島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊江島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 久米島, 座間味島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (RB: 北大東島, 南大東島).

水田, 湿潤な草地に生息する.

FULICA Linnaeus オオバン属

175. *Fulica atra* Linnaeus, 1758 オオバン

O-ban Eurasian Coot

Range: Mainly Eurasian and Australasian. Breeds in Iceland, British Isles, w Europe to the Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and n and c Japan, south to nw Africa, Iran, n Mongolia, and n China; also New Guinea, Australia, Tasmania, and New Zealand. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

175-1. *Fulica atra atra* Linnaeus, 1758 オオバン

Range: Range of the species except Indonesia to Australia and New Zealand. Migratory and sedentary, wintering south to tropical Africa, Arabia, se Asia, and Philippines.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (RB, WV), Sado (WV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV. RB: Fukuoka, Oita), Tsushima (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Marshes, lakes, rivers, ponds.

北海道 (MB), 本州 (RB, WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV. RB: 福岡, 大分), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 久米島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

湿原, 湖沼, 河川に生息する.

Order OTIDIFORMES ノガン目

Family OTIDIDAE ノガン科

OTIS Linnaeus ノガン属

176. *Otis tarda* Linnaeus, 1758 ノガン

Nogan Great Bustard

Range: Palearctic. Breeds sporadically in the Iberian Peninsula, nw Africa, and from c Europe through s Russia and Kirghiz Steppes to Russian Turkestan, Mongolia, Manchuria, and s Ussuriland. Migratory and sedentary, wintering to temperate regions.

176-1. *Otis tarda dybowskii* Taczanowski, 1874 ノガン

Range: Breeds from east of the Altai to Transbaikalia. Mongolia, Manchuria, and s Ussuriland. Winters in Manchuria and n China, rarely Korea and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Fukui, Chiba, Yamanashi, Nagano, Aichi, Gifu, Ishikawa, Mie, Shiga, Hyogo, Tottori), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Nagasaki), Goto Is. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawa-jima I., Ishigakijima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 福井, 千葉, 山梨, 長野, 愛知, 岐阜, 石川, 三重, 滋賀, 兵庫, 鳥取), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 長崎), 五島列島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 石垣島).

TETRAX Forster ヒメノガン属

177. *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) ヒメノガン

Hime-nogan Little Bustard

Range: W and c Palearctic. Breeds sporadically from w Europe and nw Africa east across s Russia and Kirghiz Steppes to the Tarbagatai and Altai, south to s Italy (locally) and n Caucasus. Migratory and sedentary, wintering to temperate regions.

Status: Kyushu (AV: Fukuoka, Jan. 1940, Oct. 2011).

九州 (AV: 福岡, 1940 年 1 月, 2011 年 10 月). 2 例の記録がある.

Order CUCULIFORMES カッコウ目

Family CUCULIDAE カッコウ科

CENTROPUS Illiger バンケン属

178. *Centropus bengalensis* (Gmelin, 1788) バンケン

Banken Lesser Coucal

Range: Indomalayan. Breeds from the Himalayas east to s China and Taiwan and southeast to Indonesia and Philippines; also sw India. Mainly sedentary.

178-1. *Centropus bengalensis lignator* Swinhoe, 1861 バンケン

Range: Breeds in s China, Hainan and Taiwan.

Status: Tsushima (AV: Jun. 2008), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Dec. 2003, Feb. 2004, Yonagunijima I., Mar. 2001, Mar. 2008).

対馬 (AV: 2008 年 6 月), 八重山諸島 (AV: 石垣島, 西表島, 2003 年 12 月, 2004 年 2 月, 与那国島, 2001 年 3 月, 2008 年 3 月).

CLAMATOR Kaup カンムリカッコウ属

179. *Clamator coromandus* (Linnaeus, 1766) カンムリカッコウ

Kammuri-kakko Chestnut-winged Cuckoo

Range: Indomalayan. Breeds from the Himalayas eastward through Assam to s China and se Asia. Migratory and sedentary, wintering to s India, Sri Lanka, se Asia; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Yamagata), Hegurajima I. (AV: May 1988, May 1993), Danjo Is. (AV), Tokara Is. (AV: Takarajima I., May 1974), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., 1994, Kumejima I., Iriomotejima I., 1990).

本州 (AV: 山形), 舩倉島 (AV: 1988 年 5 月, 1993 年 5 月), 男女群島 (AV), トカラ列島 (AV: 宝島, 1974 年 5 月), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 1994 年, 久米島, 西表島, 1990 年).

EUDYNAMYS Vigors & Horsfield オニカッコウ属

180. *Eudynamys scolopaceus* (Linnaeus, 1758) オニカッコウ

Oni-kakko Asian Koel

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from India east through s China to Indonesia, Philippines, New Guinea and n and e Australia. Birds in temperate zone winter to tropics.

180-U. *Eudynamys scolopaceus* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Aichi, May 2005, Osaka, May 2007), Tobishima I. (AV: May 2007), Kyushu (AV: Kumamoto, Jun. 2011, Kagoshima, Jul. 2006), Yonagunijima I. (AV: May 2005, etc.).

本州 (AV: 愛知, 2005 年 5 月, 大阪, 2007 年 5 月), 飛島 (AV: 2007 年 5 月), 九州 (AV: 熊本, 2011 年 6 月, 鹿児島, 2006 年 7 月), 与那国島 (AV: 2005 年 5 月等).

URODYNAMIS Salvadori キジカッコウ属

181. *Urodynamis taitensis* (Sparrman, 1787) キジカッコウ

Kiji-kakko Long-tailed Cuckoo

Range: Australasian. Breeds in New Zealand and adjacent islands. Winters to c Pacific islands.

Status: Honshu (AV: Chiba, May 2008).

本州 (AV: 千葉, 2008 年 5 月).

SURNICULUS Lesson オウチュウカッコウ属

182. *Surniculus lugubris* (Horsfield, 1821) オウチュウカッコウ

Ochu-kakko Square-tailed Drongo-Cuckoo

Range: Indomalayan. Breeds in Sri Lanka, Malay Peninsula, Greater Sunda Is., Borneo and Philippines. Sedentary.

182-U. *Surniculus lugubris* ssp. 亜種不明

Status: Kyushu (AV: Nagasaki, May 1988, Kumamoto, May 2010), Okinawajima I. (AV: Apr. 2006).

九州 (AV: 長崎, 1988 年 5 月, 熊本, 2010 年 5 月), 沖縄島 (AV: 2006

年 4 月).

HIEROCOCCYX Müller ジュウイチ属

183. *Hierococcyx sparveroides* (Vigors, 1832) オオジュウイチ

O-juichi Large Hawk-Cuckoo

Range: Indomalayan. Breeds from the Himalayas to s and e China and se Asia. Winters to the Malay Peninsula, Greater and Lesser Sunda Is., Borneo, Sulawesi and Philippines.

Status: Awashima I. (AV: Apr. 2001), Goto Is. (AV: Fukuejima I., May 2010), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Mar. 2008, Ishigakijima I., Oct. 1989, Yonagunijima I., Apr. 2004, etc.).

栗島 (AV: 2001 年 4 月), 五島列島 (AV: 福江島, 2010 年 5 月), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 2008 年 3 月, 石垣島, 1989 年 10 月, 与那国島, 2004 年 4 月等).

184. *Hierococcyx hyperythrus* (Gould, 1856) ジュウイチ

Juichi Rufous Hawk-Cuckoo

Range: Asiatic. Breeds in the Amur Basin, Ussuriland, s Manchuria, n Hopeh, and Japan. Winters to e China and Indochina.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Broad-leaved forests, woodlands.

北海道 (MB), 本州 (MB), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (PV), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (AV: 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

森林に生息する.

CUCULUS Linnaeus カッコウ属

185. *Cuculus poliocephalus* Latham, 1790 ホトトギス

Hototogisu Lesser Cuckoo

Range: Asiatic. Breeds in e Asia from the Himalayas east through n China to s Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

Status: E and c Hokkaido (IV), s Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (MB), Izu Is. (MB), Ogasawara Is. (PV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (MB), Amami Is. (MB: Kikaijima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I. PV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Kumejima I., Yakabijima I., Akashima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Forests, second growth, woodlands, forest edges, open forests.

北海道中・東部 (IV), 北海道南部 (MB), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (MB), 伊豆諸島 (MB), 小笠原群島 (PV: 父島, 母島), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島), トカラ列島 (MB), 奄美諸島 (MB: 喜界島, 沖永良部島, 与論島. PV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 栗国島, 伊平屋島, 久米島, 屋嘉比島, 阿嘉島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

森林, 林縁部, 開けた林に生息する.

186. *Cuculus micropterus* Gould, 1838 セグロカッコウ

Seguro-kakko Indian Cuckoo

Range: Asiatic. Breeds in e and s Asia from the Himalayas north through China to the Amur Basin, Manchuria, s Ussuriland, and Korea, and from India to Sri Lanka, Myanmar, se Asia, Sunda Is., and Borneo. Northern birds migratory, wintering to subtropical and tropical regions south to the Sunda Is.

186-1. *Cuculus micropterus micropterus* Gould, 1838 セグロカッコウ

Range: Range of the species except Malay Peninsula, Sunda Is. and Borneo. Winters south to Sri Lanka, s China and se Asia.

Status: Honshu (AV: Yamagata, Miyagi, Niigata, Kanagawa, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,

Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

本州 (AV: 山形, 宮城, 新潟, 神奈川, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 香川, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV).

187. *Cuculus optatus* Gould, 1845 ツツドリ

Tsutsudori Oriental Cuckoo

Range: Palearctic. Breeds in c Russia, Siberia east to Anadyrland and Kamchatka, south to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Winters to s China, Malay Peninsula, Philippines, and Sunda Is. to Australia.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Nijijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (PV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Broad-leaved forests, woodlands.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 新島, 式根島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊平屋島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (PV: 南大東島).

森林に生息する.

188. *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 カッコウ

Kakko Common Cuckoo

Range: Eurasian. Breeds in temperate Eurasia from the British Isles and w Europe east to Anadyrland, Kamchatka, and Japan, south to the Himalayas and s China; also the northwestern parts of Africa. Winters to tropical Africa and s

Asia.

188-1. *Cuculus canorus telephonus* Heine, 1863 カッコウ

Range: Breeds in e Siberia east to Anadyrland and Kamchatka, south to Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Winters to s China and se Asia.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Izu Is. (PV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Forest edge, woodlands, grasslands, wetlands, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊平屋島, 粟国島, 宮古島, 与那国島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

林縁部, 草原, 湿原, 農耕地に生息する.

Order CAPRIMULGIFORMES ヨタカ目

Family CAPRIMULGIDAE ヨタカ科

CAPRIMULGUS Linnaeus ヨタカ属

189. *Caprimulgus indicus* Latham, 1790 ヨタカ

Yotaka Jungle Nightjar

Range: Asiatic. Breeds from India and Sri Lanka east through Assam to Indochina, north through e China to Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, Japan and Palau Is. Northern birds migratory, wintering in tropical Asia.

189-1. *Caprimulgus indicus jotaka* Temminck & Schlegel, 1844 ヨタカ

Range: Breeds from Transbaikalia and Amur Basin south through e China to Kwangtung, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Winters to Indochina, Malay Peninsula, and Greater Sunda Is. Recorded from Sakhalin and Korea.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (PV: Oshima I., Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (PV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Izenajima I., Kumejima I., Akashima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open woodlands, light woods.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (PV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊是名島, 久米島, 阿嘉島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

疎林, 農耕地内の残存林などに生息する.

Order APODIFORMES アマツバメ目

Family APODIDAE アマツバメ科

AERODRAMUS Oberholser ヒマラヤアナツバメ属

190. *Aerodramus brevirostris* (Horsfield, 1840) ヒマラヤアナツバメ

Himaraya-anatsubame Himalayan Swiftlet

Range: Indomalayan. Breeds in Himalayas and mountains of ne India, ec and sc China, and Indochina. Winters to sw Thailand and Malay Peninsula, and possibly Sumatra and mountains in w Java, occasionally to Andaman Is.

190-U. *Aerodramus brevirostris* ssp. 亜種不明

Status: Teurito I. (AV), Honshu (AV: Shimane), Kyushu (AV: Fukuoka), Uji Is. (AV), Tokara Is. (AV: Tairajima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

天売島 (AV), 本州 (AV: 島根), 九州 (AV: 福岡), 宇治群島 (AV), トカラ列島 (AV: 平島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 与那国島).

HIRUNDAPUS Hodgson ハリオアマツバメ属

191. *Hirundapus caudacutus* (Latham, 1802) ハリオアマツバメ

Hari-o-amatsubame White-throated Needltailed Swift

Range: C and e Palearctic. Breeds in s Siberia from the Altai to the Okhotsk coast, Sakhalin, Kurile Is., and Japan, south to Korea, n China and s China through the Himalayas to Assam. Northern birds migratory, wintering to the Southern Hemisphere.

191-1. *Hirundapus caudacutus caudacutus* (Latham, 1802) ハリオアマツバメ

Range: Range of the species except s China through the Himalayas to Assam. Winters to New Guinea, Australia, and Tasmania.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (MB), s Honshu (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mountain forests, woodlands.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (MB), 本州南部 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

針広混交林, 落葉広葉樹林に生息する.

APUS Scopoli アマツバメ属

192. *Apus pacificus* (Latham, 1802) アマツバメ

Amatsubame Pacific Swift

Range: Asiatic. Breeds from Minusinsk and w Altai through s Siberia to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to the Himalayas, s Tibet, s China, n Indo-china, Korea, Japan, and Taiwan. Winters south to the Southern Hemisphere.

192-1. *Apus pacificus pacificus* (Latham, 1802) キタアマツバメ

Range: Breeds in se Siberia, s Russian Far East, and Kamchatka, south to n China, Korea, Sakhalin, and Hokkaido. Winters to the Malay Peninsula, Indonesia, New Guinea, Australia, and Tasmania.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB).

Habitat: Sea coasts to mountains, cliffs, caves.

北海道 (MB), 南千島 (MB).

海岸や山地に生息し, 崖に営巣する.

192-2. *Apus pacificus kurodae* (Domaniewski, 1933) アマツバメ

Range: Breeds in Japan from Honshu to the Amami Is. Winters possibly to Indonesia and Australia. Recorded from Taiwan.

Status: Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Nanatsujima I. (MB), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (MB), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Tokashikijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts to mountains, cliffs, caves.

本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), セツ島 (MB), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (MB), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊平屋島, 粟国島, 渡嘉敷島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

海岸や山地に生息し, 崖に営巣する.

193. *Apus nipalensis* (Hodgson, 1837) ヒメアマツバメ

Hime-amatsubame House Swift

Range: Mainly Indomalayan. Breeds from e Nepal, se Asia, s China, Taiwan, Philippines, Sunda Is., and Borneo, north in the warmer part of Japan. Mainly sedentary.

193-1. *Apus nipalensis kuntzi* Deignan, 1958 ヒメアマツバメ

Range: Breeds from Taiwan to c Japan.

Status: N Honshu (AV), c and sw Honshu (RB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I. PV: Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (CB: Okinawajima I., Ishigakijima I. PV: Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cities, open lowlands.

本州北部 (AV), 本州中・南西部 (RB), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島. PV: 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (CB: 沖縄島, 石垣島. PV: 粟国島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

住宅地, 平野部に生息し, 市街地の建造物に営巣する.

Order CHARADRIIFORMES チドリ目

Family CHARADRIIDAE チドリ科

VANELLUS Brisson タゲリ属

194. *Vanellus vanellus* (Linnaeus, 1758) タゲリ

Ta-geri Northern Lapwing

Range: Palearctic. Breeds from Europe east across c Asia and s Siberia to Us-

suriland, south to the Caspian region, n China, and Japan. Winters in the Mediterranean region, nw India, Indochina, e China, and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (CB: Yamagata, Niigata, Ibaraki, Ishikawa, Fukui. WV), Sado (CB, WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Izu Is. (WV: Niijima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Zamamijima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Senkaku Is. (IV), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, riverbeds, meadows, grasslands, occasionally estuaries, mudflats.

北海道 (IV), 本州 (CB: 山形, 新潟, 茨城, 石川, 福井. WV), 佐渡 (CB, WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (WV: 新島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 久米島, 座間味島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 尖閣列島 (IV), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

休耕田, 湿地, 草原, 河口域及び干潟などに生息する.

195. *Vanellus cinereus* (Blyth, 1842) ケリ

Keri Grey-headed Lapwing

Range: E Palearctic. Breeds in se Manchuria and Japan. Migratory and sedentary, wintering in Japan, China, se Asia, and India.

Status: Hokkaido (AV), n Honshu (MB), c and sw Honshu (RB. CB: Nagano, Saitama, Yamaguchi, WV), Sado (IV), Hegurajima I. (AV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (FB: Kagawa, WV), Kyushu (RB: Fukuoka, Saga, Kumamoto. WV, PV), Tsushima (IV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I. AV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Cultivated fields, riverbeds, dried rice fields, grasslands.

北海道 (AV), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (RB. CB: 長野, 埼玉, 山口, WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (AV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (FB: 香川, WV), 九州 (RB: 福岡, 佐賀, 熊本. WV, PV), 対馬 (IV), 伊豆

諸島 (AV: 八丈島), トカラ列島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島. AV: 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島).
水田, 河原, 草原などに生息する.

PLUVIALIS Brisson ムナグロ属

196. *Pluvialis apricaria* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパムナグロ

Yoroppa-munaguro Eurasian Golden Plover

Range: N Palearctic. Breeds from n Eurasia south to the British Isles, n Europe, and the Baltic states. Winters to n Africa, the Caspian Sea, and e India.

196-U. *Pluvialis apricaria* ssp. 亜種不明

Status: Okinawajima I. (AV: Oct. 2011).

沖縄島 (AV: 2011 年 10 月).

197. *Pluvialis fulva* (Gmelin, 1789) ムナグロ

Munaguro Pacific Golden Plover.

Range: N Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in Siberian tundras from the Yamal Peninsula to the Bering Sea Is. and w coast of Alaska. Winters from India to se Asia, China, Australia, New Zealand, and Pacific islands from Hawaii to Polynesia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Oshima I., Kozushima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (WV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I., Oki-Daitojima I.).

Habitat: Grassy fields, rice fields, river beds, estuaries.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 神津島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (WV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島, 沖大東島).

低地の草原，干拓地，水田，河口域などに普通に生息する。

198. *Pluvialis dominica* (Müller, 1776) アメリカムナグロ

Amerika-munaguro American Golden Plover

Range: N Nearctic. Breeds in Alaska and n Canada. Winters to South America.

Status: Honshu (AV: Saitama, Apr. 1987, Ibaraki, May 2002), Okinawajima I. (AV: Sep. 1987).

本州 (AV: 埼玉, 1987 年 4 月, 茨城, 2002 年 5 月), 沖縄島 (AV: 1987 年 9 月).

199. *Pluvialis squatarola* (Linnaeus, 1758) ダイゼン

Daizen Grey Plover

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in arctic tundras from n Russia to the Chukot Peninsula, Alaska, and arctic Canada south to Southampton Is. Winters south to s Africa, Madagascar, India, Sri Lanka, Australia, islands in the sw Pacific, South America, and Galapagos Is.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Goto Is. (PV, WV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV, WV), Izu Is. (PV, WV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Izenajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Sandy beaches, mudflats, estuaries, reclaimed lands, rice fields, riverbeds.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 五島列島 (PV, WV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV, WV), 伊豆諸島 (PV, WV: 八丈島), 小笠原群島 (WV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊是名島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 黒島, 与那国島).

海岸, 干潟, 河口域, 干拓地, 水田などに生息する。

CHARADRIUS Linnaeus チドリ属

200. *Charadrius hiaticula* Linnaeus, 1758 ハジロコチドリ

Hajiro-ko-chidori Ringed Plover

Range: N Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in Iceland, British Isles, and n Europe east through n Siberia to the Chukot Peninsula; also coastal Greenland, Ellesmere I., and Baffin I. Winters to temperate and tropical regions.

200-1. *Charadrius hiaticula tundrae* (Lowe, 1915) ハジロコチドリ

Range: Breeds in Siberian tundras from Novaya Zemlya and n Russia eastward. Winters to the Mediterranean region, c Asia, and nw India, occasionally China and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Akita, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Toyama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima, Ehime), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Okinawajima I. (WV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV), Haterumajima I. (AV).

Habitat: Mudflats, estuaries, reclaimed lands.

北海道 (IV), 本州 (IV: 秋田, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 富山, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 岡山, 島根, 山口), 四国 (IV: 香川, 徳島, 愛媛), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島), 沖縄島 (WV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV), 波照間島 (AV).

干潟, 河口域, 干拓地に生息する.

201. *Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825 ミズカキチドリ

Mizukaki-chidori Semipalmated plover

Range: Nearctic. Breed in North America. Winters to South America and Hawaii.

Status: Honshu (AV: Aichi, Nov. 2006 - May 2007).

本州 (AV: 愛知, 2006 年 11 月 - 2007 年 5 月).

202. *Charadrius placidus* Gray & Gray, 1863 イカルチドリ

Ikaru-chidori Long-billed Plover

Range: E Palearctic. Breeds from the Amur Basin, Ussuriland, and Manchuria south through e China to Szechwan and Yangtze Basin, Korea and Japan. Winters in Nepal to se Asia, s China, and Japan.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (RB: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I. AV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: River beds, rice fields, reclaimed lands. Breeds on upstream river beds, lake sides.

北海道 (MB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (RB: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島. AV: 宮古島, 石垣島, 西表島).

河川, 湖沼, 中州, 水田などに生息する.

203. *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 コチドリ

Ko-chidori Little Ringed Plover

Range: Eurasian, marginally African and Australasian. Breeds in Eurasia except arctic tundras and e China, south to nw Africa, India, Sri Lanka, Malay Peninsula, Philippines, and New Guinea. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

203-1. *Charadrius dubius curonicus* Gmelin, 1789 コチドリ

Range: N Africa, Europe, s China, se Asia to the Philippines, and New Guinea. Asian birds winter to s Asia, Philippines, and Sunda Is.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB. RB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB. MB), Kyushu (MB, PV), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I., Nishinoshima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV. WV), Ryukyu Is. (WV. CB: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV).

Habitat: Riverbeds, reclaimed lands, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB. RB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV),

隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (RB. MB), 九州 (MB, PV), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島, 西之島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV. WV), 琉球諸島 (WV. CB: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV).

河川, 農耕地, 干拓地に生息する.

204. *Charadrius alexandrinus* Linnaeus, 1758 シロチドリ

Shiro-chidori Kentish Plover

Range: Nearly cosmopolitan, but mainly coastal. Breeds from w Europe east across c Asia to e China, Manchuria, Korea, and Japan, south to the Mediterranean region, Arabian Peninsula, nw India, Sri Lanka, and coasts of Indochina; also coasts of Africa, Madagascar, Australia, Americas, and West Indies. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

204-1. *Charadrius alexandrinus alexandrinus* Linnaeus, 1758 ハシボソシロチドリ

Range: Breeds from w Europe to Transbaikalia, south to n Africa and w India. Winters in the Mediterranean region, tropical Africa, India, and Sri Lanka.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Tokyo, Kanagawa, Niigata), Izu Is. (AV: Oshima I.), Okinawa Is. (AV: Kumejima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 東京, 神奈川, 新潟), 伊豆諸島 (AV: 大島), 沖縄諸島 (AV: 久米島).

204-2. *Charadrius alexandrinus dealbatus* (Swinhoe, 1870) シロチドリ

Range: Breed in Japan and se and e China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Oki (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Iki (RB), Tsushima (AV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated fields, river beds, sandy beaches, mudflats, estuaries. Breeds in sandy beaches, reclaimed lands, pebbly shorelines.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 隠岐 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 奄岐 (RB), 対馬 (AV), 男女群島 (PV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東

島)。

海岸や河口域の砂州，埋立地などで繁殖し，干潟，干拓地などにも生息する。

205. *Charadrius mongolus* Pallas, 1776 メダイチドリ

Medai-chidori Mongolian Plover

Range: C and e Palearctic. Breeds in Pamir, Tibet to c China, and discontinuously in e Siberia from the Stanovoi range to the Chukot Peninsula and Kamchatka. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

205-1. *Charadrius mongolus mongolus* Pallas, 1776 モウコメダイチドリ

Range: Breeds in the Stanovoi and Verhoyansk ranges in Russian Far East. Winters from Taiwan to Australia.

Status: Honshu (AV: Chiba, Aug. 1957). No reliable records over the last 50 years.

本州 (AV: 千葉, 1957 年 8 月)。最近 50 年間以上，確実な国内記録がない。

205-2. *Charadrius mongolus stegmanni* Portenko, 1939 メダイチドリ

Range: Breeds in the Chukot Peninsula, Kamchatka, and Commander Is. Winters to tropical Asia, Micronesia, and Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Mudflats, sandy beaches, estuaries, reclaimed lands, occasionally coastal cultivated lands.

北海道 (PV)，南千島 (PV)，本州 (PV, WV)，佐渡 (PV)，舩倉島 (PV)，隠岐 (PV)，見島 (PV)，四国 (PV)，九州 (PV, WV)，対馬 (IV)，屋久島 (PV)，伊豆諸島 (PV)，小笠原群島 (IV)，硫黄列島 (IV: 北硫黄島，硫黄島)，トカラ列島 (PV)，奄美諸島 (PV, WV)，琉球諸島 (PV, WV)，大東諸島 (IV)。

干潟，砂質海岸，河口域，干拓地などに生息する。

206. *Charadrius leschenaultii* Lesson, 1826 オオメダイチドリ

O-medai-chidori Greater Sand Plover

Range: C and e Palearctic. Breeds from Armenia to the Altai and Mongolia, south to Asia Minor and Transcaspia. Winters in s Africa, Persian Gulf, se Asia, Philippines, and s Pacific islands south to Australia.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (PV), Sado (AV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV. WV: Saga), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Izenajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, sandy beaches, estuaries.

北海道 (AV), 本州 (PV), 佐渡 (AV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV. WV: 佐賀), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊是名島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 黒島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

干潟, 砂質海岸, 河口域などに生息する.

207. *Charadrius veredus* Gould, 1848 オオチドリ

O-chidori Oriental Plover

Range: C and e Palearctic. Breeds from Transcaucasia and s Russia east to the Aral Sea and discontinuously from Mongolia to nw Manchuria. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Niigata, Ibaraki, Saitama, Kanagawa, Yamanashi, Aichi, Ishikawa, Mie, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Yakushima I. (AV), Tokara Is. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Iejima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., PV: Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Grasslands, cultivated land.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 新潟, 茨城, 埼玉, 神奈川, 山梨, 愛知, 石川, 三重, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 岡山, 島根, 山口), 粟島 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 屋久島 (AV), トカラ列島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八

丈島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 伊江島, 久米島, 宮古島, 西表島. PV: 与那国島, 波照間島), 南大東島 (AV).

草原, 農耕地に生息する.

208. *Charadrius morinellus* Linnaeus, 1758 コバシチドリ

Kobashi-chidori Eurasian Dotterel

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in arctic tundras from n Scandinavia to the Chukot Peninsula and w coast of Alaska, south to s Siberia and nw Mongolia; also sporadically in c Europe and Italy. Winters to s Europe, n Africa, Arabian Peninsula, and Iran; casual in Japan and w US.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Mie, Nara, Wakayama, Hiroshima), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 三重, 奈良, 和歌山, 広島), 四国 (AV: 香川, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 長崎), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV).

Family HAEMATOPODIDAE ミヤコドリ科

HAEMATOPUS Linnaeus ミヤコドリ属

209. *Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758 ミヤコドリ

Miyakodori Oystercatcher

Range: Nearly cosmopolitan, but mainly coastal. Breeds in Iceland, British Isles, coastal Europe east to the Okhotsk coast and Kamchatka; also coasts of s Africa, Australia, New Zealand, and Americas. Northern birds migratory, winters to warmer regions.

209-1. *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe, 1871 ミヤコドリ

Range: Breeds in Kamchatka, Commander Is., coasts of the n Okhotsk Sea, se Manchuria, and n Korea. Winters on the s China coast, Taiwan, w and s Myanmar and Japan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (WV), Hegurajima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (WV), Tsushima (AV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I., Chichijima I.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Kikaijima I., Okinoerabujima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Chiefly rocky and sandy shores, estuaries.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (WV), 舩倉島 (AV), 四国 (IV), 九州 (WV), 対馬 (AV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 聳島, 父島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島, 喜界島, 沖永良部島), 琉球諸島 (IV: 沖繩島, 宮古島, 石垣島, 西表島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

岩礁・砂浜海岸, 河口域などに生息する.

Family RECURVIROSTRIDAE セイタカシギ科

HIMANTOPUS Brisson セイタカシギ属

210. *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) セイタカシギ

Seitaka-shigi Black-winged Stilt

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds discontinuously from s Europe to n China, Japan, India, se Asia, New Guinea, Australia, and New Zealand; also tropical and s Africa, Madagascar, Americas from the US to s South America, West Indies, and Hawaii Is. Mainly sedentary.

210-1. *Himantopus himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) セイタカシギ

Range: Breeds in s Eurasia, Japan (Honshu), e and tropical w Africa, and Madagascar. Migratory and sedentary, wintering to tropical Africa, India, se Asia, se China and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (RB: Chiba, Tokyo, Aichi. CB: Osaka. PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Izu Is. (IV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Minamijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV, PV: Iheyajima I., Izena-

jima I., Agunijima I., Tokashikijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I. CB: Okinawajima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Shallow marshes, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (RB: 千葉, 東京, 愛知. CB: 大阪. PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 伊豆諸島 (IV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 南島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV, PV: 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 渡嘉敷島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島. CB: 沖縄島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

水田, 河口部, 湖沼畔, 湿地に生息する.

210-2. *Himantopus himantopus leucocephalus* Gould, 1837 オーストラリアセイタカシギ

Range: Breeds in the Philippines, Borneo, Java to New Guinea, Australia, and New Zealand. Sedentary but occasionally erratic; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV: May 1994), Honshu (AV: Ibaraki, Oct. 1986, Tokyo, Jun. 1994, Kanagawa, Wakayama), Kyushu (AV: Kagoshima), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV: May and Jun. 1987).

北海道 (AV: 1994 年 5 月), 本州 (AV: 茨城, 1986 年 10 月, 東京, 1994 年 6 月, 神奈川, 和歌山), 九州 (AV: 鹿児島), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV: 1987 年 5, 6 月).

RECURVIROSTRA Linnaeus ソリハシセイタカシギ属

211. *Recurvirostra avosetta* Linnaeus, 1758 ソリハシセイタカシギ

Sorihashi-seitaka-shigi Pied Avocet

Range: Palearctic, locally Afrotropical. Breeds discontinuously and locally from Europe and nw Africa across w and c Asia to Mongolia; also locally in e and s Africa. Migratory and sedentary, wintering to the Mediterranean region, Africa, and India to s China; occasional in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Nara, Tottori, Shimane, Okayama, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima),

Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I.), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Estuaries, brackish and salt lagoons, shallow inland pools.

北海道 (AV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 大阪, 奈良, 鳥取, 島根, 岡山, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 香川, 徳島), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (AV).

河口部, 干潟, 内陸湿地に生息する.

Family SCOLOPACIDAE シギ科

SCOLOPAX Linnaeus ヤマシギ属

212. *Scolopax rusticola* Linnaeus, 1758 ヤマシギ

Yama-shigi Eurasian Woodcock

Range: Palearctic. Breeds from Europe east through s Siberia to Sakhalin and Japan; also from the Caucasus to w China. Winters to the Mediterranean region, n Africa, India, s China to se Asia, and s Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (MB), c Honshu (RB, WV), sw Honshu (WV. CB: Wakayama, Tottori), Sado (WV), Oki (WV), Mishi-ma I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (RB, WV: Oshima I., Nijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (WV).

Habitat: Woodlands, abandoned cultivated lands, meadows.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (MB), 本州中部 (RB, WV), 本州南西部 (WV. CB: 和歌山, 鳥取), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (RB, WV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列

島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (WV).

落葉広葉樹林, 針広混交林, 常緑広葉樹林などに生息し, 休耕田, 湿地などでも採食する.

213. *Scolopax mira* Hartert, 1916 アマミヤマシギ

Amami-yama-shigi Amami Woodcock

Range: E Palearctic. Endemic to the Amami Is. and Okinawa Is. Sedentary.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Ukeshima I., Yoroshima I., Tokunoshima I. WV: Kikaijima I., Okinoerabujima I.), Okinawa Is. (WV: n Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Akashima I.).

Habitat: Evergreen broadleaved woods, cultivated fields.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 請島, 与路島, 徳之島. WV: 喜界島, 沖永良部島), 沖縄諸島 (WV: 沖縄島北部, 伊平屋島, 久米島, 渡嘉敷島, 阿嘉島).

常緑照葉樹林や農耕地に生息する.

LYMNOCRYPTES Kaup コシギ属

214. *Lymincryptes minimus* (Brünnich, 1764) コシギ

Ko-shigi Jack Snipe

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to the Kolyma Basin, south to the Baltic states and n Kazakhstan. Winters to s Europe, tropical Africa, and India to se Asia, occasionally in e China, Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Etorofuto I.), Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Akita, Fukushima, Ibaraki, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV: Kochi), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Inland marshes, lake shores, rice fields, rivers, grasslands.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 択捉島), 本州 (AV: 青森, 宮城, 秋田, 福島, 茨城, 群馬, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 京都, 大阪, 兵庫, 島根, 山口), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (IV: 高知), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).

湿原, 湖沼畔, 水田, 河川沿い, 草地に生息する.

GALLINAGO Brisson タシギ属

215. *Gallinago solitaria* Hodgson, 1831 アオシギ

Ao-shigi Solitary Snipe

Range: C and e Palearctic. Breeds in the Altai, Tian Shan, nw Mongolia, Turkestan, and Lake Baikal; also Himalayas, Tibet, and w China. Migratory and sedentary, wintering to temperate Asia.

215-1. *Gallinago solitaria japonica* (Bonaparte, 1856) アオシギ

Range: Ne Mongolia to nw China. Winters from the Amur Basin and Kamchatka to China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Taketomijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Mountain streams, mountain marshes, lake shores.

北海道 (WV), 南千島 (WV: 択捉島, 国後島, 色丹島), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 竹富島, 西表島).

山間部の溪流, 湿原, 水田, 湖沼畔などに生息する.

216. *Gallinago hardwickii* (Gray, 1831) オオジシギ

O-ji-shigi Latham's Snipe

Range: E Palearctic. Breeds in se Ussuriland, s Sakhalin, and Japan south to c Honshu. Winters in New Guinea, Australia, and Tasmania. Recorded from Taiwan and New Zealand.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.), n Honshu (MB), c and sw Honshu (PV. MB: Tochigi, Gunma, Nagano, Yamanashi, Shizuoka, Gifu, Okayama. CB: Saitama, FB: Hiroshima), Awashima I. (IV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (CB: Ehime, Kochi), Kyushu (MB: Kumamoto, Oita), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iejima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.,

Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Inland marshes, lake shores, grasslands, river beds, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 択捉島, 国後島, 色丹島), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (PV, MB: 栃木, 群馬, 長野, 山梨, 静岡, 岐阜, 岡山, CB: 埼玉, FB: 広島), 粟島 (IV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (AV), 四国 (CB: 愛媛, 高知), 九州 (MB: 熊本, 大分), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊江島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

草地, 農耕地, 河川敷, 湿原などに生息する.

217. *Gallinago stenura* (Bonaparte, 1830) ハリオシギ

Hario-shigi Pintail Snipe

Range: C and e Palearctic. Breeds in e Siberia from the Lena River to the Okhotsk coast and Anadyrland, south to the Altai, Amur Basin, and Manchuria. Winters from India to se Asia and s China, Philippines, and Sunda Is.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, IV: Iwate, Miyagi, Niigata, Fukushima, Gunma, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Shiga, Kyoto, Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Hegurajima I. (IV), Oki (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV: Tokushima, Kochi), Kyushu (PV, IV: Oita, Miyazaki, Kagoshima), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.). Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Fresh and saltwater lakes, marshes, rivers, rice fields.

北海道 (IV), 南千島 (PV), 本州 (PV, IV: 岩手, 宮城, 新潟, 福島, 群馬, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 滋賀, 京都, 兵庫, 島根, 広島, 山口), 舩倉島 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (AV), 四国 (IV: 徳島, 高知), 九州 (PV, IV: 大分, 宮崎, 鹿児島), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 鴎島, 父島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島). 大東諸島 (IV: 南大東島).

湖沼, 河川, 水田, 湿地などに生息する.

218. *Gallinago megala* Swinhoe, 1861 チュウジシギ

Chu-ji-shigi Swinhoe's Snipe

Range: C and e Palearctic. Breeds in se Siberia from the upper Enisei and Altai to n Mongolia, Lake Baikal, Transbaikalia, Amur Basin and Ussuriland. Winters from India to se Asia and se China, Philippines, and Sunda Is. to Australia.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (PV, IV), Sado (PV, IV), Oki (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (PV, IV), Kyushu (PV, IV), Tsushima (PV), Izu Is. (IV: Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I.).

Habitat: Fresh and saltwater lakes, marshes, rivers, rice fields.

北海道 (IV), 本州 (PV, IV), 佐渡 (PV, IV), 隠岐 (PV), 見島 (AV), 四国 (PV, IV), 九州 (PV, IV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 栗国島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島).

湖沼, 河川, 水田, 湿地などに生息する.

219. *Gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) タシギ

Ta-shigi Snipe

Range: Palearctic and New World. Breeds in Iceland, British Isles, and sw Europe east to Anadyrland, Kamchatka, and Commander Is., south to the Kirghiz Steppes, Turkestan, Manchuria, and Ussuriland; also North and South Americas. Winters to temperate and tropical regions.

219-1. *Gallinago gallinago gallinago* (Linnaeus, 1758) タシギ

Range: Range of the species except Iceland, Faeroes, and New World. Winters to tropical Africa, India, se Asia, Marianas, and Sunda Is.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV, WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (PV, WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV, IV: Niijima I., Shikinejima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is.

(PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Lake, shores, marshes, rivers, rice fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV, WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (PV, WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV, IV: 新島, 式根島, 八丈島, 青ヶ島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

湖沼, 河川, 水田, 湿地などに生息する.

LIMNODROMUS Wied オオハシシギ属

220. *Limnodromus griseus* (Gmelin, 1789) アメリカオオハシシギ

Amerika-ohashi-shigi Short-billed Dowitcher

Range: N Nearctic. Breeds from s Alaska south locally to British Columbia and east to n Quebec in Canada. Winters from Middle America south to c Peru and Brazil; accidental in Japan.

220-1. *Limnodromus griseus hendersoni* Rowan, 1932 アメリカオオハシシギ

Range: Breeds in c Canada. Winters to se US to Panama.

Status: Honshu (AV: Kanagawa, Sep. 1982, Shizuoka, Aug. 1987), Shikoku (AV: Tokushima, Aug. 1987).

本州 (AV: 神奈川, 1982 年 9 月, 静岡, 1987 年 8 月), 四国 (AV: 徳島, 1987 年 8 月).

221. *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1822) オオハシシギ

Ohashi-shigi Long-billed Dowitcher

Range: E Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in ne Siberia east of the Lena River to the Chukot Peninsula, w coast of Alaska, and locally the Mackenzie Basin. Winters to California, Mexico, and Guatemala; occasionally in Japan.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV, IV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (PV, WV), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I.).

Habitat: Marshes, shallow ponds, occasionally mudflats, estuaries.

北海道 (PV), 本州 (PV, IV), 見島 (AV), 四国 (IV), 九州 (PV, WV), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島).

湿地, 湖沼などに生息し, ときどき干潟に出る.

222. *Limnodromus semipalmatus* (Blyth, 1848) シベリアオオハシシギ

Shiberia-ohashi-shigi Asiatic Dowitcher

Range: C and e Palearctic. Breeds sporadically from the Omsk region to Transbaikalia, Mongolia, and Amur Basin, south to c Manchuria and Ussuriland. Winters to e India, Malay Peninsula, Indochina, and se China; occasionally in Japan on migration.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.).

Habitat: Coastal paddy fields, grassy marshes, mudflats.

北海道 (AV), 本州 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島).

湿地, 干潟, 干拓地などに生息する.

LIMOSA Brisson オグロシギ属

223. *Limosa limosa* (Linnaeus, 1758) オグロシギ

Oguro-shigi Black-tailed Godwit

Range: Palearctic. Breeds in Iceland, s Scandinavia, and from nw Russia across Siberia and Kirghiz Steppes to Anadyrland and Kamchatka, south to Mongolia. Winters to temperate and tropical regions south to the Southern Hemisphere.

223-1. *Limosa limosa melanuroides* Gould, 1846 オグロシギ

Range: Breeds from Mongolia to Anadyrland and Kamchatka. Winters to India, se Asia, and Philippines to Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV: Nagasaki), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Miyakejima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, reclaimed lands, coastal rice fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV. WV: 長崎), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

干潟, 河口域, 干拓地, 海岸沿いの水田などに生息する.

224. *Limosa haemastica* (Linnaeus, 1758) アメリカオグロシギ

Amerika-oguro-shigi Hudsonian Godwit

Range: N Nearctic. Breeds in nw Alaska to Hudson Bay. Winters to se South America and sc Chile.

Status: Kyushu (AV: Saga, May 2007).

九州 (AV: 佐賀, 2007 年 5 月).

225. *Limosa lapponica* (Linnaeus, 1758) オオソリハシシギ

O-sorihashi-shigi Bar-tailed Godwit

Range: N Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from n Scandinavia east across n Siberia to n Russian Far East and s coast of Alaska. Winters to temperate and tropical regions south to the Southern Hemisphere.

225-1. *Limosa lapponica menzbieri* Portenko, 1936 コシジロオオソリハシシギ

Range: Breeds probably in the Indigirka delta in Russian Far East. Recorded from Korea, Japan, and Taiwan.

Status: Honshu (AV: Akita, Saitama, Tokyo, 1945, Kanagawa, Oct. 1954), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (AV: Miyazaki, Oct. 2005), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Dec. 1921, Ishigakijima I., Nov. 1921).

本州 (AV: 秋田, 埼玉, 東京, 1945 年, 神奈川, 1954 年 10 月), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (AV: 宮崎, 2005 年 10 月), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 1921 年 12 月, 石垣島, 1921 年 11 月).

225-2. *Limosa lapponica baueri* Naumann, 1836 オオソリハシシギ

Range: Breeds in ne Siberia and Russian Far East to nw Alaskan coasts. Winters to se Asia, Australia, New Zealand, Hawaiian Is., and islands in the sw Pacific.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (PV), Mishima

I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Izenajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Mudflats, estuaries, reclaimed lands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊是名島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 与那国島), 南大東島 (IV).

干潟, 河口部, 干拓地などに生息する.

NUMENIUS Brisson ダイシャクシギ属

226. *Numenius minutus* Gould, 1841 コシャクシギ

Koshaku-shigi Little Curlew

Range: E Palearctic. Breeds in the Indigirka Basin, south probably to Lake Baikal and Amur Basin. Winters from the Moluccas east to New Guinea and Australia.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV), Awashima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Coastal rice fields, grassy marshes, grasslands, reclaimed lands, sandy beaches, estuaries.

北海道 (PV), 本州 (PV), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).

海岸沿いの水田, 湿地, 草地, 干拓地, 砂浜, 河口域などに生息する.

227. *Numenius phaeopus* (Linnaeus, 1758) チュウシャクシギ

Chushaku-shigi Whimbrel

Range: N Holarctic. Breeds in tundra and mountainous areas in Europe, Siberia, n Russian Far East, and North America from Alaska to Hudson Bay. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

227-1. *Numenius phaeopus variegatus* (Scopoli, 1786) チュウシャクシギ

Range: Breeds in ne Siberia and n Russian Far East from Verkhoyansk to Anadyrland. Winters to India, se Asia, se China, Philippines, Australia, and New Zealand.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, locally WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (PV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (PV: Minami-Daitojima I., Oki-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, reclaimed lands, marshes, grasslands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, 一部 WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (PV: 聳島, 父島, 母島), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (PV: 南大東島, 沖大東島).

干潟, 河口部, 岩礁海岸, 干拓地, 湿地などに生息する.

228. *Numenius tahitiensis* (Gmelin, 1789) ハリモモチュウシャク

Harimomo-chushaku Bristle-thighed Curlew

Range: N Nearctic. Breeds in w Alaska near the mouth of the Yukon River. Winters to islands of the sw Pacific.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Yamagata, Niigata, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Aichi, Mie, Shiga, Kyoto, Okayama), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Minami-Torishima I. (AV), Okinawajima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 山形, 新潟, 茨城, 千葉, 東京, 愛知, 三重, 滋賀, 京都, 岡山), 小笠原群島 (AV: 父島), 南鳥島 (AV), 沖縄島 (AV).

229. *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 シロハラチュウシャクシギ

Shirohara-chushaku-shigi Slender-billed Curlew

Range: C Palearctic. Breeds in steppes of sw Siberia and n Kazakhstan east

to n Lake Balkhash. Winters to the Mediterranean region, nw Africa, and Iraq; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: two specimens, locality and date are unspecified). No reliable records over the last 50 years.

本州 (AV: 2 標本, 確実な産地, 年月は不明). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

230. *Numenius arquata* (Linnaeus, 1758) ダイシャクシギ

Daishaku-shigi Eurasian Curlew

Range: Palearctic. Breeds from the British Isles and n and c Europe to Lake Baikal, Transbaikalia, and n Manchuria, south to the Caspian Sea. Winters to temperate and tropical regions.

230-1. *Numenius arquata orientalis* Brehm, 1831 ダイシャクシギ

Range: Breeds from se Russia east to Transbaikalia and n Manchuria. Winters to tropical Africa, s Caspian Sea, India, s China, s Japan, and Sunda Is.

Status: Hokkaido (PV), n Honshu (PV), c and sw Honshu (PV, WV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Izu Is. (PV, WV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Kerama Is., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, wet grass field, cultivated fields.

北海道 (PV), 本州北部 (PV), 本州中・南西部 (PV, WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (PV, WV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 慶良間諸島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 黒島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

干潟, 河口部, 農耕地などに生息する.

231. *Numenius madagascariensis* (Linnaeus, 1766) ホウロクシギ

Horoku-shigi Far Eastern Curlew

Range: E Palearctic. Breeds in Kamchatka, Okhotsk coast, n Manchuria, and Ussuriland. Winters from the Philippines to New Guinea and Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, locally WV: Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki), Tsushima (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Izenajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, grass fields cultivated fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, 一部 WV: 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎), 対馬 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島, 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊是名島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 黒島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

干潟, 河口部, 農耕地などに生息する.

TRINGA Linnaeus クサシギ属

232. *Tringa erythropus* (Pallas, 1764) ツルシギ

Tsuru-shigi Spotted Redshank

Range: N Palearctic. Breeds from n Scandinavia east across n Siberia to Anadyrland. Winters to the Mediterranean region, c Africa, India, and s China to Indochina.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV).

Habitat: Coastal rice fields, marshes, estuaries, mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV).

水田, 休耕田, 干拓地, 干潟などに生息する.

233. *Tringa totanus* (Linnaeus, 1758) アカアシシギ

Aka-ashi-shigi Common Redshank

Range: Palearctic. Breeds in Iceland, British Isles, sw Europe locally, and from c Europe east across s Russia to Ussuriland, Sakhalin, and n Japan, south to n Iran, Himalayas, and Tibet. Winters to temperate and tropical regions.

233-1. *Tringa totanus ussuriensis* Buturlin, 1934 アカアシシギ

Range: Breeds in c and e Asia from the Altai to Mongolia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido, south to n Tibet. Winters to India, Sri Lanka, Myanmar, se Asia, Philippines, and Indonesia to the Moluccas.

Status: Hokkaido (PV. MB: e Hokkaido), s Kurile Is. (PV. MB: Kunashirito I.), Honshu (PV), Sado (PV), Higurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (IV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Oshima I.), Ogasawara Is. (PV: Chichijima I., Minamijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV, PV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Coastal marshes, estuaries, mudflats, rice fields. Breeds in swamps, grasslands.

北海道 (PV. MB: 東部), 南千島 (PV. MB: 国後島), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (IV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島), 小笠原群島 (PV: 父島, 南島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV, PV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).

湿地, 草原で繁殖し, 湿地, 干潟, 河口部, 干拓地, 水田などで採食する.

234. *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) コアオアシシギ

Ko-ao-ashi-shigi Marsh Sandpiper

Range: C and e Palearctic. Breeds from se Europe east across the Kirghiz Steppes to Zaisan Nor and discontinuously from Transbaikalia to nw Manchuria. Winters to s Africa and Australia.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV, WV), Sado (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Ogasawara Is. (IV: Minamijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Iri-

motejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, marshes, reclaimed lands, occasionally mudflats, estuaries.

北海道 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (IV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 小笠原群島 (IV: 南島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

水田, 干拓地, 湿地, 干潟, 河口部などに生息する.

235. *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) アオアシシギ

Ao-ashi-shigi Common Greenshank

Range: N Palearctic. Breeds in tundras from n Europe east to Anadyrland and Kamchatka, south to n Lake Baikal and Amur Basin. Winters from the Mediterranean region to s Africa, India to Indochina, Philippines, Australia, and New Zealand.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, locally WV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, locally WV), Kyushu (PV, locally WV), Tsushima (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (PV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (PV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (PV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, marshes, shallow ponds, reclaimed lands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, 一部 WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV, 一部 WV), 九州 (PV, 一部 WV), 対馬 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (PV: 父島, 母島), 硫黄列島 (PV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 黒島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

干潟, 河口部, 湿地, 湖沼, 干拓地などに生息する.

236. *Tringa guttifer* (Nordmann, 1835) カラフトアオアシシギ

Karafuto-aoashi-shigi Spotted Greenshank

Range: E Palearctic. Breeds in Sakhalin, possibly also in Kamchatka, Bering Sea Is., and Okhotsk coast. Winters in ne India, Myanmar, and s China; rare in Japan on migration.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Okinawajima I. (IV), Yaeyama Is. (IV: Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Estuaries, mudflats, coastal rice fields.

北海道 (IV), 本州 (IV), 見島 (AV), 四国 (IV), 九州 (IV), 沖縄島 (IV), 八重山諸島 (IV: 石垣島, 西表島).

河口部, 干潟, 水田などに生息する.

237. *Tringa melanoleuca* (Gmelin, 1789) オオキアシシギ

O-kiashi-shigi Greater Yellowlegs

Range: Nearctic. Breeds from nw Alaska to the interior regions of n Canada, south to c British Columbia, Newfoundland, and Nova Scotia. Winters from s Canada to South America; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Miyagi, Ibaraki, Saitama, Kanagawa, Aichi, Ishikawa, Hiroshima, Yamaguchi), Shikoku (AV: Tokushima), Okinawajima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 宮城, 茨城, 埼玉, 神奈川, 愛知, 石川, 広島, 山口), 四国 (AV: 徳島), 沖縄島 (AV).

238. *Tringa flavipes* (Gmelin, 1789) コキアシシギ

Ko-kiashi-shigi Lesser Yellowlegs

Range: Nearctic. Breeds from c Alaska and Yukon south to c British Columbia, c Saskatchewan and se Manitoba in Canada. Winters to the Gulf coast, Middle America, West Indies, and South America; straggles to Europe, Azores, Zambia, Aleutian Is., Pribilof Is., Japan, and New Zealand.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Miyagi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Wakayama, Osaka, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Oita), Ogasawara Is. (AV: Minamijima I.), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 宮城, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 和歌山, 大阪, 岡山, 島根, 山口), 四国 (AV: 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 大分), 小笠原群島 (AV: 南島), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV).

239. *Tringa ochropus* Linnaeus, 1758 クサシギ

Kusa-shigi Green Sandpiper

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia and c Europe to the Amur Basin, south to the Altai. Winters to the Mediterranean region, Africa, India, se Asia, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (WV), Oki (PV, WV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV, WV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Kerama Is., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV).

Habitat: Cultivated lands, marshes, rivers, occasionally estuaries, mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (PV, WV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV, WV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 慶良間諸島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV).

農耕地, 湿地, 河口部, 河川などに生息する.

240. *Tringa glareola* Linnaeus, 1758 タカブシギ

Takabu-shigi Wood Sandpiper

Range: N Palearctic. Breeds from Scandinavia east across Siberia to Anadyrland, Kamchatka, Commander Is., and n Kurile Is. Winters to the Mediterranean region, s Africa, India, s China to se Asia, Philippines, Sunda Is., and Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, locally WV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, locally WV), Kyushu (PV, locally WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Kerama Is., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (PV: Kita-

Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, grass fields, reclaimed land, marshes, estuaries, rarely mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, 一部 WV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV, 一部 WV), 九州 (PV, 一部 WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 慶良間諸島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (PV: 北大東島, 南大東島).

水田, 干拓地, 湿地, 農耕地, 河川, 河口部などに生息する.

HETEROSCELUS Baird キアシシギ属

241. *Heteroscelus brevipes* (Vieillot, 1816) キアシシギ

Kiashi-shigi Grey-tailed Tattler

Range: E Palearctic. Breeds in e Siberia and n Russian Far East, south to Lake Baikal and Kamchatka. Winters in s China, Taiwan, Indonesia, Philippines to New Guinea, Australia, and New Zealand; straggles to the British Isle.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (PV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I., Meijima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (PV).

Habitat: Mudflats, estuaries, rocky shores, occasionally grasslands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (PV: 聳島, 父島, 母島, 姪島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (PV).

干潟, 河口部, 岩礁海岸などに生息する.

242. *Heteroscelus incanus* (Gmelin, 1789) メリケンキアシシギ

Meriken-kiashi-shigi Wandering Tattler

Range: N Nearctic. Breeds in Alaska and w Canada from Yukon to nw British Columbia. Winters to w coasts of the Americas, Micronesian Is., and Polynesian Is., south to Australia and New Zealand.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV: Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (AV: Iwate, Miyagi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Shimane), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto), Izu Is. (AV: Oshima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Amami Is. (AV: Yoronjima I.), Okinawajima I. (IV), Yonagunijima I. (AV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I., Oki-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, sandy beaches, rocky shores.

北海道 (IV), 南千島 (PV: 国後島, 色丹島), 本州 (AV: 岩手, 宮城, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 島根), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 大分, 熊本), 伊豆諸島 (AV: 大島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島, 硫黄島), 南鳥島 (AV), 奄美諸島 (AV: 与論島), 沖縄島 (IV), 与那国島 (AV), 大東諸島 (IV: 南大東島, 沖大東島).

干潟, 河口部, 砂質海岸, 岩礁海岸などに生息する.

XENUS Kaup ソリハシシギ属

243. *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) ソリハシシギ

Sorihashi-shigi Terek Sandpiper

Range: C and e Palearctic. Breeds from n Russia across e Siberia to Anadyrland, south to Lake Baikal and Amur Basin. Winters to the Persian Gulf, s Africa, India, and se Asia to Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Minamijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, sandy beaches.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島

(PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 南島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

干潟, 河口域, 砂質海浜などに生息する.

ACTITIS Illiger イソシギ属

244. *Actitis hypoleucos* (Linnaeus, 1758) イソシギ

Iso-shigi Common Sandpiper

Range: Palearctic. Breeds from Europe east through Siberia to Anadyrland, Kamchatka, Sakhalin, and Japan, south to the Caspian Sea, Mongolia, Manchuria, and Ussuriland. Winters from s Europe to s Africa, India, se Asia, s China, and Japan, south to Australia.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (RB, MB), c and sw Honshu (RB, PV), Awashima I. (MB, PV), Sado (RB, PV), Oki (RB, PV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB, PV), Kyushu (RB, PV), Tsushima (RB, PV), Goto Is. (RB, PV), Danjo Is. (RB, PV), Yakushima I. (RB, PV), Tanegashima I. (RB, PV), Izu Is. (PV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (WV, PV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (PV).

Habitat: Rocky shores, inland lakes, marshes, river beds, grass fields. Breeds in pebbly river beds, lake shores.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (RB, MB), 本州中・南西部 (RB, PV), 粟島 (MB, PV), 佐渡 (RB, PV), 隠岐 (RB, PV), 見島 (PV), 四国 (RB, PV), 九州 (RB, PV), 対馬 (RB, PV), 五島列島 (RB, PV), 男女群島 (RB, PV), 屋久島 (RB, PV), 種子島 (RB, PV), 伊豆諸島 (PV: 式根島, 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (WV, PV: 聟島, 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (PV).

湖沼, 海岸, 河川などに生息する.

245. *Actitis macularius* (Linnaeus, 1766) アメリカイソシギ

Amerika-iso-shigi Spotted Sandpiper

Range: Nearctic. Breeds in Canada and n US, but not arctic. Winters to West

Indies, s US to c South America.

Status: Hokkaido (AV: May 2003).

北海道 (AV: 2003 年 5 月).

ARENARIA Brisson キョウジョシギ属

246. *Arenaria interpres* (Linnaeus, 1758) キョウジョシギ

Kyojo-shigi Ruddy Turnstone

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds from Scandinavia east across arctic Siberia to the Chukot Peninsula, arctic Canada, and Greenland. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

246-1. *Arenaria interpres interpres* (Linnaeus, 1758) キョウジョシギ

Range: Breeds in n Canada, Greenland and n Europe to ne Siberia and w Alaska. Winters south to s Africa, Australia, New Zealand, and South America.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Higurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (WV, PV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rocky shores, mudflats, estuaries, occasionally cultivated lands, marshes.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (WV, PV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 黒島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

岩礁海岸, 干潟, 河口部などに生息する.

CALIDRIS Merrem オバシギ属

247. *Calidris tenuirostris* (Horsfield, 1821) オバシギ

Oba-shigi Great Knot

Range: E Palearctic. Breeds in Russian Far East east to Anadyrland and south to the Okhotsk coast. Winters from the Persian Gulf to India, SE Asia, and Sunda Is. to Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (IV), Oki (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, grasslands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (IV), 隠岐 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

干潟, 河口部, 草原などに生息する.

248. *Calidris canutus* (Linnaeus, 1758) コオバシギ

Ko-oba-shigi Red Knot

Range: Holarctic, discontinuously circumpolar. Breeds in arctic and Siberia, islands in arctic Canada, and Greenland. Winters to temperate and tropical regions, south to the Southern Hemisphere.

248-1. *Calidris canutus rogersi* (Mathews, 1913) コオバシギ

Range: Breeds in the Chukot Peninsula. Winters to China, SE Asia, Australia, and New Zealand.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (AV), Danjo Is. (PV), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, sandy beaches.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (AV), 男女群島 (PV), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).

干潟, 河口部などに生息する.

249. *Calidris alba* (Pallas, 1764) ミユビシギ

Miyubi-shigi Sanderling

Range: Holarctic, discontinuously circumpolar. Breeds in Spitzbergen, New Siberian Is., arctic Siberian tundras, n Alaska, arctic Canada, and w Greenland. Winters from temperate regions, south to the Southern Hemisphere.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (AV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Chiefly sandy beaches, rarely mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (AV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

主に砂質の海岸, 稀に干潟に生息する.

250. *Calidris mauri* (Cabanis, 1857) ヒメハマシギ

Hime-hama-shigi Western Sandpiper

Range: W Nearctic, marginally Palearctic. Breeds on the w and n coasts of Alaska, islands in the Bering Sea, and ne coast of the Chukot Peninsula. Winters from the coast of California and Gulf of Mexico to n South America, occasionally c South America; casual in Japan.

Status: Honshu (AV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Toyama, Niigata, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Aichi, Ishikawa, Osaka, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Saga, Miyazaki, Kagoshima), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Minami-Daitojima I. (AV).

本州 (AV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 富山, 新潟, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 愛知, 石川, 大阪, 岡山, 島根, 広島, 山口), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 佐賀, 宮崎, 鹿児島), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 南大東島 (AV).

251. *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) トウネン

Tonen Rufous-necked Stint

Range: E Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in arctic tundras in n Russian Far East and locally nw Alaska. Winters to se Asia, s China, Philippines, Australia, and New Zealand.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Higurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, WV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (PV), Iwo Is. (PV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Mudflats, sandy beaches, estuaries.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, WV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (PV), 硫黄列島 (PV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (IV).

干潟, 河口部, 海岸などに普通に生息する.

252. *Calidris minuta* (Leisler, 1812) ヨーロッパトウネン

Yoroppa-tonen Little Stint

Range: N Palearctic. Breeds from n Norway east through arctic coasts of Siberia to the New Siberian Archipelago, sporadically in the Chukot Peninsula. Winters to Africa, Arabia, and India; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (WV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Mudflats, estuaries, rice fields.

北海道 (AV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 岩手, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 大分, 宮崎, 鹿児島), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (WV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV), 南大東島 (AV).

干潟, 海岸, 水田などに生息する.

253. *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) オジロトウネン

Ojiro-tonen Temminck's Stint

Range: N Palearctic. Breeds in tundras from n Scandinavia across n Siberia to the Chukot Peninsula. Winters to c Africa, Arabia, India, Sri Lanka, se Asia, s China, and Borneo.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Izenajima I., Tokashikijima I., Kumejima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I. AV: Miyakojima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Coastal cultivated lands, marshes, coastal and inland wetlands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊是名島, 渡嘉敷島, 久米島, 石垣島, 西表島, 与那国島. AV: 宮古島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

農耕地, 湿地などに生息する.

254. *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853) ヒバリシギ

Hibari-shigi Long-toed Stint

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the Ob River to Anadyrland, Kamchatka, and Commander Is., south to Transbaikalia, n Sakhalin, and n Kurile Is. Winters to India, se Asia, Sunda Is., and Philippines, occasionally Australia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, locally WV), Tsushima (IV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I. PV: Kumejima I.), Daito Is. (AV).

Habitat: Cultivated lands, grassy marshes.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, 一部 WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列

島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島. PV: 久米島), 大東諸島 (AV).

農耕地, 湿地などに生息する.

255. *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) コシジロウズラシギ

Koshijiro-uzura-shigi White-rumped Sandpiper

Range: N Nearctic. Breeds in ne Alaska and n Canada to s Baffin I. Winters to s South America.

Status: Honshu (AV: Niigata, Aug. 2011, Kanagawa, Aug. 2006).

本州 (AV: 新潟, 2011 年 8 月, 神奈川, 2006 年 8 月).

256. *Calidris bairdii* (Coues, 1861) ヒメウズラシギ

Hime-uzura-shigi Baird's Sandpiper

Range: N Nearctic, marginally Palearctic. Breeds on arctic coasts of Alaska and Canada, west to the Chukot Peninsula, and Greenland. Winters to s South America; occasionally in Japan.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV: Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Okayama), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Oita), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Grassy marshes, sandy beaches, cultivated lands, estuaries.

北海道 (PV), 本州 (PV: 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 岡山), 四国 (AV: 香川, 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 大分), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 石垣島, 与那国島).

海岸, 農耕地, 湿地, 河口などに生息する.

257. *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) アメリカウズラシギ

Amerika-uzura-shigi Pectoral Sandpiper

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in arctic coastal tundras from the Taimyr Peninsula east to n Alaska and n Canada. Winters to South America, islands in the c Pacific, Australia, and New Zealand; occasionally in Japan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV: Etorofuto I.), Honshu (PV), Sado (AV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (AV), Izu Is. (PV: Hachijojima

I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I. AV: Miyakojima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, grassy marshes, riverbeds.

北海道 (PV), 南千島 (PV: 択捉島), 本州 (PV), 佐渡 (AV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島. AV: 宮古島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

水田, 農耕地, 湿地, 河川などに生息する.

258. *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821) ウズラシギ

Uzura-shigi Sharp-tailed Sandpiper

Range: E Palearctic. Breeds in arctic Siberia from the Indigirka River to Koly-maland. Winters to se Asia, New Guinea, Australia, New Zealand, and islands in the sw Pacific.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Sado (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Minami-Torishima I. (AV), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rice fields, reclaimed lands, grassy marshes, mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 南鳥島 (AV), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (IV: 南大東島).

休耕田, 水田, 干拓地などに生息する. まれに干潟にも出現する.

259. *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) サルハマシギ

Saru-hama-shigi Curlew Sandpiper

Range: E Palearctic. Breeds in arctic Siberia from the Taimyr Peninsula to

Kolymaland. Winters to Africa, India, se Asia, Australia, and New Zealand.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV. WV: Ibaraki), Sado (PV), Hegurajima I. (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV).

Habitat: Mudflats, estuaries, rice fields, swamps.

北海道 (PV), 本州 (PV. WV: 茨城), 佐渡 (PV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV).

干潟, 河口, 水田, 湿地などに生息する.

260. *Calidris ptilocnemis* (Coues, 1873) チシマシギ

Chishima-shigi Rock Sandpiper

Range: N Pacific. Breeds in the Chukot Peninsula and w coast of Alaska, south to the Aleutian Is., Commander Is., and n Kurile Is. Winters along the Pacific coast of North America and to the s Kurile Is.; casual in Hokkaido and Honshu.

260-1. *Calidris ptilocnemis quarta* (Hartert, 1920) チシマシギ

Range: Breeds on the n Kurile Is. Rather sedentary, casual south to c Japan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV: Shikotanto I.), Honshu (AV: Chiba, Ishikawa, Tottori).

Habitat: Rocky shores.

北海道 (IV), 南千島 (PV: 色丹島), 本州 (AV: 千葉, 石川, 鳥取).
海岸の岩礁地に生息する.

261. *Calidris alpina* (Linnaeus, 1758) ハマシギ

Hama-shigi Dunlin

Range: N Holarctic. Breeds in Iceland, British Isles, and n Europe east through arctic Siberia to the arctic coast of Alaska, arctic Canada, and Greenland. Winters to temperate and tropical regions.

261-1. *Calidris alpina sakhalina* (Vieillot, 1816) ハマシギ

Range: Breeds in ne Siberia from the Kolyma to the Chukot Peninsula and islands in the Bering Sea, south to the n Okhotsk coast and n Kurile Is. Winters to e China south to Hainan and Japan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV, WV), Sado (PV), Oki

(PV, WV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV, WV), Kyushu (PV, WV), Tsushima (IV), Yakushima I. (PV, WV), Tanegashima I. (PV, WV), Izu Is. (PV: Shikinejima I., Niijima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Mudflats, sandy beaches, estuaries.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV, WV), 佐渡 (PV), 隠岐 (PV, WV), 見島 (PV), 四国 (PV, WV), 九州 (PV, WV), 対馬 (IV), 屋久島 (PV, WV), 種子島 (PV, WV), 伊豆諸島 (PV: 式根島, 新島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

干潟, 河口部などに生息する.

261-2. *Calidris alpina arctica* (Todd, 1953) キタアラスカハマシギ

Range: Breeds in nw Alaska, n Seward Peninsula, and nw Canada; winters in e China, Korea and Japan.

Status: Honshu (PV, WV: Chiba, Kanagawa, Ishikawa, etc.). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Mudflats, sandy beaches, estuaries.

本州 (PV, WV: 千葉, 神奈川, 石川等). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

干潟, 河口部などに生息する.

262. *Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826) アシナガシギ

Ashinaga-shigi Stilt Sandpiper

Range: N Nearctic. Breeds in n Alaska and n Canada south to w Hudson Bay. Winters to South America; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV: Jul. - Aug. 1993), Honshu (AV: Ibaraki, 2004, Tokyo, Aug. 1987, Aichi, Jul. 1977, Aug. 1992), Kyushu (AV: Fukuoka, 1970s), Ogasawara Is. (AV: Minamijima I., Sep. 1983).

北海道 (AV: 1993 年 7 - 8 月), 本州 (AV: 茨城, 2004 年, 東京, 1987 年 8 月, 愛知, 1977 年 7 月, 1992 年 8 月), 九州 (AV: 福岡, 1970 年代), 小笠原群島 (AV: 南島, 1983 年 9 月).

EURYNORHYNCHUS Nilsson ヘラシギ属

263. *Eurynorhynchus pygmeus* (Linnaeus, 1758) ヘラシギ

Hera-shigi Spoon-billed Sandpiper

Range: E Palearctic. Breeds on coastal tundras of Russian Far East from the Chukot Peninsula south to n Kamchatka. Winters to the coast of China south to Hainan and Indochina; rare in Japan on migration.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV. IV), Sado (IV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV. IV), Kyushu (PV. IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (PV, WV: Okinawajima I., Kumejima I. AV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Mudflats, estuaries, sandy beaches.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV. IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (AV), 見島 (IV), 四国 (PV. IV), 九州 (PV. IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 琉球諸島 (PV, WV: 沖縄島, 久米島. AV: 宮古島, 石垣島, 与那国島).

干潟, 河口部, 砂質海岸などに生息する. 秋期の記録が多い.

LIMICOLA Koch キリアイ属

264. *Limicola falcinellus* (Pontoppidan, 1763) キリアイ

Kiriai Broad-billed Sandpiper

Range: N Palearctic. Breeds from n Scandinavia through n Siberia to the Kolyma delta. Winters to temperate and tropical regions, south to the Southern Hemisphere.

264-1. *Limicola falcinellus sibirica* Dresser, 1876 キリアイ

Range: Breeds in e Siberia east of the Enisei River to the Kolyma delta. Winters from tropical Asia to Australia.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV), Sado (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (IV), Ogasawara Is. (IV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV).

Habitat: Mudflats, estuaries, rice fields, reclaimed lands.

北海道 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (IV), 小笠原群島 (IV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV).

干潟, 河口, 水田などに生息する. 秋の記録が多い.

TRYNGITES Cabanis コモンシギ属

265. *Tryngites subruficollis* (Vieillot, 1819) コモンシギ

Komon-shigi Buff-breasted Sandpiper

Range: N Nearctic. Breeds on coastal tundras of Alaska and Canada south to the Mackenzie Basin. Winters to South America; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Mie, Osaka, Wakayama, Shimane), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Miyazaki), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 宮城, 新潟, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 静岡, 愛知, 三重, 大阪, 和歌山, 島根), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 宮崎), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV).

PHILOMACHUS Merrem エリマキシギ属

266. *Philomachus pugnax* (Linnaeus, 1758) エリマキシギ

Erimaki-shigi Ruff

Range: N Palearctic. Breeds in n Europe east across Siberia to Anadyrland, south to n Germany, s Russia, and Altai. Winters in Europe, Mediterranean region to s Africa, Asia Minor, India, se Asia, se China, and Borneo.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV: Shikotanto I.), Honshu (PV: locally WV: Ibaraki), Sado (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV: locally WV: Kumamoto), Tsushima (AV), Izu Is. (PV: Miyakejima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: WV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Paddy fields, marshes, reclaimed lands, occasionally mudflats.

北海道 (PV), 南千島 (PV: 色丹島), 本州 (PV: 一部 WV: 茨城), 佐渡 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV: 一部 WV: 熊本), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: WV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

休耕田, 湿地, 干拓地などに生息する. 秋の記録が多い.

PHALAROPUS Brisson ヒレアシシギ属

267. *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819) アメリカヒレアシシギ

Amerika-hire-ashi-shigi Wilson's Phalarope

Range: Nearctic. Breeds in w and c North America from s Yukon and n Alberta south to California, Utah, and Colorado, east locally to s Ontario and sw Quebec. Winters in s South America and Falkland Is.; accidental in Japan.

Status: C Honshu (AV: Aichi, May 1985, Jul. 1986).

本州中部 (AV: 愛知, 1985 年 5 月, 1986 年 7 月). 2 例の記録がある.

268. *Phalaropus lobatus* (Linnaeus, 1758) アカエリヒレアシシギ

Aka-eri-hire-ashi-shigi Red-necked Phalarope

Range: N Holarctic. Breeds from Iceland and n Scandinavia to the Chukot Peninsula, n Alaska, n Canada, and s Greenland. Winters at sea in the w Pacific, Atlantic coasts of Africa, and Pacific coasts of South America.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (IV), Izu Is. (PV: Oshima I., Nijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Pelagic, also sandy beaches, coastal wetlands.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (IV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 聳島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 喜界島, 与論島), 琉球諸島 (IV), 南大東島 (AV).

外洋域及び砂浜海岸や海岸湿地に生息する.

269. *Phalaropus fulicarius* (Linnaeus, 1758) ハイイロヒレアシシギ

Haiiro-hire-ashi-shigi Red Phalarope

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds from Iceland and Spitzbergen to the Chukot Peninsula, n Alaska, arctic Canada, and Greenland. Winters at sea in the s Pacific and s Atlantic.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Izu Is. (PV: Nijima

I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Pelagic, rarely inland waters.

北海道 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 伊豆諸島 (PV: 新島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (PV), 沖縄島 (IV).

外洋域に生息し, まれに内陸の水域に飛来する.

Family JACANIDAE レンカク科

HYDROPHASIANUS Wagler レンカク属

270. *Hydrophasianus chirurgus* (Scopoli, 1786) レンカク

Renkaku Pheasant-tailed Jacana

Range: Indomalayan. Breeds in tropical Asia from India and Sri Lanka to Southeast Asia, S China, Philippines, and Greater Sunda Is., north to Nepal and Taiwan. Mainly sedentary.

Status: Honshu (AV: Aomori, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shimane, Okayama, Yamaguchi), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV), Tanegashima I. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Amami Is. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

本州 (AV: 青森, 茨城, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 滋賀, 三重, 奈良, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 島根, 岡山, 山口), 四国 (AV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV), 種子島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 奄美諸島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (AV).

Family ROSTRATULIDAE タマシギ科

ROSTRATULA Vieillot タマシギ属

271. *Rostratula benghalensis* (Linnaeus, 1758) タマシギ

Tama-shigi Greater Painted Snipe

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds from Asia Minor east through India and Sri Lanka to se Asia, e China, Korea, and Japan, south to the Greater Sunda Is. and Philippines; also Africa, Madagascar, and Australia. Migratory and sedentary, wintering in warmer areas.

271-1. *Rostratula benghalensis benghalensis* (Linnaeus, 1758) タマシギ

Range: Range of the species except Australia and Tasmania. Winters to se Asia, s China, and Japan; casual in Borneo.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Shikotanto I.), n Honshu (MB. CB), c and sw Honshu (RB), Mishima I. (AV), Sado (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Tanegashima I. (RB), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iriomotejima I. WV: Agunijima I., Kumejima I. AV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Rice fields, marshes, swamps, grass fields.

北海道 (AV), 南千島 (AV: 色丹島), 本州北部 (MB. CB), 本州中・南西部 (RB), 見島 (AV), 佐渡 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 種子島 (RB), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 西表島. WV: 栗国島, 久米島. AV: 宮古島, 石垣島, 与那国島).

水田, 湿地, 休耕地などに生息する.

Family TURNICIDAE ミフウズラ科

TURNIX Bonnaterre ミフウズラ属

272. *Turnix suscitator* (Gmelin, 1789) ミフウズラ

Mifu-uzura Barred Buttonquail

Range: Indomalayan. Breeds from India and Sri Lanka to Indochina, Malay Peninsula, Philippines, Sunda Is., and Sulawesi, north to s China, Taiwan, and Ryukyu Is. Sedentary.

272-1. *Turnix suscitator okinavensis* Phillips, 1947 ミフウズラ

Range: Resident in the Amami Is. and Ryukyu Is.

Status: Honshu (AV: Yamanashi, possibly escaped bird), Kyushu (AV: Kagoshima), Tanegashima I. (FB), Mageshima I. (FB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Kikaijima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Iejima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Grasslands, cultivated fields.

本州 (AV: 山梨, 人による持込みの可能性がある), 九州 (AV: 鹿児島), 種子島 (FB), 馬毛島 (FB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 徳之島, 沖永良部島, 喜界島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 伊江島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 与那国島, 波照間島).

草原, 農耕地などに生息する.

Family GLAREOLIDAE ツバメチドリ科

GLAREOLA Brisson ツバメチドリ属

273. *Glareola maldivarum* Forster, 1795 ツバメチドリ

Tsubame-chidori Indian Pratincole

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from India and Sri Lanka east through Assam to n Thailand, Tibet, and China, north to c Mongolia and se Transbaikalia; also Philippines and Japan. Winters to s China, Malay Peninsula, Java, and Borneo, south to Australia.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Etorofuto I.), Honshu (PV. CB: Ibaraki, Tochigi, Saitama, Aichi, Osaka, Tottori), Sado (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV. MB: Tokushima. CB: Ehime), Kyushu (IV. PV. CB: Fukuoka, Saga, Kumamoto. MB: Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Niijima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I. PV: Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV. MB: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (PV).

Habitat: River beds, salt beaches, cultivated fields, reclaimed lands.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 択捉島), 本州 (PV: CB: 茨城, 栃木, 埼玉, 愛知, 大阪, 鳥取), 佐渡 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV: MB: 徳島. CB: 愛媛), 九州 (IV: PV: CB: 福岡, 佐賀, 熊本. MB: 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 新島, 三宅島, 八丈島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (MB: 奄美大島. PV: 与論島), 琉球諸島 (PV: MB: 沖縄島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (PV).

草地, 乾燥した農耕地, 埋立地などに生息する.

Family LARIDAE カモメ科

ANOUS Stephens クロアジサシ属

274. *Anous stolidus* (Linnaeus, 1758) クロアジサシ

Kuro-ajisashi Brown Noddy

Range: Pantropical. Breeds on subtropical and tropical islands in the Pacific, Indian and Atlantic oceans. Sedentary but winters at sea.

274-1. *Anous stolidus pileatus* (Scopoli, 1786) クロアジサシ

Range: Breeds on islands in the Red Sea, Indian Ocean and subtropical and tropical Pacific Ocean, north to the Ogasawara Is. and south to islands off Australia.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (PV: Miyagi, Nagano, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Hyogo, Wakayama), Kyushu (PV: Fukuoka, Saga, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (MB: Mukojima Is., Hahajima Is., Nishinoshima I. PV: Chichijima I.), Iwo Is. (MB: Kangokuiwa I.), Minami-Torishima I. (MB), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Yakabijima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Sea coast, pelagic. Breeds on rocky islets.

北海道 (AV), 本州 (PV: 宮城, 長野, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 大阪, 兵庫, 和歌山), 九州 (PV: 福岡, 佐賀, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (MB: 聳島列島, 母島列島, 西之島. PV: 父島), 硫黄列島 (MB: 監獄岩), 南鳥島 (MB), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 屋嘉比島, 宮古島, 与那国島).

海岸, 海上に生息し, 小島で繁殖する.

274-2. *Anous stolidus pullus* Bangs, 1901 リュウキュウクロアジサシ

Range: Breeds on the s Ryukyu Is.

Status: Yaeyama Is. (MB: Nakanokamishima I.).

Habitat: Sea coast, pelagic. Breeds on rocky islets.

八重山諸島 (MB: 仲ノ神島).

海岸, 海上に生息し, 小島の岩礁上で繁殖する.

275. *Anous minutus* Boie, 1844 ヒメクロアジサシ

Hime-kuro-ajisashi Black Noddy

Range: Nearly Pantropical. Breeds on islands in the tropical Pacific and Atlantic oceans. Sedentary but winters at sea.

275-1. *Anous minutus marcusii* (Bryan, 1903) ヒメクロアジサシ

Range: Breeds on Wake I., Micronesian Is. and Japan.

Status: Iwo Is. (MB: Kangokuiwa I.), Minami-Torishima I. (FB), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Komakajima I., Minami-ukibarujiima I., Nakanokamishima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.).

Habitat: Sea coast, pelagic. Breeds on rocky islets.

硫黄列島 (MB: 監獄岩), 南鳥島 (FB), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, コマカ島, 南浮原島, 仲ノ神島, 宮古島, 石垣島).

海岸, 海上に生息し, 小島で繁殖する.

PROCELSTERNA Lafresnaye ハイイロアジサシ属

276. *Procelsterna cerulea* (Bennett, 1840) ハイイロアジサシ

Haiiro-ajisashi Blue Noddy

Range: Oceanic in the Pacific. Breeds on islands of the subtropical and tropical Pacific Ocean from the Hawaiian Is., Phoenix Is., and Samoa Is. to the San Ambrosio and San Felix Is. off Chile. Sedentary but winters at sea.

276-1. *Procelsterna cerulea saxatilis* Fisher, 1903 ハイイロアジサシ

Range: Breeds on the Hawaiian Is.; accidental in Japan.

Status: Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV: Oct. 1910). No reliable records over the last 50 years.

硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 南鳥島 (AV: 1910 年 10 月), 2 例の記録があ

る。最近 50 年間以上、確実な国内記録がない。

GYGIS Wagler シロアジサシ属

277. *Gygis alba* (Sparrman, 1786) シロアジサシ

Shiro-ajisashi White Tern

Range: Pantropical. Breeds on islands in the subtropical and tropical Pacific, Indian and Atlantic oceans. Sedentary but winters at sea.

277-1. *Gygis alba candida* (Gmelin, 1789) シロアジサシ

Range: Breeds on islands of the Pacific from the Hawaiian Is. to the Galapagos; occasionally in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Niigata, Nagano, Saitama, Chiba, Gifu, Ishikawa, Aichi, Shiga, Osaka, Shimane), Sado (AV), Oki (AV), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (AV), Izu Is. (AV: Oshima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Minamijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV), Minami-Torishima I. (FB), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 新潟, 長野, 埼玉, 千葉, 岐阜, 石川, 愛知, 滋賀, 大阪, 島根), 佐渡 (AV), 隠岐 (AV), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (AV), 伊豆諸島 (AV: 大島), 小笠原群島 (AV: 父島, 南島, 母島), 硫黄列島 (AV), 南鳥島 (FB), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV).

RISSA Stephens ミツユビカモメ属

278. *Rissa tridactyla* (Linnaeus, 1758) ミツユビカモメ

Mitsuyubi-kamome Kittiwake

Range: N Holarctic. Breeds in Iceland, British Isles, and from Scandinavia east to the coast of Russian Far East, Kamchatka, Commander Is., Aleutian Is., w coast of Alaska, ne Canada, and Greenland. Winters to temperate regions.

278-1. *Rissa tridactyla pollicaris* Ridgway, 1884 ミツユビカモメ

Range: Breeds in ne Russian Far East south to Kamchatka and Commander Is., east to the Aleutian Is. Winters south to Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n and c Honshu (WV), sw Honshu (IV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.),

Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Pelagic, sea coasts.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北・中部 (WV), 本州南西部 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舢倉島 (WV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

海岸, 海上に生息する.

279. *Rissa brevirostris* (Bruch, 1853) アカアシミツユビカモメ

Akaashi-mitsuyubi-kamome Red-legged Kittiwake

Range: N Pacific. Breeds on the Commander Is., the Aleutian Is. and Pribilof Is. Winters in the n Pacific Ocean; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV), Honshu (AV: Off Sanriku, Ibaraki, Chiba).

北海道 (AV), 南千島 (AV), 本州 (AV: 三陸沖, 茨城, 千葉).

PAGOPHILA Kaup ゾウゲカモメ属

280. *Pagophila eburnea* (Phipps, 1774) ゾウゲカモメ

Zoge-kamome Ivory Gull

Range: Holarctic, discontinuously circumpolar. Breeds on Spitsbergen, Franz Josef Land, Novaya Zemlya, islands of nw Canada, and coast of Greenland. Winters mainly in the Arctic Ocean, sporadically south to Europe, Japan, and North America.

Status: Hokkaido (AV: Nemuro, Feb. 1934, Mombetsu, Dec. 1986), s Kurile Is. (IV), Honshu (AV: Aomori, Jan. 1999, Chiba, Mar. - Apr. 1981).

Habitat: Sea coasts, rivers.

北海道 (AV: 根室, 1934 年 2 月, 紋別, 1986 年 12 月), 南千島 (IV), 本州 (AV: 青森, 1999 年 1 月, 千葉, 1981 年 3 - 4 月).

海岸, 海上に生息する.

XEMA Leach クビワカモメ属

281. *Xema sabini* (Sabine, 1819) クビワカモメ

Kubiwa-kamome Sabine's Gull

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds from the Taimyr Peninsula east along arctic Siberia to the Chukot Peninsula; also arctic coasts of North America and Greenland. Winters south to sw Africa and coast of c South America; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Nov. 1909, Aichi, Nov. 1975).

Habitat: Sea coasts.

本州 (AV: 宮城, 1909 年 11 月, 愛知, 1975 年 11 月). 2 例の記録がある.

海岸, 海上に生息する.

RHODOSTETHIA MacGillivray ヒメクビワカモメ属

282. *Rhodostethia rosea* (MacGillivray, 1824) ヒメクビワカモメ

Hime-kubiwa-kamome Ross's Gull

Range: Holarctic, discontinuously circumpolar. Breeds in ne Siberia from Spitzbergen and Khatanga River to the Kolyma delta; also locally in n Canada and Greenland. Mainly sedentary, occasionally wintering south to Europe and Japan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), n Honshu (AV: Aomori, Akita, Niigata, Feb. 1996, Ibaraki, Jan. 2000, Chiba, Tokyo, Jan. 1979).

Habitat: Sea coasts, lakes.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州北部 (AV: 青森, 秋田, 新潟, 1996 年 2 月, 茨城, 2000 年 1 月, 千葉, 東京, 1979 年 1 月).

海岸, 海上に生息する.

LARUS Linnaeus カモメ属

283. *Larus genei* Brème, 1839 ハシボソカモメ

Hashiboso-kamome Slender-billed Gull

Range: W and c Palearctic. Breeds in s Europe locally, and from Asia Minor through the Black and Caspian seas to the lakes in Kazakhstan and along the coast of the Persian Gulf east to Pakistan. Winters to the Mediterranean region, ne Africa, Persian Gulf, and Arabian Sea; accidental in Japan.

Status: Kyushu (AV: Fukuoka, Feb. - Mar. 1984, Jan. - Mar. 1985, Dec. 1986, Jan. - Mar. 1988, 1990).

九州 (AV: 福岡 1984 年 2 - 3 月, 1985 年 1 - 3 月, 1986 年 12 月, 1988

年 1 - 3 月, 1990).

284. *Larus philadelphia* (Ord, 1815) ボナパルトカモメ

Bonaparuto-kamome Bonaparte's Gull

Range: Nearctic. Breeds in w Alaska, wc and e Canada. Winters in coastal US.

Status: Hokkaido (AV: May 1987), Honshu (AV: Ibaraki, Dec. 1985, Kanagawa, Dec. 1985 - Feb. 1986, Yamaguchi, Jan. 2000).

北海道 (AV: 1987 年 5 月), 本州 (AV: 茨城, 1985 年 12 月, 神奈川, 1985 年 12 月 - 1986 年 2 月, 山口, 2000 年 1 月).

285. *Larus brunnicephalus* Jerdon, 1840 チャガシラカモメ

Chagashira-kamome Brown-headed Gull

Range: C Palearctic. Breeds in sc Asia. Wintering in e Arabia to se Asia.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, May 2002).

本州 (AV: 茨城, 2002 年 5 月).

286. *Larus ridibundus* Linnaeus, 1766 ユリカモメ

Yuri-kamome Black-headed Gull

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds in Iceland, British Isles, and w Europe across s Siberia to the Amur Basin, Ussuriland, and Kamchatka; also sporadically Newfoundland. Winters south to the Mediterranean region, tropical Africa, and e and se Asia.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I., Nishinoshima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, rivers, inland lakes.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島, 西之島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), 南鳥島 (AV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV: 南大東島).

海岸, 河川中・下流部, 湖沼に生息する.

287. *Larus saundersi* (Swinhoe, 1871) ズグロカモメ

Zuguro-kamome Saunders's Gull

Range: E Palearctic. Breeds in inland lakes of ne China. Winters to the coast of Russian Far East, Korea, China, Japan and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (WV), Sado (IV), Tsunoshima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Coastal beaches, mudflats.

北海道 (IV), 本州 (WV), 佐渡 (IV), 角島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV: 南大東島).

干潟, 海岸, 海上に生息する.

288. *Larus minutus* Pallas, 1776 ヒメカモメ

Hime-kamome Little Gull

Range: Holarctic. Breeds in North America, Baltic area to Lena basin, Transbaikalia and Inner Mongolia. Winters in e North America, w Europe, Mediterranean Sea, Black Sea and e coast of China.

Status: Hokkaido (AV: Aug. 1980), Honshu (AV: Chiba, Mar. 2008, Apr. 2010, Dec. 2010, Osaka, May 1988, Hiroshima, Aug. 1984).

北海道 (AV: 1980 年 8 月), 本州 (AV: 千葉, 2008 年 3 月, 2010 年 4 月, 2010 年 12 月, 大阪, 1988 年 5 月, 広島, 1984 年 8 月).

289. *Larus atricilla* Linnaeus, 1758 ワライカモメ

Warai-kamome Laughing Gull

Range: Nearctic, marginally Neotropical. Breeds in coastal se Canada, e, s and sw US, w Mexico, e Central America and West Indies. Winters south to s Peru and n Brazil.

289-U. *Larus atricilla* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Aomori, May - Jul., 2010, Ibaraki, Jun. 2000, May 2002, Chiba, May 2002, Nov. 2002, Tokyo, Sep. 2002, Kanagawa, Sep. 2002, Aichi, Sep. 2000, Jul. 2008), Iwoto I. (AV: Jun. 2000).

本州 (AV: 青森, 2010 年 5 月 - 7 月, 茨城, 2000 年 6 月, 2002 年 5 月, 千葉, 2002 年 5 月, 2002 年 11 月, 東京, 2002 年 9 月, 神奈川, 2002 年 9 月, 愛知, 2000 年 9 月, 2008 年 7 月), 硫黄島 (AV: 2000 年 6 月).

290. *Larus pipixcan* Wagler, 1831 アメリカズグロカモメ

Amerika-zuguro-kamome Franklin's Gull

Range: Nearctic. Breeds in c and s Canada and c US. Winters in coastal wc South America.

Status: Honshu (AV: Akita, Nov. 1988, Aug. - Nov. 2005, Toyama, Sep. 1991, Kanagawa, Jun. 1998, Aichi, Kyoto, Jan. 1984, Osaka, Nov. 2000), Yonaguni-jima I. (AV: Jul. 2006).

本州 (AV: 秋田, 1988 年 11 月, 2005 年 8 - 11 月, 富山, 1991 年 9 月, 神奈川, 1998 年 6 月, 愛知, 京都, 1984 年 1 月, 大阪, 2000 年 11 月), 与那国島 (AV: 2006 年 7 月).

291. *Larus relictus* Lönnberg, 1931 ゴビズキンカモメ

Gobi-zukin-kamome Relict Gull

Range: C and e Palearctic. Breeds in inland lakes from nw Kazakhstan to Mongolia and Transbaikalia. Wintering area unknown, but a specimen taken in n Vietnam in autumn; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Kanagawa, Jan. 1985, Osaka, Sep. - Oct. 1984), Kyushu (AV: Fukuoka, 2005).

本州 (AV: 神奈川, 1985 年 1 月, 大阪, 1984 年 9 - 10 月), 九州 (AV: 福岡, 2005 年).

292. *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 オオズグロカモメ

O-zuguro-kamome Great Black-headed Gull

Range: C Palearctic. Breeds from the Black and Caspian seas east to the Aral Sea and on freshwater lakes of se Russia, Kazakhstan, and Mongolia. Winters to the e Mediterranean region, coasts of the Arabian Peninsula, and Indian coasts, casually east to the Sea of Japan.

Status: Honshu (AV: Osaka, Shimane, Sep. 1999), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima), Okinawajima I. (AV).

本州 (AV: 大阪, 島根, 1999 年 9 月), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 鹿児島), 沖縄島 (AV).

293. *Larus crassirostris* Vieillot, 1818 ウミネコ

Umineko Black-tailed Gull

Range: E Palearctic. Breeds on coasts and islands of Japan and coasts from Ussuriland to Korea and e China south to Fukien. Sedentary and erratic, winter-

ing north to Sakhalin and south regularly to the se Chinese coast.

Status: Hokkaido (MB), Rishirito I. (MB), Teurito I. (MB), Matsumae-Kojima I. (MB), Yururito I. (MB), Moyururito I. (MB), Daikokujima I. (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Shikotanto I., Habomai Is.), Honshu (RB: Sanriku, Oga Peninsula, Fukui, Wakayama, Yamaguchi. CB: Tokyo. WV), Sado (CB), Awashima I. (RB), Nanatsujima I. (RB), Oki (RB), Kabushima I. (MB), Sanganjima I. (MB), Tobishima I. (MB), Tsubakijima I. (MB), Kutsujima I. (MB), Okihebijima I. (MB), Fumishima I. (MB), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Koshikijima Is. (MB), Tsushima (WV), Danjo Is. (MB), Yakushima I. (WV), Izu Is. (RB: Oshima I., Nijima I., Kozushima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (WV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, rivers, lakes, rice fields, meadows, marshlands. Breeds on rocky and grassy slopes of islands.

北海道 (MB), 利尻島 (MB), 天売島 (MB), 松前小島 (MB), ユルリ島 (MB), モユルリ島 (MB), 大黒島 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 色丹島, 歯舞諸島), 本州 (RB: 三陸海岸, 男鹿半島, 福井, 和歌山, 山口. CB: 東京. WV), 佐渡 (CB), 粟島 (RB), セツ島 (RB), 隠岐 (RB), 蕪島 (MB), 三貫島 (MB), 飛島 (MB), 椿島 (MB), 沓島 (MB), 沖蛇島 (MB), 経島 (MB), 四国 (WV), 九州 (WV), 甌島諸島 (MB), 対馬 (WV), 男女群島 (MB), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (RB: 大島, 新島, 神津島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (WV: 聳島, 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

海岸の崖, 岩礁, 時に建物で繁殖し, 水田, 海岸, 海上に生息する.

294. *Larus canus* Linnaeus, 1758 カモメ

Kamome Mew Gull

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, British Isles, and from nw Europe east across Siberia to Anadyrland, Kamchatka, and Sakhalin, south to the Kirghiz Steppes and Lake Baikal; also Alaska and nw Canada. Winters to temperate regions.

294-1. *Larus canus kamtschatschensis* Bonaparte, 1857 カモメ

Range: Breeds in e Siberia and n Russian Far East from the Indigirka River to

the Kolyma, Anadyrland, and Kamchatka, south to the n Okhotsk coast, Kurile Is., and Sakhalin. Winters to Japan, Korea, and China; casual in Taiwan and Hawaiian Is.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (WV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Sea coasts, pelagic, rivers.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).

海岸, 海上に生息する.

294-2. *Larus canus heinei* Homeyer, 1853 ニシシベリアカモメ

Range: Breeds in n and c Europe, Russia and w and c Siberia. Winters in c and s Europe, Middle East and Caspian Sea.

Status: Honshu (AV: Ishikawa, Jul. 1989).

本州 (AV: 石川, 1989 年 7 月).

294-3. *Larus canus brachyrhynchus* Richardson, 1831 コカモメ

Range: Breeds in n Alaska, w Canada. Winters to w US.

Status: Honshu (AV: Chiba, Feb. 1987, etc.).

本州 (AV: 千葉, 1987 年 2 月等).

295. *Larus glaucescens* Naumann, 1840 ワシカモメ

Washi-kamome Glaucous-winged Gull

Range: N Pacific. Breeds from the Commander Is. and Aleutian Is. east through the Alaskan coast to nw Washington. Mainly sedentary, wintering south to Japan and Baja California.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n Honshu (WV), c and sw Honshu (IV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Sea coasts.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北部 (WV), 本州中・南西部 (IV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 四国 (IV), 九州 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 奄

美大島 (AV), 沖縄島 (AV).
海岸, 海上に生息する.

296. *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767 シロカモメ

Shiro-kamome Glaucous Gull

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in Iceland and from n Scandinavia east through arctic Siberia to the Chukot Peninsula, coast of Alaska, arctic Canada, and Greenland. Migratory and sedentary, wintering to temperate regions.

296-1. *Larus hyperboreus pallidissimus* Portenko, 1939 シロカモメ

Range: Breeds in e Siberia from the Tymir Peninsula to the Chukot Peninsula and coasts of Anadyrland, New Siberian Is., St Matthew I., and Pribilof Is. Winters south to Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n Honshu (WV), c and sw Honshu (IV), Awashima I. (IV), Sado (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV: Niijima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Minami-Torishima I. (AV), Amami Is. (IV: Kikaijima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Sea coasts, pelagic, rivers.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北部 (WV), 本州中・南西部 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 新島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 南鳥島 (AV), 奄美諸島 (IV: 喜界島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 西表島).

海岸, 海上に生息する.

297. *Larus glaucoides* Meyer, 1822 アイスランドカモメ

Aisurando-kamome Iceland Gull

Range: Holarctic. Breeds in s and e Greenland, Novaya Zemlya and ne Canada. Winters to s to n Europe, se Canada and ne US.

297-1. *Larus glaucoides glaucoides* Meyer, 1822 アイスランドカモメ

Range: Breeds in s and e Greenland, Novaya Zemlya. Winters south to n Europe.

Status: Honshu (AV: Chiba, Feb. 1994).

本州 (AV: 千葉, 1994 年 2 月).

297-2. *Larus glaucoides kumlieni* Brewster, 1883 クムリーンアイスラン

ドカモメ

Range: Breeds in ne Canada. Winters to se Canada and ne US.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Kyushu (AV).

Habitat: Sea coasts, pelagic

北海道 (IV), 本州 (IV), 九州 (AV).

海岸, 海上に生息する.

298. *Larus thayeri* Brooks, 1915 カナダカモメ

Kanada-kamome Thayer's Gull

Range: N Holarctic. Breeds in arctic Canada, w Greenland. Winters to w coast of North America.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV).

Habitat: Coastal beaches.

北海道 (IV), 本州 (IV).

海岸, 海上に生息する.

299. *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763 セグロカモメ

Seguro-kamome Herring Gull

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, British Isles, and n Europe across Siberia to North America south to Montana and New York; also nw Africa and from the Black and Caspian seas east to Lake Baikal, Mongolia, and Manchuria. Migratory and sedentary, wintering south to temperate and tropical regions.

299-1. *Larus argentatus vegae* Palmén, 1887 セグロカモメ

Range: Breeds in ne Siberia from the Olenok and Lena rivers east to the Chukot Peninsula. Winters in Japan and China, occasionally south to Taiwan, Indochina, and Philippines.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I., Nishinoshima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, rivers, lakes.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島, 西之島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 南大東島). 海岸, 海上に生息する.

299-2. *Larus argentatus smithsonianus* Coues, 1862 アメリカセグロカモメ

Range: Breeds in North America. Winters to South to Central America.

Status: Honshu (AV: Aomori, Ibaraki, Chiba).

本州 (AV: 青森, 茨城, 千葉).

300. *Larus cachinnans* Pallas, 1811 キアシセグロカモメ

Kiashi-seguro-kamome Caspian Gull

Range: Palearctic. Breeds in e Atlantic islands, s Europe, and n Africa east to c Asia. Winters south to ne Africa and the Persian Gulf.

300-1. *Larus cachinnans mongolicus* Sushkin, 1925 キアシセグロカモメ

Range: Breeds in se Altai and Lake Baikal to Mongolia. Winters in s Asia.

Status: Honshu (IV), Kyushu (IV).

Habitat: Sea coasts, pelagic

本州 (IV), 九州 (IV).

海岸, 海上に生息する.

301. *Larus schistisagus* Stejneger, 1884 オオセグロカモメ

O-seguro-kamome Slaty-backed Gull

Range: E Palearctic. Breeds along the coast of the n Pacific and Okhotsk Sea from the Chukot Peninsula south to Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, and Hokkaido in n Japan. Migratory and sedentary, wintering in n China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV. RB: e Hokkaido), Teurito I. (RB), s Kurile Is. (RB), n Honshu (RB, WV), c and sw Honshu (WV), Sado (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Torishima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.,

Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Sea coasts, pelagic, rivers. Breeds on rock stacks, slopes on islands, occasionally on buildings.

北海道 (WV, RB: 東部), 天売島 (RB), 南千島 (RB), 本州北部 (RB, WV), 本州中・南西部 (WV), 佐渡 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 鳥島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 与那国島), 南大東島 (IV).

海岸の崖, 岩礁, 時に建物で繁殖し, 海岸, 海上に生息する.

302. *Larus fuscus* Linnaeus, 1758 ニシセグロカモメ

Nishi-seguro-kamome Lesser Black-backed Gull

Range: Palearctic. Greenland, Iceland, n Scandinavia, n Siberia south to British Isles and France. Winters from British Isles, s Scandinavia, Baltic Sea, south to c Africa, the Red Sea, Persian Gulf and India.

302-1. *Larus fuscus heuglini* Bree, 1876 ニシセグロカモメ

Range: Breeds in n European Russia and nw Siberia east to Taymyr Peninsula. Winters in Middle East to e Africa, sw Asia and nw India.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Kyushu (IV).

Habitat: Sea coasts, pelagic

北海道 (IV), 本州 (IV), 九州 (IV).

海岸, 海上に生息する.

302-U. *Larus fuscus* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Kanagawa), Kyushu (AV).

本州 (AV: 神奈川), 九州 (AV).

GELOCHELIDON Brehm ハシブトアジサシ属

303. *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, 1789) ハシブトアジサシ

Hashibuto-ajisashi Gull-billed Tern

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds from Europe across Asia Minor and c Asia to nw India, s China, and Transbaikalia; also nw Africa, Australia, s North America to n South America, and West Indies. Winters

to temperate and tropical regions.

303-1. *Gelochelidon nilotica nilotica* (Gmelin, 1789) ハシブトアジサシ

Range: Europe to Mauritania, w India, and ne China. Winters to the Mediterranean region, tropical Africa, Arabian and Indian coasts, se Asia, and Sunda Is.; occasionally in Japan.

Status: Honshu (IV: Miyagi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Shiga, Wakayama, Osaka, Hyogo, Shimane), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Irabujima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Sea coasts, beaches, rivers.

本州 (IV: 宮城, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 滋賀, 和歌山, 大阪, 兵庫, 島根), 四国 (IV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 伊良部島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (AV).

海岸, 河川に生息する.

STERNA Linnaeus アジサシ属

304. *Sterna caspia* Pallas, 1770 オニアジサシ

Oni-ajisashi Caspian Tern

Range: Old World and Nearctic, but breeding locally. In Eurasia breeds locally and discontinuously on the Baltic coast, Asia Minor, Black and Caspian seas, Kirghiz and w Siberian steppes, coasts of the Arabian Sea, Mongolia, and e China coast, north to s Manchuria and Ussuriland; also North America, Africa locally, and Australia to New Zealand. Migratory and sedentary, northern birds wintering to temperate and tropical regions.

Status: Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Toyama, Aichi, Mie, Wakayama, Hyogo, Shimane), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Kumamoto), Izu Is. (AV: Miyakejima I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I., Kumejima I.), Miyako Is. (AV: Miyakojima I.), Yaeyama Is. (AV), Minami-Daitojima I. (AV).

本州 (AV: 青森, 宮城, 茨城, 千葉, 神奈川, 富山, 愛知, 三重, 和歌山, 兵庫, 島根), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 熊本), 伊豆諸島 (AV: 三宅島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島, 久米島), 宮古諸島 (AV: 宮古島), 八重山諸島 (AV), 南大東島 (AV).

305. *Sterna bergii* Lichtenstein, 1823 オオアジサシ

O-ajisashi Greater Crested Tern

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds on coasts and islands of the Indian Ocean from s Africa and Madagascar eastward to Australia and islands in the sw Pacific, north to the Ryukyu Is. and Ogasawara Is. More or less sedentary but winters at sea.

305-1. *Sterna bergii cristata* Stephens, 1826 オオアジサシ

Range: Breeds from coasts of s China eastward to Australia, Tasmania, and Polynesia to the Tuamotus, Ryukyu Is. north to the Amami Is. (Tokunoshima I.) and Ogasawara Is. Recorded from Korea and Taiwan.

Status: Honshu (PV: Aichi, IV: Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Ishikawa, Mie, Hyogo, Yamaguchi), Shikoku (IV: Tokushima), Kyushu (IV: Fukuoka, Nagasaki, Oita, Kumamoto), Izu Is. (IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (MB: Nishinoshima I. IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Minami-Torishima I. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (FB: Tokunoshima I. IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Nakanokamishima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Senkaku Is. (MB: Kita-Kojima I.), Minami-Daitojima I. (FB).

Habitat: Pelagic, sea coasts, lakes. Breeds on sandy and rocky beaches, rocky islets.

本州 (PV: 愛知. IV: 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 石川, 三重, 兵庫, 山口), 四国 (IV: 徳島), 九州 (IV: 福岡, 長崎, 大分, 熊本), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (MB: 西之島. IV: 聳島, 父島, 母島), 南鳥島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (FB: 徳之島. IV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊平屋島, 久米島, 仲ノ神島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 尖閣列島 (MB: 北小島), 南大東島 (FB).

岩礁などで繁殖し, 海岸, 湖沼に生息する.

306. *Sterna bengalensis* Lesson, 1831 ベンガルアジサシ

Bengaru-ajisashi Lesser Crested Tern

Range: Breeds in Libya and Indian ocean, Australasia. Wintering in w and ne Africa, w India, e and s Africa, Gulf of Bengal and Philippines to Bismarck Archipelago

306-U. *Sterna bengalensis* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Shizuoka, Jul. 1998).

本州 (AV: 静岡, 1998 年 7 月).

307. *Sterna albifrons* Pallas, 1764 コアジサシ

Ko-ajisashi Little Tern

Range: Nearly cosmopolitan. Breeds widely but discontinuously in temperate and tropical regions of Eurasia, Africa, and North America; also coasts of Australia. Migratory and sedentary, northern birds wintering to tropical regions and Southern Hemisphere.

307-1. *Sterna albifrons sinensis* Gmelin, 1789 コアジサシ

Range: Breeds from e India and Sri Lanka east across se Asia to the Philippines, Moluccas, New Guinea, and Australia, north through China to Korea, Manchuria, Ussuriland, and Japan. Northern birds migratory, wintering to se Asia and Philippines.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (MB), Sado (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Yakushima I. (IV), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I. PV), Ryukyu Is. (MB: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Kumejima I., Zamamijima I. PV).

Habitat: Sea coasts, rivers, marshlands. Breeds in sandy beaches, river beds, lake shores.

北海道 (AV), 本州 (MB), 佐渡 (IV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 屋久島 (IV), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), 奄美諸島 (MB: 奄美大島, 徳之島, 与論島. PV), 琉球諸島 (MB: 沖縄島, 伊平屋島, 栗国島, 久米島, 座間味島. PV).

砂浜, 砂礫地で繁殖し, 海岸, 河川などに生息する.

308. *Sterna aleutica* Baird, 1869 コシジロアジサシ

Koshijiro-ajisashi Aleutian Tern

Range: N Pacific. Breeds on coasts of Russian Far East south to Kamchatka and Sakhalin, Aleutian Is., and w Alaskan coasts. Mainly sedentary, wintering at sea in n Pacific; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Gunma, Ibaraki, Chiba, Saitama, Kanagawa, Shizuoka, Shiga, Hyogo), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Kagoshima).

Habitat: Sea coasts, pelagic.

北海道 (AV), 本州 (AV: 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 群馬, 茨城, 千葉, 埼玉, 神奈川, 静岡, 滋賀, 兵庫), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 鹿児島).

海岸, 海上に生息する.

309. *Sterna lunata* Peale, 1848 ナンヨウマミジロアジサシ

Nanyo-mamijiro-ajisashi Spectacled Tern

Range: Oceanic in the Pacific. Breeds on islands of the c Pacific Ocean from Fiji and Phoenix Is. to the Tuamotus, north to the Iwo and Hawaiian Is. Mainly sedentary but winters at sea.

Status: Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV: Oct. 1910). No reliable records over the last 50 years.

硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 南鳥島 (AV: 1910 年 10 月). 2 例の記録がある. 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

310. *Sterna anaethetus* Scopoli, 1786 マミジロアジサシ

Mamijiro-ajisashi Bridled Tern

Range: Pantropical. Breeds from the coasts of the Persian Gulf and Red Sea eastward to Australia, north to the s Ryukyu Is.; also nw Africa, coasts of Middle America, and Caribbean Sea. Mainly sedentary but winters at sea.

310-1. *Sterna anaethetus anaethetus* Scopoli, 1786 マミジロアジサシ

Range: Breeds from the Great Sunda Is. to w Australia, north to the Philippines, islands in the South China Sea, and s Ryukyu Is.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Nagano, Ibaraki, Kanagawa, Shizuoka, Shimane), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Minami-Torishima I. (AV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (MB: Okinawajima I., Izenajima I., Komakajima I., Minnajima I., Miyakojima I., Nakanokamishima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I. PV: Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Sea coasts. Breeds in grassy slopes on islets.

北海道 (AV), 本州 (AV: 長野, 茨城, 神奈川, 静岡, 島根), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 南鳥島 (AV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (MB: 沖縄島, 伊是名島, コマカ島, 水納島, 宮古島, 仲ノ神島, 石垣島, 西表島. PV: 与那国島, 波照間島).

海岸, 海上に生息し, 小島の岩礁上で繁殖する.

311. *Sterna fuscata* Linnaeus, 1766 セグロアジサシ

Seguro-ajisashi Sooty Tern

Range: Pantropical. Breeds in the tropical and subtropical Pacific, Indian and Atlantic oceans mainly between 30° N and 34° S. Sedentary but winters at sea.

311-1. *Sterna fuscata nubilosa* Sparrman, 1788 セグロアジサシ

Range: Breeds from the Red Sea, Persian Gulf, and Indian Ocean eastward to the Greater Sunda Is., Philippines, and Ryukyu Is.

Status: Hokkaido (AV), c and sw Honshu (IV: south of Niigata), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Izu Is. (IV: Aogashima I.), Ogasawara Is. (MB: Nishinoshima I. IV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I., Yomejima I., Higashijima I.), Minami-Torishima I. (MB), Iwo Is. (MB: Kangokuiwa I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I., Zamamijima I.), Miyako Is. (AV: Miyakojima I.), Yaeyama Is. (MB: Nakanokamishima I. PV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Senkaku Is. (MB), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, pelagic. Breeds on rocky islets.

北海道 (AV), 本州中・南西部 (IV: 新潟以南), 四国 (IV), 九州 (IV), 伊豆諸島 (IV: 青ヶ島), 小笠原群島 (MB: 西之島. IV: 聳島, 父島, 母島, 嫁島, 東島), 南鳥島 (MB), 硫黄列島 (MB: 監獄岩), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島, 座間味島), 宮古諸島 (AV: 宮古島), 八重山諸島 (MB: 仲ノ神島. PV: 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 尖閣列島 (MB), 大東諸島 (IV: 南大東島).

海岸, 海上に生息し, 小島で繁殖する.

312. *Sterna dougallii* Montagu, 1813 ベニアジサシ

Beni-ajisashi Roseate Tern

Range: Nearly cosmopolitan, temperate and tropical. Breeds in the British Isles and w Europe locally, east coast of Africa, Madagascar, coasts and islands of the Indian Ocean to Australia, and Chinese coast north to the Ryukyu Is.; also coasts of the e US to the Caribbean Sea and n South America. Migratory and

sedentary, northern birds wintering to tropical regions.

312-1. *Sterna dougallii bangsi* Mathews, 1912 ベニアジサシ

Range: Breeds on coasts of se China north to Kyushu, w Malaysia to the Philippines, and Solomon Is. Northern birds migratory, wintering to the Philippines and islands of Indonesia.

Status: Honshu (CB: Osaka. IV: Miyagi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Mie), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima), Kyushu (MB: Fukuoka. IV: Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki), Tanegashima I. (MB), Tokara Is. (IV), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I. PV: Kikaijima I., Okinoerabujima I.), Okinawa Is. (MB: Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Yagajishima I., Zamamijima I., Nagannu I.), Miyako Is. (WV: Miyakojima I.), Yaeyama Is. (MB: Ishigakijima I., Iriomotejima I. PV: Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, rivers. Breeds on islands.

本州 (CB: 大阪. IV: 宮城, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 三重), 四国 (IV: 香川, 徳島), 九州 (MB: 福岡. IV: 長崎, 熊本, 宮崎), 種子島 (MB), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (MB: 奄美大島, 徳之島, 与論島. PV: 喜界島, 沖永良部島), 沖縄諸島 (MB: 沖縄島, 伊平屋島, 久米島, 屋我地島, 座間味島, ナガンヌ島), 宮古諸島 (WV: 宮古島), 八重山諸島 (MB: 石垣島, 西表島. PV: 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

海岸, 河川に生息し, 小島, 岩浜で繁殖する.

313. *Sterna sumatrana* Raffles, 1822 エリグロアジサシ

Eriguro-ajisasi Black-naped Tern

Range: Tropical Old World. Breeds from the Aldabra Is. to n Australia, New Caledonia, and Loyalty Is., north to the e Chinese coast, Ryukyu Is., and Ogasawara Is. Northern birds migratory, wintering probably from the Philippines to Indonesia.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Gunma, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Wakayama), Shikoku (IV: Tokushima), Kyushu (IV: Fukuoka, Oita, Kumamoto, Miyazaki), Tanegashima I. (MB), Osumi Is. (MB: Mageshima I.), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Minami-Torishima I. (AV), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., PV: Kikaijima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (MB: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I.,

Kumejima I., Yakabijima I., Nagannu I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I. PV: Zamamijima I., Ishigakijima I., Taketomijima I., Nakanokamishima I.).

Habitat: Sea coasts, rivers. Breeds on rocky and shrubby islets.

北海道 (AV), 本州 (IV: 群馬, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 和歌山), 四国 (IV: 徳島), 九州 (IV: 福岡, 大分, 熊本, 宮崎), 種子島 (MB), 大隅諸島 (MB: 馬毛島), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 南鳥島 (AV), 奄美諸島 (MB: 奄美大島, 徳之島, PV: 喜界島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (MB: 沖縄島, 伊平屋島, 粟国島, 久米島, 屋嘉比島, ナガンヌ島, 宮古島, 西表島, 与那国島, 波照間島. PV: 座間味島, 石垣島, 竹富島, 仲ノ神島).

小島の岩礁上で繁殖し, 海岸や河川で見られる.

314. *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758 アジサシ

Ajisashi Common Tern

Range: Holarctic. Breeds in temperate Eurasia from Europe to the Amur Basin, Kamchatka, and Sakhalin, south to Iran and Tibet; also n and w Africa, ne North America, and Caribbean Sea. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

314-1. *Sterna hirundo minussensis* Sushkin, 1925 アカアシアジサシ

Range: Breeds in c and s Siberia from the Ob to the Lena delta, south to the Altai and Mongolia. Winters probably in China and se Asia.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (CB: Tokyo, Hyogo. PV: Akita, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Saitama, Niigata, Ishikawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Tottori, Yamaguchi), Sado (AV), Mishima I. (AV), Kyushu (PV: Fukuoka), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Sea coasts, rivers, lakes. Breeds in colonies of Little Tern.

北海道 (PV), 本州 (CB: 東京, 兵庫. PV: 秋田, 山形, 宮城, 福島, 茨城, 千葉, 埼玉, 新潟, 石川, 静岡, 愛知, 大阪, 鳥取, 山口), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 九州 (PV: 福岡), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 沖縄島 (IV).

コアジサシのコロニーで繁殖例があり, 河川, 湖沼, 海岸に生息する.

314-2. *Sterna hirundo longipennis* Nordmann, 1835 アジサシ

Range: Breeds in e Siberia, s Russian Far East, and Kamchatka, south to Usuriland, Sakhalin, and Kurile Is. Winters from e India and Sri Lanka to the

Solomon Is.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV. CB: Gunma, Toyama, May - Jul. 1993), Awashima I. (IV), Sado (PV), Hegurajima I. (IV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Sea coasts rivers, lakes. Breeds in colonies of Little Tern.

北海道 (AV), 南千島 (PV), 本州 (PV. CB: 群馬, 富山, 1993 年 5 - 7 月), 粟島 (IV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).

コアジサシのコロニーで繁殖例があり, 河川, 湖沼, 海岸に生息する.

315. *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 キョクアジサシ

Kyoku-ajisashi Arctic Tern

Range: N Holarctic. Breeds in arctic regions south to ne US and w Europe. Winters in Antarctic.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, Jul. 1996, Chiba, Shizuoka, Jun. 2003, etc.).

本州 (AV: 茨城, 1996 年 7 月, 千葉, 静岡, 2003 年 6 月等).

CHLIDONIAS Rafinesque クロハラアジサシ属

316. *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) クロハラアジサシ

Kurohara-ajisashi Whiskered Tern

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds from sw Europe and nw Africa east across s Eurasia to e China, Australia, and New Zealand, north to Manchuria; also se Africa and Madagascar. Northern birds migratory, wintering to tropical regions and Southern Hemisphere.

316-1. *Chlidonias hybrida javanicus* (Horsfield, 1821) クロハラアジサシ

Range: Breeds in India and China to se Asia, north to Manchuria. Winters to se Asia, Philippines, Greater Sunda Is., and Sulawesi.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (PV, IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (PV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Lakes, rivers, marshlands.

北海道 (AV), 本州 (PV, IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (PV: 南大東島).

湖沼, 湿原に生息する.

317. *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) ハジロクロハラアジサシ

Hajiro-kurohara-ajisashi White-winged Black Tern

Range: Palearctic. Breeds from se Europe and Balkans east through Ukraine to the Caucasus, Caspian region, and w Altai, then with a distributional gap from ne Mongolia and Transbaikalia to the Amur Basin, Manchuria, and s Sakhalin; also breeds irregularly in w Europe. Winters in tropical Africa and tropical Asia to Australia.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (IV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Lakes, rivers, marshlands, rice fields.

北海道 (PV), 本州 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (IV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

湖沼, 河川, 湿原, 水田などに生息する.

318. *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) ハシグロクロハラアジサシ

Hashiguro-kurohara-ajisashi Black Tern

Range: Holarctic. Breeds from w Europe across Asia Minor and s Russia to the upper Enisei and Altai; also North America from n Canada south locally to California and New York. Winters mainly to tropical Africa and South America.

318-1. *Chlidonias niger niger* (Linnaeus, 1758) ハシグロクロハラアジ

サシ

Range: Breeds in Europe to c Asia; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Ibaraki, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Toyama, Aichi, Mie, Tottori, Shimane), Kyushu (AV: Nagasaki, Oita), Yoronjima I. (AV), Okinawajima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 茨城, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 富山, 愛知, 三重, 鳥取, 島根), 九州 (AV: 長崎, 大分), 与論島 (AV), 沖縄島 (AV).

318-2. *Chlidonias niger surinamensis* (Gmelin, 1789) アメリカハシグロクロハラアジサシ

Range: Breeds in Canada to n US. Winters in Central America and n South America.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, Jun. 2001, Chiba, Jul. 1999, Tokyo, Jul. 2000).

本州 (AV: 茨城, 2001 年 6 月, 千葉, 1999 年 7 月, 東京, 2000 年 7 月).

Family STERCORARIIDAE トウゾクカモメ科

STERCORARIUS Brisson トウゾクカモメ属

319. *Stercorarius maccormicki* Saunders, 1893 オオトウゾクカモメ

O-tozoku-kamome South Polar Skua

Range: Oceanic, migrating north to the n Pacific, n Indian, and n Atlantic oceans. Breeds on the Antarctic Continent.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (PV), n and c Honshu (PV), sw Honshu (AV: Shimane, Yamaguchi), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Miyazaki), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Izu Is. (PV), Tokara Is. (AV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (AV), 南千島 (PV), 本州北・中部 (PV), 本州南西部 (AV: 島根, 山口), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 宮崎), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 伊豆諸島 (PV), トカラ列島 (AV).

海上に生息する.

320. *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) トウゾクカモメ

Tozoku-kamome Pomarine Skua

Range: Oceanic in the Pacific, Indian and Atlantic oceans, migrating south to the Southern Hemisphere. Breeds on arctic coasts from the Kanin Peninsula and Novaya Zemlya to arctic Canada and w Greenland.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tokara Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (PV), 九州 (PV), トカラ列島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 西表島, 与那国島).

海上に生息する.

321. *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) クロトウゾクカモメ

Kuro-tozoku-kamome Parasitic Jaeger

Range: Oceanic in the Pacific, Indian and Atlantic oceans, migrating south to the Southern Hemisphere. Breeds on arctic coasts from Iceland, Scotland, and Scandinavia to arctic Canada and Greenland, south to Kamchatka, Commander Is., and n Quebec.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV. IV), Kyushu (AV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Nishinoshima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (PV), 本州 (PV. IV), 九州 (AV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV: 西之島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島).

海上に生息する.

322. *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 シロハラトウゾクカモメ

Shirohara-tozoku-kamome Long-tailed Jaeger

Range: Oceanic in the Pacific and Atlantic oceans (rarely in the Indian Ocean), migrating south to the Southern Hemisphere. Breeds on arctic coasts from n Scandinavia to arctic Canada and Greenland, south to Kamchatka.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV: Etorofuto I.), Honshu (PV, IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (PV, IV), Kyushu (PV, IV), Izu Is. (PV), Tokara Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (IV), 南千島 (PV: 択捉島), 本州 (PV, IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (PV, IV), 九州 (PV, IV), 伊豆諸島 (PV), トカラ列島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).
海上に生息する.

Family ALCIDAE ウミスズメ科

ALLE Link ヒメウミスズメ属

323. *Alle alle* (Linnaeus, 1758) ヒメウミスズメ

Hime-umisuzume Little Auk

Range: N Palearctic. Breeds in islands of n Atlantic Ocean to Svalbard, Franz Josef Land, Novaya Zemlya and St. Lawrence I. Winters in New Jersey, w Europe and Barents Sea.

323-U. *Alle alle* ssp. 亜種不明

Status: Hokkaido (AV: Mar. 1994), Honshu (AV: Shizuoka, May 1996), Kyushu (AV: Oita, Jun. 2002), Okinawajima I. (AV: Jan. 1992).

北海道 (AV: 1994 年 3 月), 本州 (AV: 静岡, 1996 年 5 月), 九州 (AV: 大分, 2002 年 6 月), 沖縄島 (AV: 1992 年 1 月).

URIA Brisson ウミガラス属

324. *Uria lomvia* (Linnaeus, 1758) ハシブトウミガラス

Hashibuto-umigarasu Thick-billed Murre

Range: N Holarctic. Breeds on Iceland, Spitzbergen, Novaya Zemlya, coasts of the Bering Sea, islands of ne Arctic Canada, and Greenland, south to Kamchatka, Kurile Is., and Sakhalin. Mainly sedentary, wintering at northern sea.

324-1. *Uria lomvia arra* (Pallas, 1811) ハシブトウミガラス

Range: Breeds on coasts and islands of the Bering Sea, south to the Commander Is., Kurile Is., and Kodiak I. Winters south to n Honshu.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (IV: Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Ishikawa,

Wakayama, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (IV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (IV: 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 神奈川, 静岡, 石川, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (IV).

海上に生息する.

325. *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763) ウミガラス

Umigarasu Common Murre

Range: Holarctic. Breeds on coasts and islands of the n Atlantic, w Arctic and n Pacific oceans, south to the Portuguese coast, Hokkaido, California, and Newfoundland. Winters at sea, south to temperate regions.

325-1. *Uria aalge inornata* Salomonsen, 1932 ウミガラス

Range: Breeds on the ne Okhotsk coast, Kamchatka, Kurile Is. Commander Is., Aleutian Is. and coast of the Bering Sea to w Alaska, south to Sakhalin, Hokkaido, and ne Korea. Winters south to n Honshu.

Status: Hokkaido (WV), Teurito I. (RB), Yururito I. (FB), Moyururito I. (FB), Matsumae-Kojima I. (FB), s Kurile Is. (RB), n and c Honshu (WV. IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV).

Habitat: Coastal waters, bays, pelagic. Breeds on cliff ledges.

北海道 (WV), 天売島 (RB), ユルリ島 (FB), モユルリ島 (FB), 松前小島 (FB), 南千島 (RB), 本州北・中部 (WV. IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV).

海上に生息し, 海岸の崖で繁殖する.

ALCA Linnaeus オオハシウミガラス属

326. *Alca torda* Linnaeus, 1758 オオハシウミガラス

Ohashi-umigarasu Razorbill

Range: Holarctic. Breeds in e North America, Greenland to n Scandinavia, White Sea, Iceland, Faroe Is., British Isles to Heiligoland and nw France. Winters to Mediterranean Sea.

326-1. *Alca torda islandica* Brehm, 1831 オオハシウミガラス

Range: Iceland, Faroe Is., British Isles to Heiligoland and nw France. Winters to Mediterranean Sea.

Status: Japan Sea (AV). Recorded only on Siebold (1833). No reliable records over the last 50 years.

日本海 (AV). Siebold (1833) に記述されている標本が現存するのみで、最近 50 年間以上、確実な国内記録がない。

CEPPHUS Pallas ウミバト属

327. *Cepphus columba* Pallas, 1811 ウミバト

Umibato Pigeon Guillemot

Range: E Palearctic and w Nearctic. Breeds in the n Pacific from coasts and islands of the Bering Sea, Aleutian Is., and w Alaska, south to Kamchatka, Kurile Is., and Santa Barbara I. in California. Winters south to e Hokkaido and c California.

327-1. *Cepphus columba snowi* Stejneger, 1897 ウミバト

Range: Breeds on the Kurile Is. from Paramushir I. to Etorofuto I. Winters south to Hokkaido.

Status: E Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV. RB: Etorofuto I.), Honshu (AV: Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Aichi).

Habitat: Coastal waters, pelagic.

北海道東部 (WV), 南千島 (WV. RB: 択捉島), 本州 (AV: 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 神奈川, 愛知).

海上に生息する.

327-2. *Cepphus columba kaiurka* Portenko, 1937 アリュウシャンウミバト

Range: Breeds on the Commander Is. and w Aleutian Is. east to Kiska I. Rather sedentary, but wintering at sea. Recorded from the n Kurile Is. and e Hokkaido.

Status: E Hokkaido (WV).

Habitat: Coastal waters, pelagic.

北海道東部 (WV).

海上に生息する.

328. *Cepphus carbo* Pallas, 1811 ケイマフリ

Keimafuri Spectacled Guillemot

Range: E Palearctic. Breeds on coasts of the Okhotsk Sea and Sea of Japan from the Taigonos Peninsula south to Korea, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan.

Rather sedentary, wintering south to c Honshu.

Status: Hokkaido (RB), Teurito I. (RB), Yururito I. (RB), Moyururito I. (RB), Daikokujima I. (RB), s Kurile Is. (RB), n and c Honshu (WV. FB: Yamagata), Bentenjima I. (RB), Sanganjima I. (FB), Hegurajima I. (IV), Tsushima (AV), Izu Is. (IV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.).

Habitat: Coastal waters. Breeds in rock crevices and among boulders.

北海道 (RB), 天売島 (RB), ユルリ島 (RB), モユルリ島 (RB), 大黒島 (RB), 南千島 (RB), 本州北・中部 (WV. FB: 山形), 弁天島 (RB), 三貫島 (FB), 舩倉島 (IV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (IV: 式根島, 三宅島, 八丈島).

海上に生息し, 崖の隙間などに営巣する.

BRACHYRAMPHUS Brandt マダラウミスズメ属

329. *Brachyramphus perdix* (Pallas, 1811) マダラウミスズメ

Madara-umisuzume Long-billed Murrelet

Range: N Pacific. Breeds in e Kamchatka, Commander Is., and Aleutian Is. Winters to Japan, Korea, and s California.

Status: Hokkaido (WV. FB: e Hokkaido), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV, IV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga), Izu Is. (IV: Oshima I.), Amami-Oshima I. (AV), Okinawa Is. (AV: Kumejima I.).

Habitat: Breeds on conifer trees or ground. Pelagic, sea coasts, rivers.

北海道 (WV. FB: 東部), 南千島 (WV), 本州 (WV, IV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀), 伊豆諸島 (IV: 大島), 奄美大島 (AV), 沖縄諸島 (AV: 久米島).

海上に生息する.

SYNTHLIBORAMPHUS Brandt ウミスズメ属

330. *Synthliboramphus antiquus* (Gmelin, 1789) ウミスズメ

Umisuzume Ancient Murrelet

Range: N Pacific. Breeds on coasts and islands of the n Pacific from Kamchatka east through the Aleutian Is. to w Alaska and Pacific coast of North America south to British Columbia, also south to the Kurile Is., Sakhalin, Japan, and Korea. Winters to Japan, Korea, and c California.

Status: Hokkaido (WV), Teurito I. (RB), Tomoshirijima I. (RB), Habo-

maimoshirito I. (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (WV), Sanganjima I. (FB), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV: Nijima I., Shikinejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Iwo Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Sakishima Is. (IV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Coastal waters, bays. Breeds in rock crevices.

北海道 (WV), 天売島 (RB), 友知島 (RB), ハボマイモシリ島 (RB), 南千島 (RB), 本州 (WV), 三貫島 (FB), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 新島, 式根島, 八丈島, 鳥島), 硫黄列島 (AV), 奄美大島 (AV), 先島諸島 (IV: 宮古島, 石垣島, 西表島).

海上に生息し, 北海道沿岸の島で繁殖する.

331. *Synthliboramphus wumizusume* (Temminck, 1836) カンムリウミスズメ

Kammuri-umisuzume Japanese Murrelet

Range: E Palearctic. Breeds from the Izu Is. to islands off Kyushu and s Korea. Mainly sedentary but winters at sea, ranging north to warm current periphery in se Hokkaido and south to the Ryukyu Is. Recorded from Sakhalin.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV: Shikotanto I.), Honshu (WV), Nanatsujima I. (RB), Mimianajima I. (RB), Kutsujima I. (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Koujima I. (RB), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Koyajima I. (RB), Chikuzen-Okinoshima I. (RB), Eboshijima I. (MB), Danjo Is. (PV), Koshikijima Is. (RB), Birojima I. (RB), Izu Is. (RB: Nijima I., Hayashima I., Tadanaejima I., Onbasejima I., Onoharajima I., Motone I., Kojine I., Torishima I., Udonejima I. FB: Shikinejima I., Miyakejima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Coastal waters. Breeds in rock crevices on islands.

北海道 (IV), 南千島 (IV: 色丹島), 本州 (WV), セツ島 (RB), 耳穴島 (RB), 沓島 (RB), 見島 (PV), 四国 (WV), 幸島 (RB), 九州 (WV), 対馬 (IV), 小屋島 (RB), 筑前沖ノ島 (RB), 烏帽子島 (MB), 男女群島 (PV), 甕島諸島 (RB), 枇榔島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 新島, 早島, 祇苗島, 恩馳島, 大野原島, 元根, 小池根, 鳥島, 鵜渡根島. FB: 式根島, 三宅島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 石垣島, 西表島).

海上に生息し, 島で繁殖する.

AETHIA Merrem エトロフウミスズメ属

332. *Aethia psittacula* (Pallas, 1769) ウミオウム

Umiomu Parakeet Auklet

Range: N Pacific. Breeds on coasts of Anadyr Bay and islands of the Bering Sea, south to the Commander Is. and Aleutian Is. Winters at sea south to Japan and California.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (PV, WV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Iwate, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Ishikawa), Nanatsujima I. (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (PV, WV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 岩手, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 石川), セツ島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島).
海上に生息する.

333. *Aethia pusilla* (Pallas, 1811) コウミスズメ

Ko-umisuzume Least Auklet

Range: N Pacific. Breeds on coasts of the Chukot Peninsula and w Alaska south to the Pribilof Is., Aleutian Is., and Shumagin I. and Semidi I. in the Gulf of Alaska. Winters at sea south to n Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV), Tanegashima I. (AV).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (AV), 九州 (AV), 種子島 (AV).
海上に生息する.

334. *Aethia pygmaea* (Gmelin, 1789) シラヒゲウミスズメ

Shirahige-umisuzume Whiskered Auklet

Range: N Pacific. Breeds on the Aleutian Is.; also possibly on the Commander Is. and Kurile Is. Mainly sedentary but winters at sea; casual in n Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n and c Honshu (AV: Miyagi, Kanagawa).

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北・中部 (AV: 宮城, 神奈川).
海上に生息する.

335. *Aethia cristatella* (Pallas, 1769) エトロフウミスズメ

Etorofu-umisuzume Crested Auklet

Range: N Pacific. Breeds on coasts and islands of the Bering Sea and Aleutian Is., east to Shumagin Is. in Alaska and south to the c Kurile Is. and Sakhalin. Winters at sea south to n Japan and Kodiak I.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n Honshu (IV), c Honshu (AV: Nagano, Ibaraki, Chiba, Shizuoka).

Habitat: Pelagic, coastal waters.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北部 (IV), 本州中部 (AV: 長野, 茨城, 千葉, 静岡).

海上に生息する.

CERORHINCA Bonaparte ウトウ属**336. *Cerorhinca monocerata* (Pallas, 1811) ウトウ**

Utou Rhinoceros Auklet

Range: N Pacific. Breeds in n Asia from s Sakhalin, Kurile Is., Japan, and Korea and in North America from the Aleutian Is. to w Alaska south to n California. Mainly sedentary, but winters at sea south to Japan, Korea, and Baja California.

Status: Hokkaido (WV), Teurito I. (MB), Daikokujima I. (MB), Yururito I. (MB), Moyururito I. (MB), Matsumae-Kojima I. (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (WV), Tsubakijima I. (MB), Miyagi-Enoshima I. (MB), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV: Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto), Tsushima (WV), Izu Is. (IV: Oshima I.).

Habitat: Pelagic. Breeds in burrows on grassy slopes on islands.

北海道 (WV), 天売島 (MB), 大黒島 (MB), ユルリ島 (MB), モユルリ島 (MB), 松前小島 (MB), 南千島 (MB), 本州 (WV), 椿島 (MB), 宮城江の島 (MB), 栗島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV: 福岡, 長崎, 熊本), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島).

海上に生息し, 島の斜面草地に営巣する.

FRATERCULA Brisson ツノメドリ属**337. *Fratercula corniculata* (Naumann, 1821) ツノメドリ**

Tsunomedori Horned Puffin

Range: N Pacific. Breeds on coasts of Russian Far East from Kolychin I. to

Kamchatka, n Kurile Is., Sakhalin, Commander Is., Aleutian Is., and Bering coast of Alaska south to British Columbia. Winters at sea south to n Japan, Hawaiian Is., and s California.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n and c Honshu (AV: Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Ibaraki, Chiba, Shizuoka), Hegurajima I. (IV). A few observations in summer in e Hokkaido.

Habitat: Pelagic.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北・中部 (AV: 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 茨城, 千葉, 静岡), 舩倉島 (IV). 北海道東部では夏にもまれに見られる.

海上に生息する.

338. *Fratercula cirrhata* (Pallas, 1769) エトピリカ

Etopirika Tufted Puffin

Range: N Pacific. Breeds on coasts and islands of the n Pacific from n Russian Far East to Kamchatka, Commander Is., Aleutian Is., and Alaskan coast, south to Sakhalin, e Hokkaido, and c California. Winters at sea south to n Japan and California.

Status: Hokkaido (WV. RB: e Hokkaido), s Kurile Is. (RB), Honshu (IV: Iwate, Yamagata, Niigata, Ibaraki, Shizuoka, Tottori), Hegurajima I. (IV).

Habitat: Pelagic, coastal waters. Breeds in burrows on grassy or rock crevices.

北海道 (WV. RB: 東部), 南千島 (RB), 本州 (IV: 岩手, 山形, 新潟, 茨城, 静岡, 鳥取), 舩倉島 (IV).

海上に生息し, 海岸の草地, 岩の隙間に営巣する.

Order ACCIPITRIFORMES タカ目

Family PANDIONIDAE ミサゴ科

PANDION Savigny ミサゴ属

339. *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) ミサゴ

Misago Western Osprey

Range: Except for Oceanian and Antarctic. Breeds in cold-temperate to subtropical Eurasia from Scandinavia to Kamchatka, Japan, e China, and Taiwan, locally in c and s Asia, Arabia, and Africa, Philippines, and Java to Australia; also greater part of North America. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

339-1. *Pandion haliaetus haliaetus* (Linnaeus, 1758) ミサゴ

Range: Range of the species except Philippines, Sunda Is. to Australia, North America, and West Indies. Migratory and sedentary, wintering to s Africa, India, Philippines, and Greater Sunda Is.; Japanese birds are mainly resident.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB. MB: Akita, Yamagata), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (WV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Kita-Iwoto I. (IV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Rocky coasts, inland waters, islands.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB. MB: 秋田, 山形), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (WV: 聳島, 父島, 母島), 北硫黄島 (IV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (WV).

海岸, 島, 湖沼, 河川に生息する.

Family ACCIPITRIDAE タカ科

PERNIS Cuvier ハチクマ属

340. *Pernis ptilorhynchus* (Temminck, 1821) ハチクマ

Hachi-kuma Honey Buzzard

Range: Palearctic and Indomalayan. Breeds in e Siberia to Amur Basin, Ussuriland, and Sakhalin, south to Manchuria, Korea, and Japan; also India to Myanmar, Malay Peninsula, Greater Sunda Is., Philippines, Borneo, and Taiwan. Migratory. Winters to subtropical and tropical regions.

340-1. *Pernis ptilorhynchus orientalis* Taczanowski, 1891 ハチクマ

Range: Breeds in s Siberia from the Enisei River to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Migratory. Winters to se Asia, Sunda Is., and

Philippines.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Kumejima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Mixed, evergreen and deciduous broad-leaved forests.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 久米島, 座間味島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

森林に生息する.

ELANUS Savigny カタグロトビ属

341. *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) カタグロトビ

Kataguro-tobi Black-winged Kite

Range: Afrotropical, Indomalayan, and n Australasian. Breeds from c and s Africa east to se Asia, New Guinea. Sedentary.

341-1. *Elanus caeruleus hypoleucus* Gould, 1859 カタグロトビ

Range: Breeds in Sumatra, Java, Borneo, Philippines, Lesser Sunda, and New Guinea. Sedentary.

Status: Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Jul. 2007, Ishigakijima I., Jan. 1995, Iriomotejima I. Sep. 2002, Yonagunijima I., Apr. 2001).

琉球諸島 (AV: 沖縄島, 2007 年 7 月, 石垣島, 1995 年 1 月, 西表島, 2002 年 9 月, 与那国島, 2001 年 4 月).

MILVUS Lacépède トビ属

342. *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) トビ

Tobi Black Kite

Range: Old World. Breeds in Eurasia from Europe east across s Siberia to Okhotsk coast, Amur Basin, Ussuriland, s Sakhalin, and Japan, south to Iran, India, Sri Lanka, and Malay Peninsula; also Africa except the Sahara, Madagascar, Lesser Sunda Is., and Sulawesi to Australia. Migratory and sedentary, wintering

to warmer regions.

342-1. *Milvus migrans lineatus* (Gray, 1831) トビ

Range: Breeds from the Urals east to Okhotsk coast and Japan, south to the Himalayas, Tibet, and s China. Winters to Iran, India, and se Asia; Japanese birds are sedentary.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (RB), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Kikaijima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Plains, sea coasts, fishing harbors, city areas.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (PV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 喜界島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).

都市, 農耕地, 河川沿い, 海岸などに生息する.

HALIAEETUS Savigny オジロワシ属

343. *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) オジロワシ

Ojiro-washi White-tailed Eagle

Range: Palearctic. Breeds in nearly whole Palearctic from Iceland and Scandinavia to Anadyrland and Kamchatka, south to Asia Minor, Yangtze Basin in e China, and n Japan; also sw Greenland. Migratory and sedentary, wintering south to n Africa, nw India, China, and Korea.

343-1. *Haliaeetus albicilla albicilla* (Linnaeus, 1758) オジロワシ

Range: Range of the species except Greenland. Japanese birds may winter to s Japan.

Status: Hokkaido (RB, WV), s Kurile Is. (RB, WV), Honshu (WV), Hegurajima I. (AV), Sado (WV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (WV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima

I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Kumejima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Sea coasts, coastal areas, inland lakes.

北海道 (RB, WV), 南千島 (RB, WV), 本州 (WV), 舩倉島 (AV), 佐渡 (WV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 久米島, 石垣島, 西表島).

海岸や内陸の湖沼沿岸の林で営巣する. 海岸, 河川や湖沼周辺に生息する.

344. *Haliaeetus leucocephalus* (Linnaeus, 1766) ハクトウワシ

Hakuto-washi Bald Eagle

Range: Nearctic. Resident in Aleutian Is., Alaska, Canada, US, and nw to s Mexico.

344-1. *Haliaeetus leucocephalus washingtoniensis* (Audubon, 1827) ハクトウワシ

Range: Resident in Aleutian Is., Alaska, Canada and n US.

Status: S Kurile Is. (AV: Kunashirito I., Jul. 2001).

南千島 (AV: 国後島, 2001 年 7 月).

345. *Haliaeetus pelagicus* (Pallas, 1811) オオワシ

O-washi Steller's Sea Eagle

Range: E Palearctic. Breeds in Koryakland to Kamchatka along Okhotsk coast, Amur Basin, Ussuriland, n Korea, and Sakhalin. Migratory. Winters south to Korea, Kurile Is., and n Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n and c Honshu (WV), sw Honshu (IV), Sado (IV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV), Tsushima (WV), Goto Is. (IV), Izu Is. (IV), Amami Is. (AV), Okinawajima I. (AV), Ishigakijima I. (AV).

Habitat: Sea coasts, estuaries, islands.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北・中部 (WV), 本州南西部 (IV), 佐渡 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV), 対馬 (WV), 五島列島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 奄美諸島 (AV), 沖縄島 (AV), 石垣島 (AV).

海岸, 大きな河川下流部, 島に生息する.

AEGYPIUS Savigny クロハゲワシ属**346. *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) クロハゲワシ**

Kuro-hagewashi Cinereous Vulture

Range: Palearctic. Breeds in s Iberian Peninsula, se Europe, Asia Minor, Caucasus, Transcaspia, Turkestan, Tibet, and Mongolia, east to nw China. Migratory and sedentary, wintering to Sudan, n India, China, and Korea; casual in Japan and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Etorofuto I.), Honshu (AV: Yamagata, Fukushima, Ibaraki, Shizuoka, Ishikawa, Fukui, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima, Kochi), Kyushu (AV: Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Sakishima Is. (AV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

北海道 (AV), 南千島 (AV: 択捉島), 本州 (AV: 山形, 福島, 茨城, 静岡, 石川, 福井, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 香川, 徳島, 高知), 九州 (AV: 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 先島諸島 (AV: 宮古島, 石垣島, 西表島).

SPILORNIS Gray カンムリワシ属**347. *Spilornis cheela* (Latham, 1790) カンムリワシ**

Kammuri-washi Crested Serpent Eagle

Range: Indomalayan. Breeds from India and Sri Lanka to s China, Taiwan, and s Ryukyu Is., south to Malay Peninsula, Philippines, Borneo I., and Sunda Is. Sedentary.

347-1. *Spilornis cheela perplexus* Swann, 1922 カンムリワシ

Range: Resident in s Ryukyu Is.

Status: Miyako Is. (AV: Miyakojima I., Taramajima I.), Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I. IV: Yonagunijima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

宮古諸島 (AV: 宮古島, 多良間島), 八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島. IV: 与那国島).

湿地, 水田などに近い常緑広葉樹林に生息する.

CIRCUS Lacépède チュウヒ属

348. *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパチュウヒ

Yoroppa-chuhi Western Marsh Harrier

Range: Palearctic. Breeds in Europe and Asia Minor, e into c Asia, east to upper Enisei river and Mongolia; and also nw Africa. Migratory and sedentary. Winters to w and s Europe, c Africa, India and Sri Lanka.

348-1. *Circus aeruginosus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパチュウヒ

Range: Breeds in Europe and Asia Minor, e into c Asia, east to upper Enisei river and Mongolia. Migratory and sedentary. Winters to s Europe and c Africa and in Indian Subcontinent and Sri Lanka.

Status: Honshu (AV: Yamaguchi, Dec. 1989).

本州 (AV: 山口, 1989 年 12 月).

349. *Circus spilonotus* Kaup, 1847 チュウヒ

Chuhi Eastern Marsh Harrier

Range: E Palearctic. Breeds from the Baikal region to Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland, south to Mongolia and Japan; also New Guinea. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical e Asia.

349-1. *Circus spilonotus spilonotus* Kaup, 1847 チュウヒ

Range: Range of the species except New Guinea. Migratory and sedentary. Winters to Malay Peninsula, s China, Korea, Japan, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I.), Honshu (WV, locally RB), Sado (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Izu Is. (IV: Shikinejima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (WV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Reed beds, marshes, open fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島), 本州 (WV, 一部 RB), 佐渡 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 伊豆諸島 (IV: 式根島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (WV: 南大東島).

湿原, アシ原, 農耕地に生息する.

350. *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) ハイイロチュウヒ

Haiiro-chuhi Hen Harrier

Range: Holarctic. Breeds from Europe east across Eurasia to Amur Basin and Okhotsk coast, north to arctic tundras, south to Caucasus, n Mongolia, Manchuria, and s Ussuriland; also North America south to s US. Migratory and sedentary. Winters to temperate regions.

350-1. *Circus cyaneus cyaneus* (Linnaeus, 1766) ハイイロチュウヒ

Range: Range of the species except North America. Migratory and sedentary. Winters to the Mediterranean region, Iran, n India, Myanmar, se Asia to Malay Peninsula, s China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.). Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Marshes, swamps, reed beds, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島). 大東諸島 (IV: 南大東島).

湿原, アシ原, 農耕地に生息する.

351. *Circus macrourus* (Gmelin, 1770) ウスハイイロチュウヒ

Usu-haiiro-chuhi Pallid Harrier

Range: Palearctic. Breeds from e Europe to c Asia. Migratory. Winters to c Africa and s Asia.

Status: Honshu (AV: Chiba, Dec. 2008, Shizuoka, Oct. 2008, Kyoto, Oct. 2010).

本州 (AV: 千葉, 2008 年 12 月, 静岡, 2008 年 10 月, 京都, 2010 年 10 月).

352. *Circus melanoleucos* (Pennant, 1769) マダラチュウヒ

Madara-chuhi Pied Harrier

Range: E Palearctic. Breeds from Lake Baikal east to Amur Basin and Ussuri-land, south to Mongolia, s Manchuria, and n Korea. Migratory. Winters to India, Sri Lanka, Myanmar, Malay Peninsula, s China, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Yamagata, Niigata, Tochigi, Toyama, Ibaraki, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Aichi, Ishikawa, Shiga, Wakayama, Hyogo, Tottori, Yamaguchi), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (AV), Kusagaki Is. (AV), Izu Is. (AV: Miyakejima I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Reed beds, marshes, open fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 山形, 新潟, 栃木, 富山, 茨城, 東京, 神奈川, 山梨, 愛知, 石川, 滋賀, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 山口), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (AV), 草垣諸島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

湿原, アシ原, 農耕地に生息する.

ACCIPITER Brisson ハイタカ属

353. *Accipiter soloensis* (Horsfield, 1821) アカハラダカ

Akahara-daka Chinese Sparrowhawk

Range: E Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds in China from s Manchuria to Kwangtung, Kwangsi and Yunnan, and Korea. Migratory. Winters to Vietnam, Malay Peninsula, Indonesia, Philippines, Moluccas, and New Guinea.

Status: E Hokkaido (AV: Nemuro), Honshu (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV, CB: Saga), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (AV: Torishima I.), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Woodlands with paddies or wetlands.

北海道東部 (AV: 根室), 本州 (IV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV, CB: 佐賀), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (AV: 鳥島), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

水田や湿地に接する森林に生息する.

354. *Accipiter gularis* (Temminck & Schlegel, 1844) ツミ

Tsumi Japanese Sparrowhawk

Range: C and e Palearctic. Breeds in se Siberia from the Tomsk region to Transbaikalia, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Japan, south to Mongolia. Sedentary and migratory. Winters to Myanmar, Indochina, Malaya, s China, Sunda Is., Philippines, and Sulawesi.

354-1. *Accipiter gularis gularis* (Temminck & Schlegel, 1844) ツミ

Range: Breeds in Sakhalin and Japan from s Kurile Is. to Kyushu. Sedentary and migratory. Winters to s China, se Asia, and Philippines.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (WV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (RB), Okinawa Is. (RB), Yaeyama Is. (WV: Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Forests in low mountain zones and plains.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (WV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV: 聶島, 父島, 母島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 男女群島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (RB), 沖縄諸島 (RB), 八重山諸島 (WV: 石垣島, 西表島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

森林, 農耕地・公園の林に生息する.

354-2. *Accipiter gularis iwasakii* Mishima, 1962 リュウキュウツミ

Range: Breeds on Ishigakijima I., Iriomotejima I., and Yonagunijima I. Probably sedentary.

Status: Ishigakijima I. (RB), Iriomotejima I. (RB), Yonagunijima I. (RB).

Habitat: Forests.

石垣島 (RB), 西表島 (RB), 与那国島 (RB).

森林に生息する。留鳥と考えられ、生息数は少ない。

355. *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) ハイタカ

Hai-taka Eurasian Sparrowhawk

Range: Palearctic. Breeds from Europe east across s Siberia to Sakhalin, Kurile Is., and Japan, south to North Africa, Asia Minor, Mongolia, and Korea; also Himalayas to w China. Northern birds migratory, wintering in warmer areas.

355-1. *Accipiter nisus nisosimilis* (Tickell, 1833) ハイタカ

Range: Breeds in e Siberia from Enisei River to Okhotsk coast and Kolyma-land, south to the Altai, Transbaikalia, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Migratory and sedentary. Winters in warmer areas south to India, se Asia, and s China.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Forests in low mountain zones.

北海道 (RB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 男女群島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

森林や平野部の林に生息する。

356. *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) オオタカ

O-taka Northern Goshawk

Range: Holarctic. Breeds in temperate Eurasia from Europe east across Siberia to Kamchatka, south to Asia Minor, Mongolia, Manchuria, Ussuriland, and Japan; also se Tibet to nw China and North America south to nw US. Migratory and sedentary, wintering to warmer areas.

356-1. *Accipiter gentilis albidus* (Menzbier, 1882) シロオオタカ

Range: Breeds from Lena River to Kamchatka. Sedentary.

Status: Hokkaido (AV: Sarobetsu, Nov. 1979), Honshu (AV: Aomori, Yamaga-

ta).

北海道 (AV: サロベツ原野, 1979 年 11 月), 本州 (AV: 青森, 山形).

356-2. *Accipiter gentilis fujiyamae* (Swann & Hartert, 1923) オオタカ

Range: Breeds in Japan and Sakhalin. Mainly sedentary, but recorded from Taiwan.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (AV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (WV. RB: Kumamoto), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Woodlands, low mountains.

北海道 (RB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (AV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (WV. RB: 熊本), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

森林, 農耕地に生息する.

BUTASTUR Hodgson サシバ属

357. *Butastur indicus* (Gmelin, 1788) サシバ

Sashiba Grey-faced Buzzard-eagle

Range: E Palearctic. Breeds in s Amur Basin, Ussuriland, China from Manchuria to Hopeh, Korea, and Japan. Migratory. Winters to Tenasserim, Malay Peninsula, Indochina, Philippines, and Indonesia east to Moluccas and New Guinea.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (MB. PV), Awashima I. (MB), Sado (MB), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB, PV), Kyushu (MB. PV. WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV. FB: Miyakejima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Forests in low mountain zones and rice fields.

北海道 (AV), 本州 (MB. PV), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB, PV), 九州 (MB. PV. WV), 対馬 (PV), 男女群島

(PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV. FB: 三宅島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).
森林, 水田に生息する.

BUTEO Lacépède ノスリ属

358. *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) ノスリ

Nosuri Common Buzzard

Range: Palearctic. Breeds from Europe and Atlantic islands (Cape Verdes, Canaries, Madeira and Azores) east across s Siberia to Okhotsk coast, Manchuria, and Japan, south to Asia Minor, Himalayas, and w China. Northern birds migratory, wintering to temperate regions.

358-1. *Buteo buteo japonicus* Temminck & Schlegel, 1844 ノスリ

Range: Breeds in s Siberia from Enisei River to Transbaikalia, Amur Basin, and Okhotsk coast, south to Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Japan. Migratory and sedentary, wintering south to India, Indochina, Malay Peninsula, s China, Korea, and s Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (FB. WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Woodlands, open fields.

北海道 (MB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (FB. WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

森林に生息し, 開けた環境にも飛来する.

358-2. *Buteo buteo toyoshimai* Momiyama, 1927 オガサワラノスリ

Range: Breeds on Ogasawara Is. Sedentary.

Status: Ogasawara Is. (RB: Chichijima I., Hahajima I. FB: Mukojima I.). Record in Izu Is. (6th ed.) was removed because of lack of evidence.

Habitat: Woodlands, open field.

小笠原群島 (RB: 父島, 母島. FB: 聳島). 目録 6 版では伊豆諸島 (AV) としていた. これは Vaurie(1961, 1965) を根拠としているが, 原著にお

いて亜種を判定する十分な証拠が示されていないため、この記録は削除した。

森林に生息し、開けた環境にも飛来する。

358-3. *Buteo buteo oshiroi* Kuroda, 1971 ダイトウノスリ

Range: Breeds on Daito Is. Sedentary.

Status: Daito Is. (FB: Minami-Daitojima I., IV: Kita-Daitojima I.). Three pairs were recorded on Minami-Daitojima I. in 1964. A bird was observed on Kita-Daitojima I. in 1973. Extinct.

Habitat: Woodlands, open fields.

大東諸島 (FB: 南大東島, IV: 北大東島). 南大東島では 1964 年に 3 つがいの記録があるが、その後は繁殖の記録がない。北大東島では 1973 年に観察したとされるが、それ以外に記録はない。絶滅。

森林に生息するが、生態については不明の点が多い。

359. *Buteo hemilasius* Temminck & Schlegel, 1844 オオノスリ

O-nosuri Upland Buzzard

Range: C and e Palearctic. Breeds from the Tian Shan east through Mongolia to Transbaikalia and w Manchuria, south to Nepal and Tibet. Winters to c China and Korea; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Toyama, Ibaraki, Ishikawa, Gifu, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I., Iheyajima I.), Yonagunijima I. (IV).

Habitat: Cultivated fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 富山, 茨城, 石川, 岐阜, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 徳之島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島, 伊平屋島), 与那国島 (IV).

農耕地に生息する。

360. *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) ケアシノスリ

Keashi-nosuri Rough-legged Buzzard

Range: N Holarctic. Breeds from Scandinavia east across arctic Siberia to Okhotsk coast, Chukot Peninsula, and Kamchatka, south to Kurile Is.; also Alaska, n Canada, and Aleutian Is. Migratory and sedentary. Winters to c Europe, Turke-

stan, Manchuria, Ussuriland, and Japan.

360-1. *Buteo lagopus menzbieri* Dementiev, 1951 ケアシノスリ

Range: Breeds in e Siberia and Russian Far East from the Enisei to Chukot Peninsula. Migratory. Winters south to China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), n Honshu (WV), c and sw Honshu (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Shikoku (IV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I.), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.).

Habitat: Coastal barren hills, grasslands.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州北部 (WV), 本州中・南西部 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 四国 (IV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV), 対馬 (IV), 小笠原群島 (AV: 聳島), 奄美諸島 (AV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊平屋島, 宮古島, 石垣島).

主に海岸沿いの草地に生息する.

AQUILA Brisson イヌワシ属

361. *Aquila clanga* Pallas, 1811 カラフトワシ

Karafuto-washi Greater Spotted Eagle

Range: Palearctic. Breeds in temperate Eurasia from e Europe to Amur Basin and Okhotsk coast, south to Caspian Sea, Mongolia, Manchuria, and Ussuriland. Winters to s Europe, n Africa, India, se Asia, and s China. Recorded from Sakhalin, Kurile Is., Japan, Korea, and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Miyagi, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Fukui, Hyogo), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Irabujima I., Yonagunijima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 宮城, 新潟, 東京, 神奈川, 静岡, 福井, 兵庫), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 伊良部島, 与那国島).

362. *Aquila heliaca* Savigny, 1809 カタシロワシ

Katashiro-washi Eastern Imperial Eagle

Range: W and c Palearctic. Breeds discontinuously from se Europe east

through Asia Minor to the lower Volga, Turkestan, and Lake Baikal. Migratory. Winters to Red Sea coast, Ethiopia, Iraq, n India, Mongolia, s China, and n Indochina.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Iwate, Niigata, Shizuoka, Gifu, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV), Iriomotejima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 岩手, 新潟, 静岡, 岐阜, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV), 西表島 (AV).

363. *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) イヌワシ

Inu-washi Golden Eagle

Range: Holarctic. Breeds in greater part of Palearctic from Europe and nw Africa to Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to the Caucasus, Iran, Himalayas, n China, Manchuria, Korea, and Japan; also North America south to c Mexico. Mainly sedentary.

363-1. *Aquila chrysaetos japonica* Severtzov, 1888 イヌワシ

Range: Breeds in Korea and Japan. Sedentary.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV), Honshu (RB), Sado (AV), Oki (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Izu Is. (AV: Nii-jima I.).

Habitat: Mountainous areas, mainly inland.

北海道 (IV), 南千島 (PV), 本州 (RB), 佐渡 (AV), 隠岐 (IV), 見島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (AV: 新島).

山地に生息する.

NISAETUS Hodgson クマタカ属

364. *Nisaetus nipalensis* Hodgson, 1836 クマタカ

Kuma-taka Mountain Hawk-Eagle

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds in temperate and tropical Asia from the Himalayas through Assam to n Thailand, s China, Hainan, and Taiwan, north to Japan. Mainly sedentary.

364-1. *Nisaetus nipalensis orientalis* (Temminck & Schlegel, 1844) クマ

タカ

Range: Breeds in Japan. Sedentary, but has wandered to Korea.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (RB), Sado (IV), Oki (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV).

Habitat: Mountain forests.

北海道 (RB), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (RB), 佐渡 (IV), 隠岐 (IV), 見島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV).

森林に生息する.

Order STRIGIFORMES フクロウ目

Family TYTONIDAE メンフクロウ科

TYTO Billberg メンフクロウ属

365. *Tyto longimembris* (Jerdon, 1839) ヒガシメンフクロウ

Higashi-menfukuro Eastern Grass Owl

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from India through Myanmar east to se China, and in Taiwan, Philippines, Vietnam, Sulawesi, Lesser Sunda Is., New Guinea, and n, c and e Australia. Sedentary.

365-U. *Tyto longimembris* ssp. 亜種不明

Status: Iriomotejima I. (AV: May 1975).

西表島 (AV: 1975 年 5 月).

Family STRIGIDAE フクロウ科

OTUS Pennant コノハズク属

366. *Otus lempiji* (Horsfield, 1821) オオコノハズク

O-konoha-zuku Collared Scops Owl

Range: E Palearctic and Indomalayan. Breeds from s Manchuria, Ussuriland,

and Sakhalin, south through e China and Japan to n Vietnam, Malay Peninsula, Greater Sunda Is., and Borneo. Mainly sedentary, but northern birds are short-distance migrants.

366-1. *Otus lempiji ussuriensis* (Buturlin, 1910) サメイロオオコノハズク

Range: Breeds in Ussuriland, s Manchuria, Sakhalin, and Korea. Winters to s Korea and n China; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Niigata). No reliable records over the last 50 years.

本州 (AV: 新潟). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

366-2. *Otus lempiji semitorques* Temminck & Schlegel, 1844 オオコノハズク

Range: Breeds in Sakhalin, Quelpart I., Japan and Kurile Is. north to Urup I. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB: Kunashirito I.), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Yakushima I. (WV), Izu Is. (RB), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.).

Habitat: Forests, woodlands, forest edge.

北海道 (RB), 南千島 (RB: 国後島), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (RB), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島).

森林, 林縁などに生息する.

366-3. *Otus lempiji pryeri* (Gurney, 1889) リュウキュウオオコノハズク

Range: Resident on Ryukyu Is.

Status: Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Akashima I., Yagajishima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I. AV: Miyakojima I.).

Habitat: Evergreen forests, forest edge.

琉球諸島 (RB: 沖縄島, 阿嘉島, 屋我地島, 石垣島, 西表島. AV: 宮古島).

常緑樹林, 林縁に生息する.

367. *Otus sunia* (Hodgson, 1836) コノハズク

Konoha-zuku Oriental Scops Owl

Range: E Palearctic and Indomalayan. Breeds from n Pakistan east through Indochina and China to se Siberia, n Korea, Sakhalin and Japan; also s India, Sri Lanka, Nicobar Is., and Andaman Is. Northern birds migratory, wintering to s and se Asia.

367-1. *Otus sunia japonicus* Temminck & Schlegel, 1844 コノハズク

Range: Breeds on main islands of Japan. Winters in s Japan and possibly in Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (MB), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV: Torishima I.), Tokara Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Dense forests.

北海道 (MB), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (MB), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 鳥島), トカラ列島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 西表島, 竹富島, 与那国島).

森林に生息する.

368. *Otus elegans* (Cassin, 1852) リュウキュウコノハズク

Ryukyu-konoha-zuku Ryukyu Scops Owl

Range: N Indomalayan. Breeds from Amami Is. south to Ryukyu Is., Daito Is., Lan Yu I., Batan Is. and Babuyan Is. (off Luzon). Mainly sedentary.

368-1. *Otus elegans interpositus* Kuroda, 1923 ダイトウコノハズク

Range: Resident on Daito Is.

Status: Daito Is. (RB: Minami-Daitojima I. FB: Kita-Daitojima I.).

Habitat: Dense forests.

大東諸島 (RB: 南大東島. FB: 北大東島).

常緑広葉樹林に生息する.

368-2. *Otus elegans elegans* (Cassin, 1852) リュウキュウコノハズク

Range: Resident on Amami Is. and Ryukyu Is. south to Yonagunijima I.

Status: Kyushu (AV: Nagasaki), Chikuzen-Okinoshima I. (AV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I. IV: Kikaijima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawa-

jima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Haterumajima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Dense forests.

九州 (AV: 長崎), 筑前沖ノ島 (AV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 徳之島, 沖永良部島. IV: 喜界島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 波照間島, 与那国島).

常緑広葉樹林に生息する.

BUBO Duméril ワシミミズク属

369. *Bubo scandiacus* (Linnaeus, 1758) シロフクロウ

Shiro-fukuro Snowy Owl

Range: Holarctic, circumpolar. Breeds in arctic tundras from n Scandinavia east through arctic Siberia to Chukot Peninsula and Anadyrland, arctic North America, and Greenland. Sedentary but irruptive, wintering south to c Europe, n China, and s US, occasionally n Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (AV: Akita, Yamagata, Miyagi, Chiba, Ishikawa, Gifu, Tottori, Hiroshima).

Habitat: Sea coasts, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (AV: 秋田, 山形, 宮城, 千葉, 石川, 岐阜, 鳥取, 広島).

海岸, 農耕地に生息する.

370. *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) ワシミミズク

Washi-mimizuku Eurasian Eagle-Owl

Range: Palearctic. Breeds in greater part of Eurasia except arctic regions; also nw Africa. Mainly sedentary.

370-1. *Bubo bubo kiautschensis* Reichenow, 1903 タイリクワシミミズク

Range: Resident in Korea and e China west to Kansu and Szechwan, south to Kwantung and s Yunnan; accidental in Japan.

Status: Izu Is. (AV: Miyakejima I.), Goto Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV: Mar. 1912).

伊豆諸島 (AV: 三宅島), 五島列島 (AV), 奄美大島 (AV: 1912 年 3 月).

370-2. *Bubo bubo borissowi* Hesse, 1915 ワシミミズク

Range: Resident in Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB: Etorofuto I., Kunashirito I.).

Habitat: Forests, cultivated fields.

北海道 (RB), 南千島 (RB: 択捉島, 国後島).

崖のある森林や農耕地に生息する.

KETUPA Lesson シマフクロウ属

371. *Ketupa blakistoni* (Seebohm, 1884) シマフクロウ

Shima-fukuro Blakiston's Fish Owl

Range: E Palearctic. Breeds in ne Asia along Okhotsk coast north to Magadan, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is. Sedentary.

371-1. *Ketupa blakistoni blakistoni* (Seebohm, 1884) シマフクロウ

Range: Resident in Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is.

Status: E and c Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB: Kunashirito I.).

Habitat: Forests along rivers and lakes.

北海道中・東部 (RB), 南千島 (RB: 国後島).

川沿いや湖沼周辺の森林に生息する.

STRIX Linnaeus フクロウ属

372. *Strix uralensis* Pallas, 1771 フクロウ

Fukuro Ural Owl

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia and e Europe east across s Siberia and ne China to Okhotsk coast, south to Korea, Sakhalin, and Japan. Mainly sedentary.

372-1. *Strix uralensis japonica* (Clark, 1907) エゾフクロウ

Range: Resident in Hokkaido and s Kurile Is. Recorded from Korea.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

針広混交林, 落葉広葉樹林, 農耕地などに生息する.

372-2. *Strix uralensis hondoensis* (Clark, 1907) フクロウ

Range: Resident in n Honshu.

Status: N Honshu (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields.

本州北部 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため、検討が必要である.

針広混交林, 落葉広葉樹林, 農耕地などに生息する.

372-3. *Strix uralensis momiyamae* Taka-Tsukasa, 1931 モミヤマフクロウ

Range: Resident in c Honshu.

Status: N and c Honshu (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields.

本州北・中部 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため、検討が必要である.

針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, 農耕地などに生息する.

372-4. *Strix uralensis fuscescens* Temminck & Schlegel, 1850 キュウシュウフクロウ

Range: Resident in s Honshu, Shikoku, Kyushu, and Izu Is.

Status: C and sw Honshu (RB), Awajishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Izu Is. (RB, IV: Torishima I.). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Forests, woodlands, cultivated fields.

本州中・南西部 (RB), 淡路島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 伊豆諸島 (RB, IV: 鳥島). 本亜種の分布域は明確ではないため、検討が必要である.

針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, 農耕地などに生息する.

372-U. *Strix uralensis* ssp. 亜種不明

Status: Sado (AV), Hachijojima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Yoronjima I. (AV).

佐渡 (AV), 八丈島 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 与論島 (AV).

AEGOLIUS Kaup キンメフクロウ属

373. *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758) キンメフクロウ

Kimme-fukuro Boreal Owl

Range: Holarctic. Breeds from mountains of c and e Europe and Scandinavia east through Siberia to c Anadyrland and Kamchatka, south to the Altai, n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin and Japan, and isolated populations in the Caucasus, w Himalayas and ne Tsinghai in China; also North America from Alaska to n Canada. Mainly sedentary.

373-1. *Aegolius funereus magnus* (Buturlin, 1907) キンメフクロウ

Range: Breeds in e Siberia from the Enisei east to c Anadyrland and Kamchatka, south to Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido. Sedentary.

Status: Hokkaido (CB. WV), s Kurile Is. (RB: Kunashirito I.), Honshu (AV: Iwate, Niigata, Ishikawa).

Habitat: Light coniferous and mixed forests.

北海道 (CB. WV), 南千島 (RB: 国後島), 本州 (AV: 岩手, 新潟, 石川).

森林に生息する.

NINOX Hodgson アオバズク属

374. *Ninox scutulata* (Raffles, 1822) アオバズク

Aoba-zuku Brown Hawk-Owl

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from India and Sri Lanka east through Assam to se Asia, Malay Peninsula, Philippines, Greater Sunda Is., and Borneo, north through e China to Korea, Manchuria, Ussuriland, and Japan. Northern birds migratory, wintering in tropical Asia.

374-1. *Ninox scutulata macroptera* Blasius, 1888 チョウセンアオバズク

Range: Breeds in lower Amur Basin, e Manchuria, and n Korea. Winters probably to se Asia. Recorded from Quelpart I.

Status: Hokkaido (AV), n Honshu (AV: Toyama), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ishigakijima I. (AV), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Oct. 1922, Minami-Daitojima I.).

北海道 (AV), 本州北部 (AV: 富山), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 石垣島

(AV), 大東諸島 (AV: 北大東島, 1922 年 10 月, 南大東島).

374-2. *Ninox scutulata japonica* (Temminck & Schlegel, 1845) アオバズク

Range: Breeds in Japan and s Korea. Winters to Malay Peninsula, Philippines, Greater Sunda Is., and Sulawesi.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (MB), Izu Is. (MB, PV: Oshima I., Toshima I., Niijima I., Shikinejima I., Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (RB), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Yaeyama Is. (IV: Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Lowland forests, woodlands.

北海道 (MB), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 種子島 (MB), 伊豆諸島 (MB, PV: 大島, 利島, 新島, 式根島, 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 八重山諸島 (IV: 石垣島, 西表島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

森林, 社寺林, 公園などに生息する.

374-3. *Ninox scutulata toto* Momiyama, 1931 リュウキュウアオバズク

Range: Breeds on Amami Is., Ryukyu Is., Taiwan, Lan Yu I., and Lau Tao I. Sedentary.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Kumejima I., Zamamijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Lowland forests.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 粟国島, 久米島, 座間味島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 竹富島, 黒島, 与那国島, 波照間島).

常緑広葉樹林に生息する.

ASIO Brisson トラフズク属

375. *Asio otus* (Linnaeus, 1758) トラフズク

Torafu-zuku Long-eared Owl

Range: Holarctic. Breeds from the British Isles, w Europe and sw Africa east across Eurasia to Okhotsk coast, Ussuriland, and n Japan, south to Asia Minor, s Transcaspia, n China, and Manchuria; also Canada, US, and n Mexico. Migratory and sedentary, wintering in temperate regions.

375-1. *Asio otus otus* (Linnaeus, 1758) トラフズク

Range: Range of the species except the Canary Is. and North America. Winters to n Africa, Arabia, n India, China, and Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Shikotanto I.), n Honshu (MB), c and sw Honshu (CB: Tochigi, Gunma, Nagano, Yamanashi, Tottori. WV), Sado (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (IV: Oshima I., Miyakejima I., Aogashima I., Hachijojima I., Torishima I.), Iwo Is. (IV: Kita-Iwoto I.), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iheyajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Coniferous forests, sparse woodlands, farmlands.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 色丹島), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (CB: 栃木, 群馬, 長野, 山梨, 鳥取. WV), 佐渡 (IV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 三宅島, 青ヶ島, 八丈島, 鳥島), 硫黄列島 (IV: 北硫黄島), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊平屋島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島), 南大東島 (AV).

針葉樹林, 疎林, 農耕地や海岸の防風林に生息する.

376. *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) コミミズク

Komimi-zuku Short-eared Owl

Range: Holarctic, Neotropical and c Pacific. Breeds from Iceland, the British Isles, and most parts of Europe east across n Eurasia to Chukot Peninsula and Kamchatka, south to the Caucasus, Kirghiz Steppes, n Mongolia, Manchuria, Amur Basin, Ussuriland, and Sakhalin; also North America south to n US, Greater Antilles, South America, Falklands, and islands in c Pacific. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

376-1. *Asio flammeus flammeus* (Pontoppidan, 1763) コミミズク

Range: Range of the species except the Greater Antilles, South America, Falklands, and islands in c Pacific. Winters to n Africa, Arabia, India to se Asia, s China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Izu Is. (IV: Oshima I., Shikinejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Minami-Torishima I. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Kurimajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Riverbeds, marshes, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 伊豆諸島 (IV: 大島, 式根島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 南鳥島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 来間島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

河川敷, 湿原, 農耕地など開けた環境に生息する.

Order BUCEROTIFORMES サイチョウ目

Family UPUPIDAE ヤツガシラ科

UPUPA Linnaeus ヤツガシラ属

377. *Upupa epops* Linnaeus, 1758 ヤツガシラ

Yatsugashira Eurasian Hoopoe

Range: Eurasian and African. Breeds from sw Europe east across Eurasia to the Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland, south to s India, Sri Lanka, and Malay Peninsula; also nw and tropical Africa and Madagascar. Northern birds migratory, wintering to tropical regions.

377-1. *Upupa epops saturata* Lönnberg, 1909 ヤツガシラ

Range: Breeds in s Siberia from the Enisei to the Amur Basin, Ussuriland, Korea, and Japan (has bred twice in Honshu), south through China to Tibet and

e Himalayas. Winters to s China, n Myanmar, and Assam.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (IV: Shikotanto I.), Honshu (PV. CB: Iwate, Nagano, Hiroshima), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Oshima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (IV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Kikajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Zamamijima I., Tokashikijima I., Akashima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open woodland, pastures, cultivated fields, gardens.

北海道 (PV), 南千島 (IV: 色丹島), 本州 (PV. CB: 岩手, 長野, 広島), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 大島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV: 父島, 母島), 硫黄列島 (IV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊平屋島, 粟国島, 渡嘉敷島, 座間味島, 阿嘉島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

林縁, 草原, 農耕地などに生息する.

Order CORACIIFORMES ブッポウソウ目

Family ALCEDINIDAE カワセミ科

HALCYON Swainson アカショウビン属

378. *Halcyon coromanda* (Latham, 1790) アカショウビン

Aka-shobin Ruddy Kingfisher

Range: Asiatic. Breeds from the Himalayas east through Assam to Indochina, south to the Andaman Is., Malay Peninsula, Greater Sunda Is., Moluccas Is., and Palawan, and in ne Asia from n Manchuria to Korea and Japan. Northern birds migratory, wintering to tropical regions.

378-1. *Halcyon coromanda major* (Temminck & Schlegel, 1848) アカシヨウビン

Range: Breeds in Manchuria, Korea, and Japan south to Yakushima I. Winters to the Philippines and Sulawesi. Recorded from Sakhalin and Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (MB), Yakushima I. (MB), Izu Is. (PV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Tokara Is. (PV: Akusekijima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Mixed, deciduous and evergreen forests, mountain streams.

北海道 (MB), 本州 (MB), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (MB), 屋久島 (MB), 伊豆諸島 (PV: 式根島, 三宅島, 八丈島, 青ヶ島), トカラ列島 (PV: 悪石島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島), 南大東島 (AV).

山地の溪流のある針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林に生息する.

378-2. *Halcyon coromanda bangsi* (Oberholser, 1915) リュウキュウアカシヨウビン

Range: Breeds on the Tokara Is., Amami Is., and Ryukyu Is. Winters to the Philippines and Sulawesi.

Status: Tokara Is. (MB), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (MB: Okinawajima I., Iejima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Zamamijima I., Tokashikijima I., Akashima I., Gerumajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Evergreen forests, coastal woods, village groves.

トカラ列島 (MB), 奄美諸島 (MB: 奄美大島, 加計呂麻島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (MB: 沖縄島, 伊江島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 座間味島, 渡嘉敷島, 阿嘉島, 慶留間島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 黒島, 与那国島, 波照間島).

常緑広葉樹林, 海岸林, 村落周辺の林に生息する.

379. *Halcyon smyrnensis* (Linnaeus, 1758) アオショウビン

Ao-shobin White-throated Kingfisher

Range: S Palearctic and Indomalayan. Breeds in w and s Turkey, ne Egypt, and from c Iraq through Pakistan, extreme ne Afghanistan, India and Sri Lanka east to se China and Taiwan, and south to Sumatra and w Java, Philippines and Andaman Is.

379-U. *Halcyon smyrnensis* ssp. 亜種不明

Status: Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Apr. 1994, Iriomotejima I., Apr. 1998).

八重山諸島 (AV: 石垣島, 1994 年 4 月, 西表島, 1998 年 4 月).

380. *Halcyon pileata* (Boddaert, 1783) ヤマショウビン

Yama-shobin Black-capped Kingfisher

Range: Asiatic. Breeds from India and Sri Lanka east to n Indochina, s China, and Hainan, north to se Manchuria and Korea. Northern birds migratory, wintering south to the Greater Sunda Is. and Philippines.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi. CB: Shimane, 1983), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (IV), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (IV), Tokara Is. (IV), Izu Is. (IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ikemajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Coastal forests, lowland light woods, rivers.

北海道 (AV), 本州 (IV: 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 茨城, 埼玉, 東京, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 広島, 山口. CB: 島根, 1983 年), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (IV), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (IV), トカラ列島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊平屋島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 池間島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (AV).

山地の河川, 海岸沿いの森林に生息する.

TODIRAMPHUS Lesson ナンヨウショウビン属**381. *Todiramphus chloris* (Boddaert, 1783) ナンヨウショウビン**

Nanyo-shobin Collared Kingfisher

Range: Mainly Indomalayan and Australasian. Breeds on the Red Sea coast, ne Arabian Peninsula, w India, Andaman Is., Nicobar Is., and ne Bengal, east across Myanmar and se Asia to the Malay Peninsula, Sunda Is., Philippines, Mariana Is., New Guinea, and further to Tonga and Samoa, also n Australia. Sedentary.

381-1. *Todiramphus chloris collaris* (Scopoli, 1786) ナンヨウショウビン

Range: Breeds in the Philippines; accidental in Japan.

Status: Ryukyu Is. (AV: Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

琉球諸島 (AV: 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

382. *Todiramphus miyakoensis* (Kuroda, 1919) ミヤコショウビン

Miyako-shobin Miyako Island Kingfisher

Range: E Palearctic. Known by a single specimen from Miyakojima I.

Status: Miyakojima I. (IV: Feb. 5, 1887). Extinct.

宮古島 (IV). 1887 年 2 月 5 日の記録があるのみ. 絶滅.

ALCEDO Linnaeus カワセミ属**383. *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) カワセミ**

Kawa-semi Common Kingfisher

Range: Temperate and tropical Old World. Breeds from the British Isles. and w Europe east to the Okhotsk coast, Sakhalin, and Japan, south to s India, Sri Lanka, and Malay Peninsula: also Sunda Is. to the Solomon Is. and n Africa. Northern birds migratory, wintering south to Africa, Indonesia, and Philippines.

383-1. *Alcedo atthis bengalensis* Gmelin, 1788 カワセミ

Range: Breeds in Asia from n India to Indochina and Malay Peninsula, north through China and Taiwan to Transbaikalia, Manchuria, Amur Basin, Sakhalin, and Japan. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Ky-

ushu (RB), Tsushima (RB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (WV: Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Izenajima I., Agunijima I., Tokashikijima I., Zamamijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rivers, streams, ponds, marshes, water courses in cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 男女群島 (PV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (WV: 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 伊是名島, 栗国島, 渡嘉敷島, 座間味島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 小浜島, 黒島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

川, 湖沼, 池, 水路などに生息する.

CEYX Lacépède ミツユビカワセミ属

384. *Ceyx erithaca* (Linnaeus, 1758) ミツユビカワセミ

Mitsuyubi-kawasemi Oriental Dwarf Kingfisher

Range: S Indomalayan. Breeds in sw India and Sri Lanka, and from Bhutan to s China (Yunnan, Hainan), s Indochina to Malay Peninsula, Mindoro to Palawan and Borneo, and south to the Greater and Lesser Sunda, Andaman Is. and Nicobar Is.

384-1. *Ceyx erithaca erithaca* (Linnaeus, 1758) ミツユビカワセミ

Range: Breeds in sw India (s from Mumbai), Sri Lanka, and from Bhutan east to s China (Yunnan, Hainan) and south to Sumatra and adjacent islands.

Status: Okinawajima I. (AV: Jun. 2006).

沖縄島 (AV: 2006 年 6 月).

MEGACERYLE Kaup ヤマセミ属**385. *Megaceryle lugubris* (Temminck, 1834) ヤマセミ**

Yama-semi Crested Kingfisher

Range: Asiatic. Breeds from the Himalayas east through Assam and Myanmar to Indochina, China from Yunnan to Chihli, and Hainan, north to Japan. Mainly sedentary.

385-1. *Megaceryle lugubris pallida* (Momiya, 1927) エゾヤマセミ

Range: Resident in Hokkaido. Recorded from the Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), Kurile Is. (RB: Kunashirito I., Shikotanto I.).

Habitat: Rivers, mountain lakes, streams.

北海道 (RB), 南千島 (RB: 国後島, 色丹島).

山地の溪流, 湖沼, 河川中流部に生息する.

385-2. *Megaceryle lugubris lugubris* (Temminck, 1834) ヤマセミ

Range: Resident in Honshu, Shikoku, and Kyushu south to Yakushima I.

Status: Honshu (RB), Sado (FB), Oki (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Rivers, mountain lakes, streams.

本州 (RB), 佐渡 (FB), 隠岐 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 沖縄島 (AV).

山地の溪流, 湖沼, 河川中流部に生息する.

Family MEROPIDAE ハチクイ科**MEROPS Linnaeus ハチクイ属****386. *Merops ornatus* Latham, 1802 ハチクイ**

Hachikui Rainbow Bee-eater

Range: Australasian. Breeds in Australia. Sedentary, but also winters to the Solomon Is., New Guinea, and Lesser Sunda Is.; straggles to Japan.

Status: Miyakojima I. (AV: Jul. 1904). No reliable records over the last 50 years.

宮古島 (AV: 1904 年 7 月). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

Family CORACIIDAE ブッポウソウ科

EURYSTOMUS Vieillot ブッポウソウ属

387. *Eurystomus orientalis* (Linnaeus, 1766) ブッポウソウ

Bupposo Oriental Dollarbird

Range: Asiatic and Australasian. Breeds from India and Sri Lanka east to China and se Asia, north to Manchuria, Amur Basin, Sakhalin, and Japan, and from the Malay Peninsula and Philippines to Australia, Bismarck Arch., and Feni I. (Solomon Is.). Northern birds migratory, wintering to tropical regions south to Indonesia.

387-1. *Eurystomus orientalis calonyx* Sharpe, 1890 ブッポウソウ

Range: Breeds from the Himalayas east through Assam and China to Manchuria, Amur Basin, Korea, and Japan. Winters to India, se Asia, and Sumatra.

Status: Hokkaido (IV), Rishirito I. (IV), Yagishirito I. (IV), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Miyakejima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iheyajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Ikemajima I., Iriomotejima I., Haterumajima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Low montane forests, open woodland, tall trees in precincts of temples and shrines.

北海道 (IV), 利尻島 (IV), 焼尻島 (IV), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 三宅島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 伊平屋島, 栗国島, 宮古島, 池間島, 西表島, 波照間島, 与那国島), 南大東島 (AV).

低山帯の森林, 神社や寺の境内林などに生息する。

Order PICIFORMES キツツキ目

Family PICIDAE キツツキ科

JYNX Linnaeus アリスイ属

388. *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 アリスイ

Arisui Eurasian Wryneck

Range: Palearctic. Breeds from the s British Isles, w Europe and nw Africa east through s Siberia to the Okhotsk coast, Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and n Japan, south to the Caucasus, n Iran, n Mongolia, Manchuria, and Korea; also Himalayas and w China. Northern birds migratory, wintering to tropical Africa and s Asia.

388-1. *Jynx torquilla chinensis* Hesse, 1911 シベリアアリスイ

Range: Breeds in s Siberia from the Enisei to Transbaikalia, Okhotsk coast, Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland, south to ne Korea, n Mongolia, and w China. Winters to India, Assam, and se Asia.

Status: S Kurile Is. (AV: Etorofuto I.). No reliable records over the last 50 years.

南千島 (AV: 択捉島). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

388-2. *Jynx torquilla japonica* (Bonaparte, 1850) アリスイ

Range: Breeds in Japan from Hokkaido and s Kurile Is. to n Honshu. Winters to s Japan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Shikotanto I.), n Honshu (MB: Aomori, Akita. CB: Iwate), c and sw Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Goto Is. (IV), Tanegashima I. (IV), Izu Is. (WV: Oshima I., Shikinejima I., Kozushima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open forests, forest edge, grasslands, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 色丹島), 本州北部 (MB: 青森, 秋田. CB: 岩手), 本州中・南西部 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (IV), 舩倉島

(PV), 隠岐 (WV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 五島列島 (IV), 種子島 (IV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 式根島, 神津島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).

開けた森林, 林縁, 草原, 農耕地に生息する.

DENDROCOPOS Koch アカゲラ属

389. *Dendrocopos hyperythrus* (Vigors, 1831) チャバラアカゲラ

Chabara-akagera Rufous-bellied Woodpecker

Range: E and c Indomalayan. Breeds from ne Pakistan through n India and Nepal, east to se Tibet and sw China (Sichuan, Yunnan), south to Bangladesh, c Myanmar, nw and e Thailand, Cambodia and s Vietnam. Also Manchuria and Ussuriland. Winters to s China.

389-1. *Dendrocopos hyperythrus subrufinus* (Cabanis & Heine, 1863) チャバラアカゲラ

Range: Breeds in Manchuria and Ussuriland. Winters to s China.

Status: Hokkaido (AV: Oshima-Oshima I., May 1993), Honshu (AV: Niigata, May 2007), Hegurajima I. (AV: May 2005).

北海道 (AV: 渡島大島, 1993 年 5 月), 本州 (AV: 新潟, 2007 年 5 月), 舩倉島 (AV: 2005 年 5 月).

390. *Dendrocopos kizuki* (Temminck, 1836) コゲラ

Ko-gera Japanese Pygmy Woodpecker

Range: E Palearctic. Breeds from Ussuriland and Sakhalin southward to sw Manchuria, Hopeh in n China, and Japan from Hokkaido and s Kurile Is. to the Ryukyu Is. Sedentary.

390-1. *Dendrocopos kizuki seebohmi* (Hargitt, 1884) エゾコゲラ

Range: Resident in Ussuriland, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is., possibly also se Manchuria and ne Korea.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Deciduous broad-leaved and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

針広混交林, 落葉広葉樹林に生息する.

390-2. *Dendrocopos kizuki nippon* (Kuroda, 1922) コゲラ

Range: Resident in n and c Honshu.

Status: N and c Honshu (RB), Sado (AV). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous and evergreen broad-leaved forests, mixed forests, open woodlands, near human habitations.

本州北・中部 (RB), 佐渡 (AV). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, また住宅地近くにも生息する.

390-3. *Dendrocopos kizuki matsudairai* (Kuroda, 1921) ミヤケコゲラ

Range: Resident on the Izu Is. and Yakushima I.

Status: Yakushima I. (RB), Izu Is. (RB: Oshima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I.). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous and mixed forests, near human habitations.

屋久島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

常緑広葉樹林, 住宅地近くにも生息する.

390-4. *Dendrocopos kizuki shikokuensis* (Kuroda, 1922) シコクコゲラ

Range: Resident in w Honshu and Shikoku.

Status: W Honshu (RB), Shikoku (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous broad-leaved and evergreen forests, mixed forests, open woodland, near human habitations.

本州西部 (RB), 四国 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, 住宅地近くにも生息する.

390-5. *Dendrocopos kizuki kotataki* (Kuroda, 1922) ツシマコゲラ

Range: Resident on Oki and Tsushima.

Status: Oki (RB), Tsushima (RB).

Habitat: Deciduous broad-leaved and mixed forests, near human habitations.

隠岐 (RB), 対馬 (RB).

針広混交林, 落葉広葉樹林, 住宅地近くに生息する.

390-6. *Dendrocopos kizuki kizuki* (Temminck, 1836) キュウシュウコゲ

ラ

Range: Resident in Kyushu.

Status: Kyushu (RB).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, cultivated land, near human habitations.

九州 (RB).

常緑広葉樹林, 疎林, 住宅地近くに生息する.

390-7. *Dendrocopos kizuki amamii* (Kuroda, 1922) アマミコゲラ

Range: Resident on the Amami Is.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Ukeshima I., Yoroshima I., Tokunoshima I.).

Habitat: Forests, near human habitations.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 請島, 与路島, 徳之島).

常緑広葉樹林, 疎林, 住宅地近くに生息する.

390-8. *Dendrocopos kizuki nigrescens* (Seebohm, 1887) リュウキュウコゲラ

Range: Resident on the Okinawa Is.

Status: Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Yagajishima I.).

Habitat: Forests, near human habitations.

沖縄諸島 (RB: 沖縄島, 屋我地島).

常緑広葉樹林, 住宅地近くに生息する.

390-9. *Dendrocopos kizuki orii* (Kuroda, 1923) オリイコゲラ

Range: Resident on Iriomotejima I.

Status: Yaeyama Is. (RB: Iriomotejima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

八重山諸島 (RB: 西表島).

常緑広葉樹林に生息する.

390-U. *Dendrocopos kizuki* ssp. 亜種不明

Status: Hegurajima I. (AV), Tanegashima I. (RB).

舩倉島 (AV), 種子島 (RB).

391. *Dendrocopos minor* (Linnaeus, 1758) コアカゲラ

Ko-aka-gera Lesser Spotted Woodpecker

Range: Palearctic and marginally Afrotropical. Breeds from the British Isles and Europe east across s Siberia to the Okhotsk coast, Amur Basin, Sakhalin, and Hokkaido, south to nw Africa, Asia Minor, Caspian region, n Mongolia, and n Korea; also Kamchatka. Sedentary.

391-1. *Dendrocopos minor amurensis* (Buturlin, 1909) コアカゲラ

Range: Resident from the Amur Basin south to Ussuriland, Manchuria, and n Korea; also Sakhalin and Hokkaido.

Status: Hokkaido (RB), Rishirito I. (IV), s Kurile Is. (IV: Shikotanto I.), Tobishima I. (AV).

Habitat: Deciduous broad-leaved and mixed forests.

北海道 (RB: 主に東部), 利尻島 (IV), 南千島 (IV: 色丹島), 飛島 (AV). 落葉広葉樹林, 針広混交林に生息する.

392. *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802) オオアカゲラ

O-aka-gera White-backed Woodpecker

Range: Palearctic and marginally Indomalayan. Breeds from Scandinavia and c Europe east across s Siberia to the Okhotsk coast, Sakhalin, and Japan, south to Asia Minor, Caspian region, Mongolia, and Manchuria; also Kamchatka, se China (Fujian) and Taiwan. Sedentary.

392-1. *Dendrocopos leucotos subcirris* (Stejneger, 1886) エゾオオアカゲラ

Range: Resident in Hokkaido and s Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), Rishirito I. (IV), s Kurile Is. (RB: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.).

Habitat: Deciduous, mixed and coniferous forests.

北海道 (RB), 利尻島 (IV), 南千島 (RB: 択捉島, 国後島, 色丹島). 落葉広葉樹林, 針広混交林, 針葉樹林に生息する.

392-2. *Dendrocopos leucotos stejnegeri* (Kuroda, 1921) オオアカゲラ

Range: Resident in n and c Honshu and Sado.

Status: N and c Honshu (RB), Sado (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous and mixed forests.

本州北・中部 (RB), 佐渡 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため, 検討が必要である.

落葉広葉樹林，針広混交林に生息する。

392-3. *Dendrocopos leucotos namiyei* (Stejneger, 1886) ナミエオオアカゲラ

Range: Resident in c and sw Honshu, Oki, Shikoku, and Kyushu.

Status: C and sw Honshu (RB), Oki (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous and evergreen broad-leaved forests, mixed forests.

本州中・南西部 (RB)，隠岐 (RB)，四国 (RB)，九州 (RB)。本亜種の分布域は明確ではないため，検討が必要である。

針広混交林，落葉広葉樹林，常緑広葉樹林に生息する。

392-4. *Dendrocopos leucotos owstoni* (Ogawa, 1905) オーストンオオアカゲラ

Range: Resident on Amami-Oshima I.

Status: Amami-Oshima I. (RB).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

奄美大島 (RB).

常緑広葉樹林に生息する。

392-U. *Dendrocopos leucotos* ssp. 亜種不明

Status: Hegurajima I. (AV).

舢倉島 (AV).

393. *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) アカゲラ

Aka-gera Great Spotted Woodpecker

Range: Palearctic and marginally Afrotropical and Indomalayan. Breeds from the British Isles. and w Europe across s Siberia to the Okhotsk coast and Kamchatka, Sakhalin, Kurile Is., and Japan, south to the s Caspian Sea in the west, Canarias Is., Morocco, Tunisia and N Algeria in Africa and s China and n Indochina in Asia. Mainly sedentary.

393-1. *Dendrocopos major brevirostris* (Reichenbach, 1854) ハシブトアカゲラ

Range: Breeds in s Siberia from the Urals and Altai to Transbaikalia, n Mongolia, n Manchuria, Amur Basin, and Okhotsk coast. Mainly sedentary.

Status: Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV: Mar. 1978).

舢倉島 (PV)，見島 (AV, 1978 年 3 月).

393-2. *Dendrocopos major japonicus* (Seeböhm, 1883) エゾアカゲラ

Range: Resident in s Manchuria, ne and c Korea, Hokkaido, and s Kurile Is. from Urup I. to Kunashirito I.

Status: Hokkaido (RB), Rishirito I. (RB), s Kurile Is. (RB: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.).

Habitat: Forests, woodlands, open woods, near human habitations.

北海道 (RB), 利尻島 (RB), 南千島 (RB: 択捉島, 国後島, 色丹島).

落葉広葉樹林, 針葉樹林, 針広混交林, また住宅地近くにも生息する.

393-3. *Dendrocopos major hondoensis* (Kuroda, 1921) アカゲラ

Range: Resident in Honshu, Tsushima, and c and s Korea.

Status: Honshu (RB), Awashima I. (IV), Sado (RB), Oki (IV), Tsushima (RB), Izu Is. (IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima), Kyushu (AV: Oita).

Habitat: Forests, woodlands, open woods, near human habitations.

本州 (RB), 粟島 (IV), 佐渡 (RB), 隠岐 (IV), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (IV: 三宅島, 八丈島), 四国 (IV: 香川, 徳島), 九州 (AV: 大分).

落葉広葉樹林, 針広混交林に生息する.

PICOIDES Lacépède ミユビゲラ属**394. *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) ミユビゲラ**

Miyubi-gera Eurasian Three-toed Woodpecker

Range: Holarctic. Breeds from Scandinavia and c Europe east across the Siberian forests to Anadyrland and Kamchatka, south to the Altai, w China, n Mongolia, n Korea, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido; also North America from Alaska to the c and nw US. Sedentary.

394-1. *Picoides tridactylus inouyei* Yamashina, 1943 ミユビゲラ

Range: Resident in Hokkaido.

Status: Hokkaido (RB).

Habitat: Evergreen coniferous and mixed forests.

北海道 (RB).

常緑針葉樹林, 針広混交林に生息する.

DRYOCOPUS Boie クマゲラ属**395. *Dryocopus javensis* (Horsfield, 1821) キタタキ**

Kitataki White-bellied Woodpecker

Range: Asiatic. Breeds from w India eastward through n and se Myanmar to Indochina, Malay Peninsula, and Philippines, north to Yunnan and Szechwan in w China, c Korea, and Tsushima in Japan. Sedentary.

395-1. *Dryocopus javensis richardsi* Tristram, 1879 キタタキ

Range: Resident in c Korea and Tsushima.

Status: Tsushima (FB). Last record was in 1920. Extinct.

Habitat: Forests.

対馬 (FB). 1920 年の記録を最後に絶滅.

森林に生息していた.

396. *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) クマゲラ

Kuma-gera Black Woodpecker

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia and c Europe across Eurasia to Anadyrland and Kamchatka, south to the Altai, w China, Ussuriland to c Korea, Sakhalin, and n Japan. Sedentary.

396-1. *Dryocopus martius martius* (Linnaeus, 1758) クマゲラ

Range: Range of the species except w China.

Status: Hokkaido (RB), Rishirito I. (RB), s Kurile Is. (RB: Kunashirito I.), n Honshu (RB: Aomori, Akita. CB: Yamagata. AV: Iwate, Niigata, Tochigi).

Habitat: Dense coniferous, mixed and deciduous forests.

北海道 (RB), 利尻島 (RB), 南千島 (RB: 国後島), 本州北部 (RB: 青森, 秋田. CB: 山形. AV: 岩手, 新潟, 栃木).

針葉樹林, 針広混交林, 落葉広葉樹林に生息する.

PICUS Linnaeus アオゲラ属**397. *Picus awokera* Temminck, 1836 アオゲラ**

Ao-gera Japanese Green Woodpecker

Range: E Palearctic. Endemic to Japan from Honshu to Yakushima I. and Tanegashima I. Sedentary.

397-1. *Picus awokera awokera* Temminck, 1836 アオゲラ

Range: Resident in Honshu.

Status: Honshu (RB), Tobishima I. (IV), Awashima I. (IV), Sado (IV), Oki (IV).

Habitat: Deciduous, evergreen and mixed forests, occasionally city areas in winter.

本州 (RB), 飛島 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 隠岐 (IV).

森林に生息するが, 住宅地などにも出現する.

397-2. *Picus awokera horii* Taka-Tsukasa, 1918 カゴシマアオゲラ

Range: Resident in Shikoku and Kyushu.

Status: Shikoku (RB), Kyushu (RB).

Habitat: Deciduous and evergreen forests.

四国 (RB), 九州 (RB).

森林に生息する.

397-3. *Picus awokera takatsukasae* Kuroda, 1921 タネアオゲラ

Range: Resident on Yakushima I. and Tanegashima I.

Status: Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB).

Habitat: Evergreen forests.

屋久島 (RB), 種子島 (RB).

森林に生息する.

398. *Picus canus* Gmelin, 1788 ヤマゲラ

Yama-gera Grey-headed Woodpecker

Range: Palearctic and Indomalayan. Breeds from w Europe and s Scandinavia east through s Siberia to the Okhotsk coast, Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido, and from the Himalayas to China, se Asia, and Sumatra. Sedentary.

398-1. *Picus canus jessoensis* Stejneger, 1886 ヤマゲラ

Range: Resident from the Amur Basin and Manchuria eastward to Korea, Ussuriland, Sakhalin, and Hokkaido.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (AV: Shikotanto I.), n Honshu (AV: Aomori, Tochigi, Niigata).

Habitat: Deciduous, coniferous and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (AV: 色丹島), 本州北部 (AV: 青森, 栃木, 新潟).

落葉広葉樹林, 針広混交林, 針葉樹林に生息する.

SAPHEOPIPO Hargitt ノグチゲラ属

399. *Sapheopipo noguchii* (Seebohm, 1887) ノグチゲラ

Noguchi-gera Okinawa Woodpecker

Range: E Palearctic. Endemic to n Okinawajima I. Sedentary.

Status: N Okinawajima I. (RB).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, forest edge.

沖縄島北部 (RB).

常緑広葉樹林, 林縁に生息する.

Order FALCONIFORMES ハヤブサ目

Family FALCONIDAE ハヤブサ科

FALCO Linnaeus ハヤブサ属

400. *Falco naumanni* Fleischer, 1818 ヒメチョウゲンボウ

Hime-chogembo Lesser Kestrel

Range: Palearctic. Breeds in s Europe and nw Africa east through Asia Minor to the Caucasus, Iran, Kazakhstan, nw China, and Mongolia. Winters to Africa, India, and Myanmar; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Niigata, Fukushima, Aichi, Oct. 1983), Tsushima (AV: Apr. 1977), Iriomotejima I. (AV: Mar. 1984), Yonagunijima I. (AV: Jul. 1999).

本州 (AV: 新潟, 福島, 愛知, 1983 年 10 月), 対馬 (AV: 1977 年 4 月), 西表島 (AV: 1984 年 3 月), 与那国島 (AV: 1999 年 7 月).

401. *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 チョウゲンボウ

Chogembo Common Kestrel

Range: Eurasian and Afrotropical. Breeds in temperate Eurasia from Europe to the Amur Basin and Okhotsk coast, south to India, n Myanmar, s China, Korea, Japan, Madeira I., Canary Is., Cape Verde Is., and Socotra I.; also Arabian

Peninsula and Africa except the Sahara. Northern birds migratory, wintering to temperate and tropical regions.

401-1. *Falco tinnunculus interstinctus* McClelland, 1840 チョウゲンボウ

Range: Breeds in the Himalayas, China north probably to c Manchuria, Korea, and Japan, south to n Myanmar and n Borneo. Migratory and sedentary, wintering south to India, Malay Peninsula, s China, and Philippines.

Status: Hokkaido (IV, RB: c Hokkaido), s Kurile Is. (IV: Shikotanto I.), n and c Honshu (RB), sw Honshu (RB: Kyoto. CB: Osaka. WV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Toshima I., Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Izenajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Tonakijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (WV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open country, cultivated fields, coastal areas, rivers.

北海道 (IV, RB: 中部), 南千島 (IV: 色丹島), 本州北・中部 (RB), 本州南西部 (RB: 京都. CB: 大阪. WV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 利島, 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 伊平屋島, 伊是名島, 久米島, 渡嘉敷島, 渡名喜島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 黒島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (WV: 北大東島, 南大東島).

崖に近い農耕地, 草原などに生息する.

402. *Falco amurensis* Radde, 1863 アカアシチョウゲンボウ

Aka-ashi-chogembo Amur Falcon

Range: E Palearctic. Breeds from Transbaikalia to the Amur Basin, south to nw China, Manchuria, Ussuriland, and n Korea. Winters to e and s Africa from Kenya to Zaire and Cape Province; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Ibaraki, Chiba, Saitama, Aichi, Ishikawa, Fukui, Shiga,

Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (IV), Tanegashima I. (AV), Izu Is. (AV: Kozushima I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Okinoerabujima I.), Ryukyu Is. (AV: Agunijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Cultivated fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 茨城, 千葉, 埼玉, 愛知, 石川, 福井, 滋賀, 兵庫, 島根, 広島, 山口), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 鹿児島), 対馬 (IV), 種子島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 神津島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 沖永良部島), 琉球諸島 (AV: 粟国島, 西表島, 与那国島).

農耕地に生息する.

403. *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 コチョウゲンボウ

Ko-chogembo Merlin

Range: Holarctic. Breeds in Iceland, British Isles, Scandinavia, and Siberia east to Koryakland, south to the Altai, Sayans, Transbaikalia, Okhotsk coast, and Sakhalin; also Alaska and Canada to the n US.

403-1. *Falco columbarius insignis* (Clark, 1907) コチョウゲンボウ

Range: Breeds in e Siberia from the Enisei River to the Kolyma, south to the Stanovoi Range. Winters to n Indonesia, China, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Tokara Is. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Woodlands, coastal sand dunes, sea cliffs.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), トカラ列島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖繩島, 渡嘉敷島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

平野部の森林, 海岸の砂丘や崖のある環境に生息する.

403-2. *Falco columbarius pacificus* (Stegmann, 1929) ヒガシコチョウゲ

ンボウ

Range: Breeds in Russian Far East from the upper Omolon through s Anadyrland to Koryakland, south to the Okhotsk coast, Shantar Is., and Sakhalin. Winters to China; casual in Japan.

Status: N Honshu (AV). No reliable records over the last 50 years.

本州北部 (AV). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

404. *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 チゴハヤブサ

Chigo-hayabusa Eurasian Hobby

Range: Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds in temperate Eurasia from w Europe to the Okhotsk coast, Kamchatka, and n Japan, south to Asia Minor, Caucasus, Iran, n India, n Myanmar, and n Indochina; also nw Africa. Migratory and sedentary, wintering to tropical region.

404-1. *Falco subbuteo subbuteo* Linnaeus, 1758 チゴハヤブサ

Range: Range of the species except s China to n Myanmar and n Indochina. Winters to s Africa, India, se Asia, and Java.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Etorofuto I., Kunashirito I.), n Honshu (RB. MB. CB: Niigata), c and sw Honshu (CB: Nagano. PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Mukojima I., Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (PV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Kumejima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Woodlands, forest edges, cultivated fields, occasionally cliffs.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 択捉島, 国後島), 本州北部 (RB. MB. CB: 新潟), 本州中・南西部 (CB: 長野. PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 小笠原群島 (AV: 聳島, 父島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (PV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 久米島, 渡嘉敷島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

林縁部, 農耕地, 草原などに生息する.

405. *Falco cherrug* Gray, 1834 ワキスジハヤブサ

Wakisuji-hayabusa Saker Falcon

Range: W and c Palearctic. Breeds from c Europe to s Transbaikalia, south to

Tibetan Plateau. Partially migratory to ne Africa and sw Asia.

405-U. *Falco cherrug* ssp. 亜種不明

Status: Miyakojima I. (AV: Jan. 2008).

宮古島 (AV: 2008 年 1 月).

406. *Falco rusticolus* Linnaeus, 1758 シロハヤブサ

Shiro-hayabusa Gyr Falcon

Range: N Holarctic. Breeds from Iceland, Scandinavia east across arctic Eurasia to Anadyrland, Kamchatka, and Commander Is.; also from Alaska to n Canada and Greenland. Mainly sedentary, but erratic and frequently wandering to warmer regions.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Gunma, Nagano, Shimane), Kyushu (AV: Saga, Miyazaki), Tsushima (AV).

Habitat: Coastal areas, river beds, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 群馬, 長野, 島根), 九州 (AV: 佐賀, 宮崎), 対馬 (AV).

海岸, 河川敷, 農耕地に生息する.

407. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 ハヤブサ

Hayabusa Peregrine Falcon

Range: Cosmopolitan. All over the world except forested areas in the tropics, desert areas, New Zealand, and Antarctica. Migratory and sedentary, northern birds wintering to temperate regions.

407-1. *Falco peregrinus japonensis* Gmelin, 1788 ハヤブサ

Range: Breeds in ne Siberia from the Lena River to Anadyrland and Chukot Peninsula, Kamchatka, Sakhalin, Kurile Is., Japan, and s Korea. Winters to Sakhalin, China, Korea and Japan, occasionally to Taiwan, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (MB), Oki (WV), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB. WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Toshima I., Shikinejima I., Nijima I., Miyakejima I., Hachijojima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (WV: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Amami Is. (WV: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is.

(WV: Okinawajima I., Agunijima I., Izenajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Rocky coasts, coastal areas, marshes, open fields.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (MB), 隠岐 (WV), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB. WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 利島, 式根島, 新島, 三宅島, 八丈島, 鳥島), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (WV: 北硫黄島, 硫黄島), 奄美諸島 (WV: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 粟国島, 伊是名島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

海岸の崖などに繁殖し, 海岸, 湖沼, 農耕地などに生息する.

407-2. *Falco peregrinus pealei* Ridgway, 1874 オオハヤブサ

Range: Breeds from the n Kurile Is. and Commander Is. east to the Aleutian Is., w coast of Alaska, and Canada south to Queen Charlotte Is. Winters occasionally south to Japan and w US.

Status: Hokkaido (AV: Hakodate, Akkeshi), s Kurile Is. (AV), Honshu (AV: Miyagi, Dec. 2005, Niigata), Kyushu (AV: Miyazaki, Mar. 2009, Kagoshima), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Ishigakijima I. (AV).

北海道 (AV: 函館, 厚岸), 南千島 (AV), 本州 (AV: 宮城, 2005 年 12 月, 新潟), 九州 (AV: 宮崎, 2009 年 3 月, 鹿児島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 石垣島 (AV).

407-3. *Falco peregrinus furuitii* Momiyama, 1927 シマハヤブサ

Range: Breeds on the Iwo Is. Sedentary.

Status: Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., Iwoto I.). No records on Kita-Iwoto I. and Iwoto I. since 1937 and 1891, respectively. Record in Izu Is. (6th ed.) was removed because of lack of evidence. Extinct.

Habitat: Rocky coasts, islands.

硫黄列島 (FB: 北硫黄島, 硫黄島). 北硫黄島, 硫黄島ではそれぞれ 1937 年, 1891 年を最後に記録がない. 6 版では伊豆諸島鳥島で IV とされたが, 根拠となる 1956 年 3 月の標本は若鳥の翼と尾羽, 足のみで, シマハヤブサと判定する十分な証拠とは言い難いため削除した. 絶滅.

島に生息する.

407-4. *Falco peregrinus anatum* Bonaparte, 1838 アメリカハヤブサ

Range: Breeds in North America south of tundra to n Mexico, except nw Pacific Coast.

Status: Honshu (AV: Shizuoka, Feb. 1992).

本州 (AV: 静岡, 1992 年 2 月).

Order PASSERIFORMES スズメ目

Family PITTIDAE ヤイロチョウ科

PITTA Vieillot ヤイロチョウ属

408. *Pitta sordida* (Müller, 1776) ズグロヤイロチョウ

Zuguro-yairocho Hooded Pitta

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds from the Himalayas and nw India east through se Asia to the Philippines, Greater Sunda Is., Borneo, and New Guinea. Northern birds migratory, wintering in tropical regions.

408-1. *Pitta sordida cucullata* Hartlaub, 1843 ズグロヤイロチョウ

Range: Breeds from the Himalayas and nw India to Indonesia, north to se Yunnan. Winters to the Malay Peninsula, Sumatra, and Java; straggles to the Ryukyu Is. (Ishigakijima I.).

Status: Ishigakijima I. (AV: Jun. 1984).

石垣島 (AV: 1984 年 6 月). 1 例の記録がある.

409. *Pitta nympha* Temminck & Schlegel, 1850 ヤイロチョウ

Yairocho Fairy Pitta

Range: Temperate and tropical Asiatic. Breeds from the Himalayas and n India east to Vietnam, Malay Peninsula, and Sumatra, north through s China to e China, Korea, sw Japan and Taiwan. Northern birds migratory, wintering in tropical regions. Recorded on migration and in winter from s China, Indochina, and Borneo.

Status: Hokkaido (AV), n Honshu (IV: Akita, Yamagata, Niigata), c and sw Honshu (IV. MB: Yamanashi, Nagano, Mie, Nara, Okayama, Shimane, Hiro-

shima), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (CB), Yakushima I. (PV), Tokara Is. (PV), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Deciduous and evergreen forests along or near streams.

北海道 (AV), 本州北部 (IV: 秋田, 山形, 新潟), 本州中・南西部 (IV: MB: 山梨, 長野, 三重, 奈良, 岡山, 島根, 広島), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (CB), 屋久島 (PV), トカラ列島 (PV), 沖縄島 (AV).

溪流沿いの落葉広葉樹林や常緑広葉樹林に生息する.

Family ARTAMIDAE モリツバメ科

ARTAMUS Vieillot モリツバメ属

410. *Artamus leucorhynchus* (Linnaeus, 1771) モリツバメ

Mori-tsubame White-breasted Woodswallow

Range: Indomalayan and Australasian. Breeds in Philippines, Palau Is., Andaman Is., and Indonesia from Sumatra eastward through Sunda Is., to Borneo, and islands from Sulawesi through Moluccas Is. to New Guinea, and New Caledonia, Fiji, and Australia. Sedentary.

410-1. *Artamus leucorhynchus leucorhynchus* (Linnaeus, 1771) モリツバメ

Range: Breeds in Philippines, Borneo and Natuna Is.

Status: Honshu (AV: Shimane, Apr. 2000), Mishima I. (AV: Apr. 1999), Iriomotejima I. (AV: Apr. 1973, Mar. 1986).

本州 (AV: 島根, 2000 年 4 月), 見島 (AV: 1999 年 4 月), 西表島 (AV: 1973 年 4 月, 1986 年 3 月).

Family CAMPEPHAGIDAE サンショウクイ科

CORACINA Vieillot アサクラサンショウクイ属

411. *Coracina melaschistos* (Hodgson, 1836) アサクラサンショウクイ

Asakura-sanshokui Black-winged Cuckoo-shrike

Range: E Asiatic. Breeds from the Himalayas east through Assam and n

Myanmar to n Thailand, n Indochina, Hainan, and mainland China north to n Hopeh. Migratory and sedentary, northern birds wintering to Myanmar, se Asia, and s China.

411-1. *Coracina melaschistos intermedia* (Hume, 1877) アサクラサンショウクイ

Range: Breeds in e China from Hopeh and Shensi south to Kwangtung. Winters to Myanmar, Thailand, and Indochina; accidental in Taiwan and Japan.

Status: Honshu (AV: Ishikawa, Nov. 2009), Hegurajima I. (AV: Nov. 2009), Kyushu (AV: Miyazaki, Jan. 1971, Mar. 2006), Tokara Is. (AV: Nakanoshima I., Oct. 1998), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Jan. 2006, Kumejima I., Apr. 2008, Ishigakijima I., Nov. 2009, Iriomotejima I., Mar. 1975).

本州 (AV: 石川, 2009 年 11 月), 舩倉島 (AV: 2009 年 11 月), 九州 (AV: 宮崎, 1971 年 1 月, 2006 年 3 月), トカラ列島 (AV: 中之島, 1998 年 10 月), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 粟国島, 2006 年 1 月, 久米島, 2008 年 4 月, 石垣島, 2009 年 11 月, 西表島, 1975 年 3 月).

PERICROCOTUS Boie サンショウクイ属

412. *Pericrocotus divaricatus* (Raffles, 1822) サンショウクイ

Sanshokui Ashy Minivet

Range: E Palearctic. Breeds from the lower Amur Basin to Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Mainly migratory, wintering to se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and Borneo.

412-1. *Pericrocotus divaricatus divaricatus* (Raffles, 1822) サンショウクイ

Range: Range of the species except the Amami Is. and Ryukyu Is. Recorded from Taiwan and Pescadore Is.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (AV: Kunashirito I.), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (AV), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (PV), Okinawa Is. (PV), Yaeyama Is. (PV).

Habitat: Deciduous and evergreen forests, open woodlands, near human habitations.

北海道 (IV), 南千島 (AV: 国後島), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (PV),

舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (AV), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (PV), 沖縄諸島 (PV), 八重山諸島 (PV).

落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, 農耕地, 住宅地周辺にも生息する.

412-2. *Pericrocotus divaricatus tegimae* Stejneger, 1887 リュウキュウサンショウクイ

Range: Resident on Shikoku, Kyushu, Amami Is. and Ryukyu Is., south to Iriomotejima I. Have recorded from Yakushima I., Tanegashima I., Korea, and Taiwan.

Status: Honshu (IV: Nara, Hiroshima), Shikoku (IV: Kagawa, RB: Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki. RB: Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB. PV: Miyakojima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV).

Habitat: Evergreen forests, open woodlands.

本州 (IV: 奈良, 広島), 四国 (IV: 香川, RB: 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎. RB: 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB. PV: 宮古島, 与那国島), 大東諸島 (AV).

常緑広葉樹林に生息する.

Family ORIOLIDAE コウライウグイス科

ORIOLUS Linnaeus コウライウグイス属

413. *Oriolus chinensis* Linnaeus, 1766 コウライウグイス

Korai-uguisu Black-naped Oriole

Range: E Indomalayan and e Palearctic. Breeds from s China and n Indochina to se Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Korea; also Taiwan, Hainan, Philippines, Borneo, Nicobar Is., Andaman Is., Greater and Lesser Sunda Is., Sulu Is., and Sulawesi. Northern birds migratory, wintering in tropical Asia from India to Indochina and Malay Peninsula.

413-1. *Oriolus chinensis diffusus* Sharpe, 1877 コウライウグイス

Range: Range of the species except Philippines, Nicobar Is., Andaman Is., and islands of Indonesia.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Iwate, Yamagata, Niigata, Tokyo, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi. CB: Saitama), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (AV: Tairajima I.), Sakishima Is. (AV: Ikemajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 岩手, 山形, 新潟, 東京, 山梨, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口. CB: 埼玉), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (AV: 香川, 徳島, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (AV: 平島), 先島諸島 (AV: 池間島, 西表島, 与那国島).

疎林, 農耕地に生息する.

Family DICRURIDAE オウチュウ科

DICRURUS Vieillot オウチュウ属

414. *Dicrurus macrocercus* Vieillot, 1817 オウチュウ

Ochu Black Drongo

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from se Iran eastward through India and mainland Indochina east to e and ne China; also Sri Lanka, Java, Bali, and Taiwan. Mainly sedentary.

414-U. *Dicrurus macrocercus* ssp. 亜種不明

Status: Rishirito I. (AV: May 2000), Honshu (AV: Aomori, Gunma, Saitama, Chiba, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Mie, Shimane), Sado (AV: May 2009), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Kyushu (IV: Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

利尻島 (AV: 2000 年 5 月), 本州 (AV: 青森, 群馬, 埼玉, 千葉, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 三重, 島根), 佐渡 (AV: 2009 年 5 月), 粟島 (AV),

舩倉島 (IV), 見島 (IV), 九州 (IV: 長崎, 大分, 熊本, 宮崎), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

疎林, 農耕地に生息する.

415. *Dicrurus leucophaeus* Vieillot, 1817 ハイイロオウチュウ

Haiiro-ochu Ashy Drongo

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from e Afghanistan eastward to Himalayas and Indochina, Malay Peninsula, Sumatra, Borneo, Java, Bali, Lombok, Palawan, east to e China, and north to n China: also Sipora I., Simeuluë I., s Mentawi Is., and Hainan. Sedentary and migratory. Northern birds wintering to s India, Sri Lanka, se Asia, s China, and Hainan.

415-1. *Dicrurus leucophaeus leucogenis* (Walden, 1870) ハイイロオウチュウ

Range: Breeds in e and c China from Liaoning south across n Kansu and Szechwan to ne Kwangtung. Winters to s China and Indochina.

Status: Honshu (AV: Shizuoka, Nov. 2002, Aichi, Oct. 2010, Osaka, Oct. 2011), Shikoku (AV: Ehime, Oct. 2009), Kyushu (AV: Nagasaki, May 2010, Kumamoto, Oct. 1997 - Jan. 1998, Miyazaki, Oct. 2005), Tsushima (AV: May 2011), Tokara Is. (IV: Tairajima I., May 2006, May 2011), Amami-Oshima I. (AV: Nov. 2002), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Zamamijima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

本州 (AV: 静岡, 2002 年 11 月, 愛知, 2010 年 10 月, 大阪, 2011 年 10 月), 四国 (AV: 愛媛, 2009 年 10 月), 九州 (AV: 長崎, 2010 年 5 月, 熊本, 1997 年 10 月 - 1998 年 1 月, 宮崎, 2005 年 10 月), 対馬 (AV: 2011 年 5 月), トカラ列島 (IV: 平島, 2006 年 5 月, 2011 年 5 月), 奄美大島 (AV: 2002 年 11 月), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 座間味島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

疎林, 農耕地に生息する.

416. *Dicrurus hottentottus* (Linnaeus, 1766) カンムリオウチュウ

Kammuri-ochu Hair-crested Drongo

Range: Indomalayan and n Australasian. Breeds from India eastward across Myanmar and Indochina to c and s China; also Greater Sunda Is., Borneo, Philippines, Sulawesi, and Moluccas. Sedentary and partly migratory.

416-1. *Dicrurus hottentottus brevirostris* (Cabanis, 1851) カンムリオウ
チュウ

Range: Breeds in c and e China, n Myanmar, n Laos, and n and c Vietnam.
Migratory. Winters to Indochina and Myanmar.

Status: Hegurajima I. (AV: May 2008, May 2010), Tokara Is. (AV: May 2006),
Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Oct. 2004, Kumejima I., May 2000, Yona-
gunijima I., Apr. 2000, Apr. 2001).

舩倉島 (AV: 2008 年 5 月, 2010 年 5 月), トカラ列島 (AV: 2006 年 5 月),
琉球諸島 (AV: 沖縄島, 2004 年 10 月, 久米島, 2000 年 5 月, 与那国島,
2000 年 4 月, 2001 年 4 月).

Family MONARCHIDAE カササギヒタキ科

HYPOTHYMIS Boie クロエリヒタキ属

417. *Hypothymis azurea* (Boddaert, 1783) クロエリヒタキ

Kuroeri-hitaki Black-naped Monarch

Range: Indomalayan and se Palearctic. Breeds in much of India (except n and
nw), Sri Lanka, Nepal, Indochina, Indonesia, Philippines, s China, and Taiwan.
Mainly sedentary.

417-U. *Hypothymis azurea* ssp. 亜種不明

Status: Yonagunijima I. (AV: Apr. 2008).

与那国島 (AV: 2008 年 4 月).

TERPSIPHONE Gloger サンコウチョウ属

418. *Terpsiphone atrocaudata* (Eyton, 1839) サンコウチョウ

Sankocho Japanese Paradise Flycatcher

Range: E Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds in Japan from Honshu
south to s Ryukyu Is., Korea, Lu Tao I. and Lan Yu I. off Taiwan, and Batan Is.
north of Luzon. Recorded from Taiwan. Japanese birds migratory, wintering in
tropical Asia.

418-1. *Terpsiphone atrocaudata atrocaudata* (Eyton, 1839) サンコウチョウ

ウ

Range: Breeds in Japan from Honshu to Kyushu, Tsushima, and Yakushima I., and also Korea. Winters to se Asia, Malay Peninsula, se China, and occasionally Sumatra. Recorded from Ussuriland; casual in Hokkaido.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Higurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Iki (MB), Goto Is. (MB), Danjo Is. (IV), Yakushima I. (MB), Izu Is. (IV: Niiijima I., Hachijojima I.).

Habitat: Deciduous or evergreen woods, as well as shady afforested areas.

北海道 (AV), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 壱岐 (MB), 五島列島 (MB), 男女群島 (IV), 屋久島 (MB), 伊豆諸島 (IV: 新島, 八丈島).

低山帯の落葉広葉樹林や常緑広葉樹林に繁殖する.

418-2. *Terpsiphone atrocaudata illex* Bangs, 1901 リュウキュウサンコウチョウ

Range: Breeds from Amami Is. to s Ryukyu Is. Winters possibly to se Asia, se China, and Taiwan.

Status: Tokara Is. (MB), Amami Is. (MB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (MB: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Izenajima I., Iejima I., Zamamijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Kuroshima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.). Birds of unidentified subspecies were recorded on Minami-Daitojima I.

Habitat: Evergreen woods, mangrove.

トカラ列島 (MB), 奄美諸島 (MB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (MB: 沖縄島, 粟国島, 伊平屋島, 伊是名島, 伊江島, 座間味島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 黒島, 与那国島, 波照間島). 南大東島では亜種不明の個体が記録されている.

常緑広葉樹林に生息する.

Family LANIIDAE モズ科

LANIUS Linnaeus モズ属

419. *Lanius tigrinus* Drapiez, 1828 チゴモズ

Chigo-mozu Tiger Shrike

Range: E Palearctic. Breeds in Manchuria, Ussuriland, Korea, n and c Japan, and e China south to the Yangtze Basin and west to Szechwan. Winters to the Malay Peninsula and Greater Sunda Is.

Status: Hokkaido (AV), Yagishirito I. (AV), n and c Honshu (MB), sw Honshu (PV. CB: Hiroshima, Okayama, Tottori), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Tokara Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed woods, open woodlands.

北海道 (AV), 焼尻島 (AV), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (PV. CB: 広島, 岡山, 鳥取), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), トカラ列島 (IV), 琉球諸島 (IV).

低地の広葉樹林, 混交林, 灌木林に生息する.

420. *Lanius bucephalus* Temminck & Schlegel, 1845 モズ

Mozu Bull-headed Shrike

Range: E Palearctic. Breeds in e China from s Manchuria to Hopeh and Shantung, s Ussuriland, Korea, and Japan, occasionally s Sakhalin; also sw Gansu in n China. Partially migratory, wintering in s Korea, Japan, and e China.

420-1. *Lanius bucephalus bucephalus* Temminck & Schlegel, 1845 モズ

Range: Range of the species except Gansu in China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (WV), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (FB), Tokara Is. (RB), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (RB).

Habitat: Deciduous and mixed woods, forest edges, clearings, open country.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (WV), 壱

岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (FB), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (RB).

低地の疎な広葉樹林, 混交林, 林縁, 農耕地, 灌木草原, 住宅地などに生息する.

421. *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758 アカモズ

Aka-mozu Brown Shrike

Range: E Asiatic. Breeds from the Altai east to Anadyrland and Kamchatka, south to w and s China, Korea, Ussuriland, and Japan. Winters to India, se Asia, s China, Philippines, and Lesser Sunda Is. to Moluccas.

421-1. *Lanius cristatus lucionensis* Linnaeus, 1766 シマアカモズ

Range: Breeds in Korea, sw Japan, and China from s Manchuria west to Shensi and Szechwan, south to the Yangtze Basin and locally in Kwangtung. Winters to se Asia, Malay Peninsula, Philippines, Sumatra, Borneo, and Moluccas.

Status: Honshu (IV: Yamagata, Ishikawa, Wakayama, Yamaguchi), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Kyushu (IV: Saga, Oita, Miyazaki. MB: Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (PV, WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (PV, WV).

Habitat: Cultivated lands, edges of woods, dry grasslands.

本州 (IV: 山形, 石川, 和歌山, 山口), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 九州 (IV: 佐賀, 大分, 宮崎. MB: 熊本, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (PV, WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (PV, WV).

農耕地, 林縁に生息する. 渡りの時期には草原にも生息する.

421-2. *Lanius cristatus superciliosus* Latham, 1802 アカモズ

Range: Breeds in Sakhalin and n Japan. Winters to s China, Hainan, Indochina, Malay Peninsula, and Sunda Is.

Status: Hokkaido (MB), n and c Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), sw Honshu (PV. CB: Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV. CB: Oita), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Okinawajima I. (WV), Yaeyama Is. (WV).

Habitat: Open woods, forest edge, clearings, cultivated fields.

北海道 (MB), 本州北・中部 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 本州南西部 (PV. CB: 京都, 兵庫, 鳥取, 島根), 見島 (PV), 四国 (PV),

九州 (PV. CB: 大分), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 沖縄島 (WV), 八重山諸島 (WV).

開けた林, 木が疎生する草原, 林縁に生息する. 北海道, 本州北部では低地にも生息する.

422. *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 セアカモズ

Seaka-mozu Red-backed Shrike

Range: W and c Palearctic. Breeds from w Europa to wc Siberia. Winters in s Africa.

422-1. *Lanius collurio pallidifrons* Johansen, 1952 セアカモズ

Range: Breeds in w and wc Siberia. Winters in s and e Africa.

Status: Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa), Kyushu (AV: Miyazaki, Feb. 2002), Yonagunijima I. (AV).

舢倉島 (AV), 四国 (AV: 香川), 九州 (AV: 宮崎, 2002 年 2 月), 与那国島 (AV).

423. *Lanius isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 モウコアカモズ

Moko-akamozu Isabelline Shrike

Range: Sc Palearctic. Breeds from n Iran, Transbaikalia to Mongolia (except nw), se Russia and n China. Winters in India, Pakistan, Arabia and ne Africa.

423-U. *Lanius isabellinus* ssp. 亜種不明

Status: Hegurajima I. (AV: May 2008), Kyushu (AV: Miyazaki, Jan. 2005), Okinawajima I. (AV: Feb. - Apr. 2003).

舢倉島 (AV: 2008 年 5 月), 九州 (AV: 宮崎, 2005 年 1 月), 沖縄島 (AV: 2003 年 2 - 4 月).

424. *Lanius schach* Linnaeus, 1758 タカサゴモズ

Takasago-mozu Long-tailed Shrike

Range: Indomalayan and Australasian, marginally Palearctic. Breeds from e Iran and Turkestan east across India and Sri Lanka to se Asia, s China, Taiwan, Philippines, Sunda Is., and New Guinea. Mainly sedentary, northern birds wintering in warmer areas and plains.

424-1. *Lanius schach schach* Linnaeus, 1758 タカサゴモズ

Range: Breeds in Taiwan, Hainan, and s China north to the Yangtze Basin and

Shensi, west to Szechwan and south to n Indochina. Winters in plains; accidental in Japan.

Status: Honshu (AV: Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Osaka, Yamaguchi), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV: Tairajima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

本州 (AV: 神奈川, 静岡, 愛知, 大阪, 山口), 見島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV: 平島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

425. *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 オオモズ

O-mozu Great Grey Shrike

Range: Holarctic, partly Indomalayan. Breeds in n Eurasia from Europe to the Chukot Peninsula and c Asia, south to Arabia and India; also n Africa and n North America. Migratory and sedentary, wintering south to ne Africa, temperate Asia, and s North America.

425-1. *Lanius excubitor mollis* Eversmann, 1853 シベリアオオモズ

Range: Breeds in the Altai, Sayans, and nw Mongolia. Winters occasionally to n China (Hopeh); straggles to Japan.

Status: Honshu (AV: Tochigi, 1927), Kyushu (AV: 1899). No reliable records over the last 50 years.

本州 (AV: 栃木, 1927 年), 九州 (AV: 1899 年). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

425-2. *Lanius excubitor bianchii* Hartert, 1907 オオモズ

Range: Breeds in Sakhalin and the s Kurile Is. Winters south to Hokkaido.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (IV), Awashima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Mishima I. (IV), Kyushu (IV).

Habitat: Sparse woodlands, open country, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 見島 (IV), 九州 (IV).

疎林, 農耕地などに生息する.

426. *Lanius sphenocercus* Cabanis, 1873 オオカラモズ

O-kara-mozu Chinese Great-grey Shrike

Range: E Palearctic. Breeds from e Tian Shan and e Tsinghai eastward to Manchuria, s Ussuriland, and n Korea, south to s Szechwan. Migratory and sedentary, wintering to se China and Korea.

426-1. *Lanius sphenocercus sphenocercus* Cabanis, 1873 オオカラモズ

Range: Range of the species except e Tsinghai to s Szechwan. Winters occasionally to Fukien and Kwangtung; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Niigata, Gunma, Yamanashi, Aichi, Ishikawa, Shiga, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 新潟, 群馬, 山梨, 愛知, 石川, 滋賀, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV), 対馬 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 西表島, 与那国島).

Family CORVIDAE カラス科

GARRULUS Brisson カケス属

427. *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) カケス

Kakesu Eurasian Jay

Range: Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from w Europe and nw Africa east to the lower Amur Basin, Ussuriland, and Sakhalin, south to Iran, Altai, n Mongolia, China south to Kwangtung, Korea, Japan, and Taiwan; also Himalayas to n Myanmar and w China. Sedentary; but northern birds frequently nomadic.

427-1. *Garrulus glandarius brandtii* Eversmann, 1842 ミヤマカケス

Range: Resident in s Siberia from the Urals to Transbaikalia and the lower Amur Basin, south to the Altai, n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Deciduous and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

落葉広葉樹林や針広混交林に生息する。

427-2. *Garrulus glandarius japonicus* Temminck & Schlegel, 1847 カケス

Range: Resident in Honshu, Shikoku, Kyushu, Tsushima, and Izu Is. (Oshima I.).

Status: Honshu (RB), Awashima I. (IV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (RB: Oshima I.).

Habitat: Deciduous and mixed forests, open woodlands, suburban areas.

本州 (RB), 粟島 (IV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島)。

落葉広葉樹林, 針広混交林に生息し, 冬には暖地へ移動するものもある。

427-3. *Garrulus glandarius tokugawae* Taka-Tsukasa, 1931 サドカケス

Range: Resident on Sado.

Status: Sado (RB).

Habitat: Deciduous and mixed forests.

佐渡 (RB).

落葉広葉樹林や針広混交林に生息する。

427-4. *Garrulus glandarius orii* Kuroda, 1923 ヤクシマカケス

Range: Resident on Yakushima I.

Status: Yakushima I. (RB). Population size is not large.

Habitat: Deciduous and mixed forests.

屋久島 (RB). 生息数は多くない。

山地の落葉樹林, ヤクスギ林に生息する。

428. *Garrulus lidthi* Bonaparte, 1850 ルリカケス

Ruri-kakesu Lidth's Jay

Range: E Palearctic. Endemic to Amami Is.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Ukeshima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, shady woods around cultivated fields, near human habitation.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 請島)。

常緑広葉樹林, リュウキュウマツ林, 人家周辺などに生息する。

CYANOPICA Bonaparte オナガ属

429. *Cyanopica cyanus* (Pallas, 1776) オナガ

Onaga Azure-winged Magpie

Range: E Palearctic. Breeds from n Mongolia and Transbaikalia to Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan, south to w and c China to Yangtze Basin and Szechwan. Sedentary.

429-1. *Cyanopica cyanus japonica* Parrot, 1905 オナガ

Range: Resident in Honshu and Kyushu. (but probably exterminated in sw Honshu and Kyushu and the southern limit of the present range is about Gifu and Aichi prefs.).

Status: N and c Honshu (RB), sw Honshu (FB: Hyogo, Shimane. AV: Shiga, Osaka), Shikoku (AV: Kagawa), Kyushu (FB: Fukuoka, Saga, Miyazaki). No recent records in Kyushu.

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, residential areas.

本州北・中部 (RB), 本州南西部 (FB: 兵庫, 島根. AV: 滋賀, 大阪), 四国 (AV: 香川), 九州 (FB: 福岡, 佐賀, 宮崎). 最近の九州での記録はない.

低地の疎林, 農耕地, 住宅地などに生息する.

PICA Brisson カササギ属

430. *Pica pica* (Linnaeus, 1758) カササギ

Kasasagi Eurasian Magpie

Range: Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from w Europe and nw Africa to Transbaikalia and Amur Basin, and with a gap in distribution, in Anadyrland and Kamchatka, south to s Arabia, c Asia, Himalayas, China to n Indochina, and Taiwan; casual in Japan. Sedentary.

430-1. *Pica pica serica* Gould, 1845 カササギ

Range: Breeds in Amur Basin, Ussuriland, Korea, Kyushu in Japan, China south to Kwangsi, Szechwan and Yunnan, Hainan, Taiwan, and n Indochina. Sedentary.

Status: Hokkaido (CB), Honshu (CB: Niigata, Nagano, Tokyo, Hyogo, Hiroshima. IV: Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Gunma, Toyama, Chiba, Fukui, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Osaka, Shimane, Yamaguchi), Awashima I. (IV),

Sado (IV), Shikoku (CB: Ehime. IV: Kagawa), Kyushu (IB: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto. IV: Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (CB), Danjo Is. (IV). Records outside Kyushu region might also include introduced birds.

Habitat: Cultivated lands, village areas.

北海道 (CB), 本州 (CB: 新潟, 長野, 東京, 兵庫, 広島. IV: 青森, 秋田, 岩手, 山形, 群馬, 富山, 千葉, 福井, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 大阪, 島根, 山口), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 四国 (CB: 愛媛. IV: 香川), 九州 (IB: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本. IV: 宮崎, 鹿児島), 対馬 (CB), 男女群島 (IV). 九州の集団以外は自然分布としたが, 移入分布の可能性もある.

平地の低木林, 農耕地などに生息する.

NUCIFRAGA Brisson ホシガラス属

431. *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) ホシガラス

Hoshi-garasu Spotted Nutcracker

Range: Palearctic. Breeds from n and c Europe east across Siberia to Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to the Alps, Altai, Himalayas to Assam, w China, Manchuria, Sakhalin, n Korea, Japan, and Taiwan. Mainly sedentary, but northern birds are nomadic and winter to warmer areas.

431-1. *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos* Brehm, 1823 ハシナガホシガラス

Range: Breeds in Siberia from the Urals to Anadyrland and Kamchatka, south to the Altai, n Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, and n Kurile Is. Occasionally winters to Europe, Transcaspia, n China (Hopeh), and Korea; straggles to Japan.

Status: Kyushu (AV: Fukuoka, Feb. 1923). No reliable records over the last 50 years.

九州 (AV: 福岡, 1923 年 2 月). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

431-2. *Nucifraga caryocatactes japonica* Hartert, 1897 ホシガラス

Range: Resident in Japan from s Kurile Is. (Urup I. and southward) south to Honshu and Shikoku. Recorded from Kyushu and Izu Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Sado (IV), Hegurajima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB: Kumamoto, Oita, Miyazaki), Izu Is.

(IV: Oshima I.).

Habitat: Coniferous forests, subalpine deciduous and mixed woods.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (IV), 舩倉島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB: 熊本, 大分, 宮崎), 伊豆諸島 (IV: 大島).

高山のハイマツ林, 常緑針葉樹林, 針広混交林などに生息し, 冬期には一部低地へ移動する.

CORVUS Linnaeus カラス属

432. *Corvus monedula* Linnaeus, 1758 ニシコクマルガラス

Nishi-kokumaru-garasu Western Jackdaw

Range: Palearctic. Breeds from e Europe to Lake Baikal; also w China and Kashmir.

432-U. *Corvus monedula* ssp. 亜種不明

Status: Hokkaido (AV: Kiritappu, Dec. 1996), Teurito I. (AV: Apr. 1986), Kyushu (AV: Kumamoto, Nov. 2010).

北海道 (AV: 霧多布, 1996 年 12 月), 天売島 (AV: 1986 年 4 月), 九州 (AV: 熊本, 2010 年 11 月).

433. *Corvus dauuricus* Pallas, 1776 コクマルガラス

Kokumaru-garasu Daurian Jackdaw

Range: E Palearctic. Breeds in s Siberia from about the Kansk region and the upper Lena to n Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland, south to Szechwan and Yunnan. Winters to e China south to Fukien and Korea, occasionally to Russian Turkestan, Japan, and Taiwan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Cultivated fields.

北海道 (IV), 本州 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島).

農耕地などに生息する.

434. *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 ミヤマガラス

Miyama-garasu Rook

Range: Palearctic. Breeds from the British Isles, France and s Scandinavia east through s Siberia and c Asia to Amur Basin and Ussuriland, south to the Alps, Balkans, Iran, Turkestan, Mongolia, and China to Yangtze Basin and Szechwan. Winters to warmer regions and south to n Africa, nw India, se China, s Korea, Japan and Taiwan.

434-1. *Corvus frugilegus pastinator* Gould, 1845 ミヤマガラス

Range: Eastern part of the species range from the Altai and Enisei River eastward.

Status: Hokkaido (WV), Honshu (WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Shikoku (IV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Goto Is. (WV), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV).

Habitat: Cultivated fields.

北海道 (WV), 本州 (WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 四国 (IV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 五島列島 (WV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 伊平屋島, 宮古島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV).

農耕地に生息する.

435. *Corvus corone* Linnaeus, 1758 ハシボソガラス

Hashiboso-garasu Carrion Crow

Range: Palearctic. Breeds in w Europe and from Iran east across c Asia to Okhotsk coast, n and c China, Kamchatka, Korea, and Japan. Mainly sedentary.

435-1. *Corvus corone orientalis* Eversmann, 1841 ハシボソガラス

Range: Breeds from Iran east across c Asia to Okhotsk coast, n and c China, Kamchatka, Korea, and Japan. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (IV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, residential areas.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (IV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV).

疎林, 農耕地, 村落, 住宅地などに生息する.

436. *Corvus macrorhynchos* Wagler, 1827 ハシブトガラス

Hashibuto-garasu Large-billed Crow

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from Afghanistan eastward through the Himalayas, India and Sri Lanka to Indochina, s China, Malay Peninsula, Philippines, and Sunda Is., north through s Tibet and e China to Korea, Manchuria, Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin, and Japan; also Taiwan and Hainan. Sedentary.

436-1. *Corvus macrorhynchos mandshuricus* Buturlin, 1913 チョウセンハシブトガラス

Range: Resident in Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Sakhalin, Korea, and Tsushima. Sedentary.

Status: Tsushima (RB).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, residential areas.

対馬 (RB).

疎林, 農耕地, 住宅地などに生息する.

436-2. *Corvus macrorhynchos japonensis* Bonaparte, 1850 ハシブトガラス

Range: Resident in Sakhalin, c Kurile Is. (Urup I.), Japan from s Kurile Is. to Kyushu, Yakushima I., and Tanegashima I.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (RB), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (FB: Mukojima I., Nakodojima I., Chichijima I.), Daito Is. (FB).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, sea coasts, residential areas.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (FB: 賀島, 媒島, 父島), 大東諸島 (FB).

市街地, 住宅地, 海辺, 山地, 農耕地などに生息する.

436-3. *Corvus macrorhynchos connectens* Stresemann, 1916 リュウキュウハシブトガラス

Range: Resident on Amami Is. and Ryukyu Is. to Miyakojima I.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Kikaijima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Izenajima I., Zamamijima I., Kumejima I., Miyakojima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, sea coasts, residential areas.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 粟国島, 伊平屋島, 伊是名島, 座間味島, 久米島, 宮古島).

市街地, 海辺, 農耕地, 住宅地などに生息する.

436-4. *Corvus macrorhynchos osai* Ogawa, 1905 オサハシブトガラス

Range: Resident on Yaeyama Is. (except Yonagunijima I.).

Status: Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Aragusukujima I., Haterumajima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, sea coasts, residential areas.

八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島, 竹富島, 小浜島, 黒島, 新城島, 波照間島).

住宅地, 海辺, 農耕地などに生息する.

437. *Corvus corax* Linnaeus, 1758 ワタリガラス

Watari-garasu Northern Raven

Range: Holarctic, marginally Neotropical. Breeds from Europe and n Africa east across Eurasia to Chukot Peninsula and Kamchatka, south to Asia Minor, c Asia, Himalayas, Tibet, w China, n Mongolia, n Manchuria, Amur Basin, Sakhalin, and Kurile Is.; also Greenland and North America south to Nicaragua. Mainly sedentary.

437-1. *Corvus corax kamtschaticus* Dybowski, 1883 ワタリガラス

Range: Breeds in Siberia from Enisei River and Lake Baikal to Okhotsk coast, Anadyrland, Kamchatka, and Commander Is., south to n Mongolia, nw Manchuria, Amur Basin, Sakhalin, and Kurile Is. Winters south to n China (Hopeh) and n Hokkaido.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (RB), Honshu (AV: Akita, Mar. 2002,

Oct. 2003, Niigata, Nov. 1993, Hyogo, Dec. 1990).

Habitat: Barren seacoasts.

北海道 (WV), 南千島 (RB), 本州 (AV: 秋田, 2002 年 3 月, 2003 年 10 月, 新潟, 1993 年 11 月, 兵庫, 1990 年 12 月).

荒れ地や海岸の岩礁地に生息し, 内陸にも飛来する.

Family REGULIDAE キクイタダキ科

REGULUS Cuvier キクイタダキ属

438. *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) キクイタダキ

Kiku-itadaki Goldcrest

Range: Palearctic. Breeds from the Atlantic islands to Ural east through Japan; also Asia Minor, Iran, and Himalayas to w China. Migratory and sedentary, wintering to warmer regions.

438-1. *Regulus regulus japonensis* Blakiston, 1862 キクイタダキ

Range: Breeds in the Amur Basin, n Manchuria, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, and Japan from the s Kurile Is. to c Honshu. Migratory and sedentary, Japanese birds wintering mainly in Japan. Recorded from the Ryukyu Is., Quelpart I., and Taiwan.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), n and c Honshu (RB), sw Honshu (WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (RB: Ehime. WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV: Oshima I., Nijima I., Kozushima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (WV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Breeds in coniferous and mixed forests, subalpine birch forests. Lowland coniferous forests in winter.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州北・中部 (RB), 本州南西部 (WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (RB: 愛媛. WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 新島, 神津島, 八丈島), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV), 南大東島 (AV).

本州以北の亜高山針葉樹林, 針広混交林で繁殖し, 冬季は平地や低山

の針葉樹林に生息する.

Family REMIZIDAE ツリスガラ科

REMIZ Jarocki ツリスガラ属

439. *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) ツリスガラ

Tsurisu-gara Eurasian Penduline Tit

Range: S Palearctic. Breeds from s and c Europe east through Caucasus and c Asia to Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, and n Manchuria, south to n China (Hopeh). Migratory and sedentary, northern birds wintering to Iraq, Iran, nw India, Turkestan, e China south to Yangtze Basin, and sw Japan.

439-1. *Remiz pendulinus consobrinus* (Swinhoe, 1870) ツリスガラ

Range: Breeds from the middle Amur Basin to n Manchuria, Inner Mongolia, and Hopeh. Migratory and sedentary, wintering to China south to Yangtze Basin, Korea, and sw Japan, occasionally reaching Yunnan.

Status: N Honshu (IV: Aomori, Yamagata, Niigata), c and sw Honshu (WV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV: Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi), Kyushu (WV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Reed beds, marshes.

本州北部 (IV: 青森, 山形, 新潟), 本州中・南西部 (WV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (PV), 四国 (WV: 徳島, 香川, 愛媛, 高知), 九州 (WV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV).

ヨシ原に生息する.

Family PARIDAE シジュウカラ科

POECILE Kaup コガラ属

440. *Poecile palustris* (Linnaeus, 1758) ハシブトガラ

Hashibuto-gara Marsh Tit

Range: Palearctic. Two widely separated populations in w and e Palearctic. Breeds from w Europe east to the Urals, Asia Minor, and Caucasus and, with a wide gap in w and c Asia, from the Altai east through s Siberia and n Mongolia to Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is., south to Szechwan and Yunnan. Sedentary.

440-1. *Poecile palustris hensoni* (Stejneger, 1892) ハシブトガラ

Range: Resident in Hokkaido and s Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Deciduous and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

低地の落葉広葉樹林, 針広混交林に生息する.

441. *Poecile montanus* (Conrad von Baldenstein, 1827) コガラ

Ko-gara Willow Tit

Range: Palearctic. Breeds from w Europe east across Siberia to Okhotsk coast, Anadyrland, Kamchatka, and Sakhalin, south to the Alps, Altai, n Mongolia, China from Manchuria to Sikang and n Yunnan, and Japan. Sedentary.

441-1. *Poecile montanus sachalinensis* (Lönnberg, 1908) カラフトコガラ

Range: Breeds in Sakhalin. Sedentary, but probably partially migratory, occasionally recorded from Hokkaido, Honshu, and Korea.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Niigata). No reliable records over the last 50 years.

北海道 (AV), 本州 (AV: 新潟). 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

441-2. *Poecile montanus restrictus* (Hellmayr, 1900) コガラ

Range: Resident in Japan from Hokkaido to Kyushu.

Status: Hokkaido (RB), Honshu (RB), Tobishima I. (IV), Awashima I. (IV), Sado (RB), Oki (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB: Kumamoto, Miyazaki, Ka-

goshima).

Habitat: Mountain mixed and coniferous forests.

北海道 (RB), 本州 (RB), 飛島 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (RB), 隠岐 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB: 熊本, 宮崎, 鹿児島).

山地の針広混交林や常緑針葉樹林に生息する.

442. *Poecile varius* (Temminck & Schlegel, 1845) ヤマガラ

Yama-gara Varied Tit

Range: E Palearctic. Breeds in Japan from s Kurile Is. to s Ryukyu Is., ne China, Korea, Quelpart I., Dagelet I., and Taiwan. Sedentary.

442-1. *Poecile varius varius* (Temminck & Schlegel, 1845) ヤマガラ

Range: Breeds from s Kurile Is. to Kyushu, ne China, Korea, Quelpart I., and Dagelet I. Sedentary, occasionally wandering to Izu Is., Sakhalin.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (RB: Oshima I. AV: Miyakejima I.).

Habitat: Deciduous, mixed and evergreen broad-leaved forests.

北海道 (RB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (RB: 大島. AV: 三宅島).

主として暖温帯広葉樹林を好むが, 混交林にも生息する.

442-2. *Poecile varius namiyei* (Kuroda, 1918) ナミエヤマガラ

Range: Resident on n Izu Is.

Status: Izu Is. (RB: Nijima I., Kozushima I. FB: Toshima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

伊豆諸島 (RB: 新島, 神津島. FB: 利島).

常緑広葉樹林に生息する.

442-3. *Poecile varius owstoni* (Ijima, 1893) オーストンヤマガラ

Range: Resident on s Izu Is. from Miyakejima I. to Hachijojima I.

Status: S Izu Is. (RB: Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved woods.

伊豆諸島南部 (RB: 三宅島, 御蔵島, 八丈島).

常緑広葉樹林に生息する.

442-4. *Poecile varius orii* (Kuroda, 1923) ダイトウヤマガラ

Range: Resident on Daito Is.

Status: Daito Is. (FB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.). Extinct.

大東諸島 (FB: 北大東島, 南大東島). 絶滅.

442-5. *Poecile varius sunsunpi* (Kuroda, 1919) タネヤマガラ

Range: Resident on Tanegashima I.

Status: Tanegashima I. (RB).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

種子島 (RB).

常緑広葉樹林に生息する.

442-6. *Poecile varius yakushimensis* (Kuroda, 1919) ヤクシマヤマガラ

Range: Resident on Yakushima I.; straggles to Amami-Oshima I.

Status: Yakushima I. (RB), Amami-Oshima I. (AV).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

屋久島 (RB), 奄美大島 (AV).

常緑広葉樹林に生息する.

442-7. *Poecile varius amamii* (Kuroda, 1922) アマミヤマガラ

Range: Resident from Amami-Oshima I. to Okinawajima I.

Status: Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Okinawajima I. (RB).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 徳之島), 沖縄島 (RB).

常緑広葉樹林に生息する.

442-8. *Poecile varius olivaceus* (Kuroda, 1923) オリイヤマガラ

Range: Resident on Yaeyama Is.

Status: Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島).

山地の常緑広葉樹林に生息する.

PERIPARUS Selys-Longchamps ヒガラ属**443. *Periparus ater* (Linnaeus, 1758) ヒガラ**

Hi-gara Coal Tit

Range: Palearctic. Breeds from w Europe and nw Africa east across Eurasia to Okhotsk coast, Amur Basin, Sakhalin, and Kamchatka, south to Asia Minor, Caucasus, Iran, Tian Shan, China to the Yangtze Basin, Taiwan, Korea, and Japan; also Himalayas to n Myanmar, Szechwan, and mountains in Fukien and Anhwei. Mainly sedentary.

443-1. *Periparus ater insularis* (Hellmayr, 1902) ヒガラ

Range: Breeds in Japan from s Kurile Is. to Kyushu, Tsushima, Yakushima I., and Quelpart I. in Korea; casual in Izu Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (IV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (AV), Shikoku (RB), Kyushu (RB: Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (RB), Yakushima I. (RB), Izu Is. (AV: Oshima I., Shikinejima I.).

Habitat: Coniferous and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (IV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (AV), 四国 (RB), 九州 (RB: 熊本, 大分, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (RB), 屋久島 (RB), 伊豆諸島 (AV: 大島, 式根島).

常緑針葉樹林, 針広混交林に生息する.

444. *Periparus venustulus* (Swinhoe, 1870) キバラガラ

Kibara-gara Yellow-bellied Tit

Range: E Palearctic. Breeds from c Szechwan east to ne Hopeh, Hubei, Anhwei, Hunan and Jiangxi, south to ne Yunnan and nw Kwangsi. Some wintering in coastal areas from Jiangsu south to Kwangtung.

Status: Hegurajima I. (AV: Apr. 2010), Kyushu (AV: Fukuoka, Dec. 2009).

舩倉島 (AV: 2010 年 4 月), 九州 (AV: 福岡, 2009 年 12 月).

PARUS Linnaeus シジュウカラ属**445. *Parus minor* Temminck & Schlegel, 1848 シジュウカラ**

Shiju-kara Japanese Tit

Range: E Palearctic. Breeds from s Tibet, through nc and ne China, far east

Russia, Sakhalin, Korea, and Japan, south to n se Asia. Mainly sedentary.

445-1. *Parus minor minor* Temminck & Schlegel, 1848 シジユウカラ

Range: Resident in the middle Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, and Japan, south to the Yangtze Basin and Szechwan in China.

Status: Hokkaido (RB), Honshu (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Izu Is. (RB).

Habitat: Deciduous, mixed and coniferous forests, forest edge.

北海道 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 伊豆諸島 (RB).

針広混交林, 落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林などに生息する.

445-2. *Parus minor amamiensis* Kleinschmidt, 1922 アマミシジユウカラ

Range: Resident on Amami Is.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I. AV: Okinoerabujima I., Feb. 1986).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 徳之島. AV: 沖永良部島, 1986 年 2 月). 常緑広葉樹林に生息する.

445-3. *Parus minor okinawae* Hartert, 1905 オキナワシジユウカラ

Range: Resident on Okinawa Is.

Status: Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Zamamijima I., Yagajishima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests on mountain region, light woods on suburban area.

沖縄諸島 (RB: 沖縄島, 座間味島, 屋我地島).

常緑広葉樹林に生息する.

445-4. *Parus minor nigriloris* Hellmayr, 1900 イシガキシジユウカラ

Range: Resident on Yaeyama Is.

Status: Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島).

常緑広葉樹林に生息する.

445-U. *Parus minor* ssp. 亜種不明

Status: Tokara Is. (AV: Tairajima I., Nov. 2005).

トカラ列島 (AV: 平島, 2005 年 11 月).

CYANISTES Kaup ルリガラ属

446. *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770) ルリガラ

Ruri-gara Azure Tit

Range: Palearctic. Breeds from s Russia east through s Siberia to Lake Baikal, n Manchuria, and Ussuriland, south to Turkestan, n Mongolia, and locally Tsinghai. Mainly sedentary.

446-1. *Cyanistes cyanus tianschanicus* Menzbier, 1884 ルリガラ

Range: Breeds from se Kazakhstan through Xinjiang, Mongolia, Transbaikalia, c China, east to ne China. Mainly sedentary.

Status: Rishirito I. (AV: Nov. 1987).

利尻島 (AV: 1987 年 11 月).

Family PANURIDAE ヒゲガラ科

PANURUS Koch ヒゲガラ属

447. *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758) ヒゲガラ

Higegara Bearded Reedling

Range: S Palearctic. Breeds in w Europe eastward through Asia Minor and c Asia to Mongolia, Transbaikalia, Manchuria, and Ussuriland. Mainly sedentary, but winters in warmer areas and occasionally to e China (Hopeh) and Japan.

447-1. *Panurus biarmicus russicus* (Brehm, 1831) ヒゲガラ

Range: Range of the species except ec Europe to the Balkans.

Status: Honshu (AV: Yamagata, Oct. 1920, Niigata, Nov. 1969, Oct. 1991, Chiba, Nov. 1994, Tokyo, Sep. 1991, Shimane, Nov. 1999).

本州 (AV: 山形, 1920 年 10 月, 新潟, 1969 年 11 月, 1991 年 10 月, 千葉, 1994 年 11 月, 東京, 1991 年 9 月, 島根, 1999 年 11 月).

Family ALAUDIDAE ヒバリ科

MELANOCORYPHA Boie コウテンシ属

448. *Melanocorypha bimaculata* (Ménétriés, 1832) クビワコウテンシ

Kubiwa-kotenshi Bimaculated Lark

Range: C Palearctic. Breeds from Asia Minor and Lebanon eastward to Afghanistan and Russian Turkestan, north to the Kirghiz Steppes and Zaisan Nor. Winters to ne Africa, Arabia, Pakistan, and nw India.

448-1. *Melanocorypha bimaculata torquata* Blyth, 1847 クビワコウテンシ

Range: Breeds in Transcaspia, e Iran, Afghanistan, and Russian Turkestan. Winters to s Afghanistan, Pakistan, and ne India; straggles to Japan.

Status: Honshu (AV: Aichi), Kyushu (AV: Oita, Nov. 2009), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Yonagunijima I.).

本州 (AV: 愛知), 九州 (AV: 大分, 2009 年 11 月), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 与那国島).

449. *Melanocorypha mongolica* (Pallas, 1776) コウテンシ

Kotenshi Mongolian Lark

Range: E Palearctic. Breeds in Mongolia, ne China, and s Russia. Northern population winters in south part.

Status: Teurito I. (AV: May 2005), Tobishima I. (AV: Nov. 2011), Zamamijima I. (AV: Mar. 2012).

天売島 (AV: 2005 年 5 月), 飛島 (AV: 2011 年 11 月), 座間味島 (AV: 2012 年 3 月).

CALANDRELLA Kaup ヒメコウテンシ属

450. *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) ヒメコウテンシ

Hime-kotenshi Greater Short-toed Lark

Range: S Palearctic and Afrotropical. Breeds from s Europe eastward through w and c Asia to Mongolia and Manchuria; also Arabia and non-forested regions of n Africa. Eurasian birds winter to Africa, Afghanistan, and India to e China.

450-1. *Calandrella brachydactyla longipennis* (Eversmann, 1848) ヒメコウテンシ

Range: Breeds from the Ukraine, n Caucasus, Iran to Transbaikalia and Manchuria. Winters mainly to Afghanistan, Pakistan, and nw India; casual in Sakhalin, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Yamagata, Miyagi, Niigata, Nagano, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Wakayama, Osaka, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Sado (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Tokushima), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Danjo Is. (AV), Izu Is. (AV: Torishima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 山形, 宮城, 新潟, 長野, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 和歌山, 大阪, 岡山, 島根, 山口), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 香川, 徳島), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), 男女群島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 鳥島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV).

451. *Calandrella cheleensis* (Swinhoe, 1871) コヒバリ

Ko-hibari Asian Short-toed Lark

Range: C and e Palearctic. Breeds from Russian Turkestan to Mongolia, Transbaikalia, and Manchuria. Sedentary and migratory, Manchurian birds wintering to n China.

451-1. *Calandrella cheleensis cheleensis* (Swinhoe, 1871) コヒバリ

Range: Breeds in ne Mongolia, Transbaikalia, and Manchuria. Winters to s Manchuria and n China; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Aomori, Akita, Yamagata, Fukushima, Niigata, Toyama, Ibaraki, Chiba, Saitama, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Sado (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kagawa), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Oita, Kagoshima), Tsushima (AV), Amami-Oshima I. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 青森, 秋田, 山形, 福島, 新潟, 富山, 茨城,

千葉, 埼玉, 東京, 静岡, 愛知, 石川, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 岡山, 島根, 山口), 舩倉島 (AV), 佐渡 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 香川), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 大分, 鹿児島), 対馬 (AV), 奄美大島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV).

ALAUDA Linnaeus ヒバリ属

452. *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 ヒバリ

Hibari Eurasian Skylark

Range: Palearctic. Breeds from Europe and nw Africa eastward across Eurasia to the Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to Iran, Russian Turkestan, n China, Korea, and Japan. Mainly migratory, e Asian birds wintering to s China.

452-1. *Alauda arvensis pekinensis* Swinhoe, 1863 オオヒバリ

Range: Breeds in ne Siberia from the middle Lena to the lower Kolyma, Okhotsk coast, Kamchatka, and Kurile Is. Winters to the lower Amur Basin, s Manchuria to Shantung, Ussuriland, Korea, s Sakhalin, and Japan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV), Kyushu (WV, IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Cultivated fields, barren and sandy places with scattered short grasses, other arid areas in open country.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (IV), 九州 (WV, IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 沖縄島 (IV).

農耕地, 草原, 湿原, 砂浜に生息する.

452-2. *Alauda arvensis lonnbergi* Hachisuka, 1926 カラフトチュウヒバリ

Range: Breeds in Sakhalin, Shantar Is., and possibly the lower Amur Basin. Winters to e China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (IV), Shikoku (IV), Kyushu (WV, IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.).

Habitat: Cultivated fields, barren and sandy places with scattered short grasses, other arid areas in open country.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (IV), 四国 (IV), 九州 (WV, IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島).

農耕地，草原，湿原に生息する．

452-3. *Alauda arvensis japonica* Temminck & Schlegel, 1848 ヒバリ

Range: Breeds in s Sakhalin Is., resident in Japan from Hokkaido to Kyushu. Recorded from the s Kurile Is.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (WV), Goto Is. (RB), Yakushima I. (IV), Tanegashima I. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Cultivated fields, barren grasslands, meadows, sandy and arid sea coasts.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (WV), 五島列島 (RB), 屋久島 (IV), 種子島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

農耕地，草原，牧草地，海岸の草原に生息する．

EREMOPHILA Boie ハマヒバリ属

453. *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) ハマヒバリ

Hama-hibari Shore Lark

Range: Holarctic, locally Neotropical. Breeds in arctic and subarctic regions of Eurasia, and from the Balkans, Asia Minor, and Near East to Tibet and Himalayas, north to the Altai, Mongolia, and Manchuria; also in nw Africa, North America south to Mexico, and Columbia in South America. Migratory and sedentary, northern birds wintering in warmer areas.

453-1. *Eremophila alpestris flava* (Gmelin, 1789) ハマヒバリ

Range: Breeds from Scandinavia to Anadyrland, south to the Stanovoi Range and Lake Baikal. Winters to the British Isles, c and s Europe, c Asia, n China, and Amur Basin, occasionally Sakhalin, Kurile Is., and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Miyagi, Niigata, Tochigi, Nagano, Toyama, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Fukui, Mie, Hyogo, Tottori, Shimane), Hegurajima I. (IV), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (AV).

Habitat: Barren fields, cultivated fields, arid and sandy sea coasts.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 宮城, 新潟, 栃木, 長野, 富山, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 三重, 兵庫, 鳥

取, 島根), 舩倉島 (IV), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (AV).
荒地, 農耕地, 海岸などの開けた環境に生息する.

Family HIRUNDINIDAE ツバメ科

RIPARIA Forster ショウドウツバメ属

454. *Riparia paludicola* (Vieillot, 1817) タイワンショウドウツバメ

Taiwan-shodo-tsubame Brown-throated Martin

Range: Afrotropical and Indomalayan. Breeds in c and s Africa; also in n India, n Indochina, Philippines, and Taiwan. Sedentary.

454-1. *Riparia paludicola chinensis* (Gray, 1830) タイワンショウドウツバメ

Range: Breeds from s Tajikistan, n Afghanistan, Pakistan and n India to Myanmar, Indochina, s China, and Taiwan.

Status: Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Nov. 1999, Yonagunijima I., May 2000, Apr. 2008, Haterumajima I., Mar. 2010).

琉球諸島 (AV: 沖縄島, 1999 年 11 月, 与那国島, 2000 年 5 月, 2008 年 4 月, 波照間島, 2010 年 3 月).

455. *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) ショウドウツバメ

Shodo-tsubame Sand Martin

Range: Holarctic, marginally Indomalayan. Breeds from Europe to Anadyrland and Kamchatka, south to n Africa, Asia Minor, n India, and se China; also North America south to the s US. Winters to tropical regions.

455-1. *Riparia riparia ijimae* (Lönnerberg, 1908) ショウドウツバメ

Range: Breeds in se Siberia, Amur Basin, Sakhalin, Kurile Is. and Hokkaido. Winters to s China, Assam to Indochina, and Borneo.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (PV), Hegurajima I. (PV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open fields near lakes, rivers, sea coasts.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (PV), 舩倉島 (PV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

河川, 湖近くの土手に営巣する. 渡りの時期には本州以南でも海岸沿いの平野部で見られる.

TACHYCINETA Cabanis ミドリツバメ属

456. *Tachycineta bicolor* (Vieillot, 1808) ミドリツバメ

Midori-tsubame Tree Swallow

Range: Nearctic. Breeds from w and c Alaska and Canada south to c US. Winters to s US, Middle America and Caribbean Is.

Status: Hokkaido (AV: Cape Erimomisaki, Oct. 1962).

北海道 (AV: 襟裳岬, 1962 年 10 月).

HIRUNDO Linnaeus ツバメ属

457. *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 ツバメ

Tsubame Barn Swallow

Range: Holarctic, marginally Indomalayan. Breeds from Europe and n Africa across Eurasia to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to Iran, Himalayas, s China, and Taiwan; also North America south to Mexico. Winters to tropical regions and Southern Hemisphere.

457-1. *Hirundo rustica saturata* Ridgway, 1883 アカハラツバメ

Range: Breeds in Kamchatka, Okhotsk coast, lower Amur Basin. Specimens referable to this subspecies were collected in Korea, Japan, and Taiwan in winter.

Status: Honshu (IV: Aomori, Shizuoka. MB: Yamaguchi), Hegurajima I. (CB), Mishima I. (CB), Kyushu (IV: Fukuoka, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州 (IV: 青森, 静岡. MB: 山口), 舩倉島 (CB), 見島 (CB), 九州 (IV: 福岡, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島

(AV), トカラ列島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 西表島, 与那国島).

農耕地や居住地に生息する.

457-2. *Hirundo rustica gutturalis* Scopoli, 1786 ツバメ

Range: Breeds from the Himalayas to n Myanmar, China, and Taiwan, north to Korea, Ussuriland, middle Amur Basin, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Winters south to s India, Sri Lanka, Indonesia, New Guinea, Australia, and islands in the sw Pacific.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB, locally WV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (MB), Shikoku (MB, WV), Kyushu (MB, WV), Tsushima (MB), Goto Is. (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (MB), Tanegashima I. (MB), Izu Is. (MB), Ogasawara Is. (PV), Iwo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (MB, PV), Ryukyu Is. (PV. CB: Kurimajima I.), Daito Is. (PV).

Habitat: Cultivated lands, residential areas.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB, 一部 WV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (MB), 四国 (MB, WV), 九州 (MB, WV), 対馬 (MB), 五島列島 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (MB), 種子島 (MB), 伊豆諸島 (MB), 小笠原群島 (PV), 硫黄列島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (MB, PV), 琉球諸島 (PV. CB: 来間島), 大東諸島 (PV).

農耕地や住宅地に生息する.

458. *Hirundo tahitica* Gmelin, 1789 リュウキュウツバメ

Ryukyu-tsubame Pacific Swallow

Range: Indomalayan. Breeds from s India and Sri Lanka eastward to Indonesia, and islands in the sw Pacific, north to the Philippines, Taiwan, and Ryukyu Is. Sedentary.

458-1. *Hirundo tahitica namiyei* (Stejneger, 1887) リュウキュウツバメ

Range: Resident on the Amami Is., Ryukyu Is., and Taiwan.

Status: Honshu (AV: Yamagata), Kyushu (AV: Oita), Danjo Is. (IV), Tanegashima I. (CB), Tokara Is. (CB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB. IV: Yonagunijima I.), Daito Is. (IV).

Habitat: Open places, residential areas.

本州 (AV: 山形), 九州 (AV: 大分), 男女群島 (IV), 種子島 (CB), トカラ列島 (CB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB. IV: 与那国島), 大東諸島

(IV).

住宅地に生息する.

459. *Hirundo daurica* Laxmann, 1769 コシアカツバメ

Koshiaka-tsubame Red-rumped Swallow

Range: Temperate and tropical Eurasian and Afrotropical. Breeds from the Balkans and Asia Minor across w and c Asia to China, Korea, Ussuriland, lower Amur Basin, and Japan, south to India and Sri Lanka; also Iberian Peninsula and tropical Africa. Migratory and sedentary, northern birds wintering to Africa, India, se Asia, and s China.

459-1. *Hirundo daurica japonica* Temminck & Schlegel, 1845 コシアカツバメ

Range: Breeds in China, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Winters to India, se Asia, and s China.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated lands, residential areas.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

農耕地, 住宅地に生息する.

DELICHON Moore イワツバメ属**460. *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) ニシイワツバメ**

Nishi-iwa-tsubame Common House Martin

Range: Palearctic. Breeds from w Europe east across Eurasia to Anadyrland, south to nw Africa, Asia Minor, Kashmir, Mongolia, and Manchuria. Winters to Africa south of the Sahara, southwestern part of Arabian Peninsula, and se Asia.

460-1. *Delichon urbicum lagopodum* (Pallas, 1811) ニシイワツバメ

Range: Breeds from Enisei Valley east to Anadyrland, south to Mongolia, and

Manchuria. Winters to se Asia.

Status: Hokkaido (AV: Oshima-Oshima I., May 1993), Tobishima I. (IV: May 1992, May 2005), Hegurajima I. (IV: May 1996, May 2010, etc.), Amami-Oshima I. (AV: Feb. 2008), Okinawajima I. (AV: Mar. 1993), Yonagunijima I. (AV: Mar. 2006).

北海道 (AV: 渡島大島, 1993 年 5 月), 飛島 (IV: 1992 年 5 月, 2005 年 5 月), 舩倉島 (IV: 1996 年 5 月, 2010 年 5 月等), 奄美大島 (AV: 2008 年 2 月), 沖縄島 (AV: 1993 年 3 月), 与那国島 (AV: 2006 年 3 月).

461. *Delichon dasypus* (Bonaparte, 1850) イワツバメ

Iwa-tsubame Asian House Martin

Range: Palearctic and locally Indomalayan. Breeds in Himalayas, Transbaikalia, sc Siberia, Kuril Is., China, Taiwan, Korea, and Japan. Northern birds migratory, wintering in tropical regions.

461-1. *Delichon dasypus dasypus* (Bonaparte, 1850) イワツバメ

Range: Breeds in Transbaikalia, Ussuriland, Sakhalin, Korea, and Japan (incl. s Kurile Is.). Winters to s China, Malay Peninsula, Philippines, Borneo, and Java.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB, WV), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB, WV), Kyushu (MB, WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (PV), Iwo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Lower mountain forests and urban open areas.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB, WV), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB, WV), 九州 (MB, WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (PV), 硫黄列島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 南大東島 (IV).

山地や海岸の崖, 建造物に営巣し, また低地や市街地でも繁殖する.

Family PYCNONOTIDAE ヒヨドリ科

PYCNONOTUS Boie シロガシラ属

462. *Pycnonotus sinensis* (Gmelin, 1789) シロガシラ

Shirogashira Light-vented Bulbul

Range: E Asiatic. Breeds in s China north to the lower Yangtze Basin and west to Szechwan, Hainan, n Indochina, Taiwan, and s Japan. Mainly sedentary.

462-1. *Pycnonotus sinensis sinensis* (Gmelin, 1789) シロガシラ

Range: Breeds in s China north to the lower Yangtze Basin and west to Szechwan; also the Yaeyama Is. Partially migratory, wintering to Hainan and n Vietnam.

Status: Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Kohamajima I., Kuroshima I., Take-tomijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Open woodlands, forest edge, cultivated fields.

八重山諸島 (RB: 石垣島, 小浜島, 黒島, 竹富島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

林縁, 農耕地, 草原に生息する.

462-U. *Pycnonotus sinensis* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Chiba, Ishikawa, Hiroshima, Yamaguchi), Kyushu (WV: Nagasaki), Tsushima (AV), Okinawajima I. (RB). These might include introduced birds.

本州 (AV: 千葉, 石川, 広島, 山口), 九州 (WV: 長崎), 対馬 (AV), 沖縄島 (RB). これらの記録は, 移入分布の可能性もある.

HYPSIPETES Vigors ヒヨドリ属

463. *Hypsipetes amaurotis* (Temminck, 1830) ヒヨドリ

Hiyodori Brown-eared Bulbul

Range: E Asiatic. Breeds in s Sakhalin, Japan, Quelpart I., Dagelet I., Taiwan (very local), Lu Tao I., Lan Yu I., and small islets off n Luzon. Mainly sedentary, but northern birds winter in warmer regions.

463-1. *Hypsipetes amaurotis amaurotis* (Temminck, 1830) ヒヨドリ

Range: Breeds from s Sakhalin and Hokkaido southward to Yakushima I.

and Tanegashima I., Izu Is., small islands in the Sea of Japan and off Kyushu, Quelpart I., and Dagelet I. Sedentary, but winters to plains and warmer areas. Recorded from the Ryukyu Is., Korea, and Yangtze Basin in e China.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Open woods, forest edge, cultivated lands, residential areas.

北海道 (RB), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV).

疎林, 林縁, 農耕地, 住宅地に生息する.

463-2. *Hypsipetes amaurotis squamiceps* (Kittlitz, 1830) オガサワラヒヨドリ

Range: Resident on the Ogasawara Is.

Status: Ogasawara Is. (RB: Mukojima I., Chichijima I., Hahajima I.).

Habitat: Woods, residential areas.

小笠原群島 (RB: 聳島, 父島, 母島).

森林, 住宅地に生息する.

463-3. *Hypsipetes amaurotis magnirostris* Hartert, 1905 ハシブトヒヨドリ

Range: Resident on the Iwo Is.

Status: Iwo Is. (RB: Kita-Iwoto I., Iwoto I., Minami-Iwoto I.).

Habitat: Open woods, forest edges.

硫黄列島 (RB: 北硫黄島, 硫黄島, 南硫黄島).

疎林, 林縁に生息する.

463-4. *Hypsipetes amaurotis borodinonis* (Kuroda, 1923) ダイトウヒヨドリ

Range: Resident on the Daito Is.

Status: Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open woods, forest edges, cultivated fields.

大東諸島 (RB: 北大東島, 南大東島).

森林, 林縁, 農耕地に生息する.

463-5. *Hypsipetes amaurotis ogawae* Hartert, 1907 アマミヒヨドリ

Range: Resident on the Tokara Is. and Amami Is.

Status: Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Kakeromajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I.).

Habitat: Open woods, cultivated lands, residential areas.

トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 加計呂麻島, 徳之島, 沖永良部島).

疎林, 農耕地, 住宅地に生息する.

463-6. *Hypsipetes amaurotis pryeri* Stejneger, 1887 リュウキュウヒヨドリ

Range: Resident on the Okinawa Is. and Miyako Is.

Status: Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Agunijima I., Iheyajima I., Izenajima I., Zamamijima I., Kumejima I.), Miyako Is. (RB).

Habitat: Open woods, cultivated lands, residential areas.

沖縄諸島 (RB: 沖縄島, 栗国島, 伊平屋島, 伊是名島, 座間味島, 久米島), 宮古諸島 (RB).

疎林, 農耕地, 住宅地に生息する.

463-7. *Hypsipetes amaurotis stejnegeri* Hartert, 1907 イシガキヒヨドリ

Range: Resident on the Yaeyama Is. (except Yonagunijima I.).

Status: Yaeyama Is. (RB: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Taketomijima I., Kuroshima I., Haterumajima I.).

Habitat: Open woods, cultivated lands, residential areas.

八重山諸島 (RB: 石垣島, 西表島, 竹富島, 黒島, 波照間島).

疎林, 農耕地, 住宅地に生息する.

463-8. *Hypsipetes amaurotis nagamichii* Deignan, 1960 タイワンヒヨドリ

Range: Resident on Yonagunijima I., e and s Taiwan, Kizanto I., Lu Tao I., and Lan Yu I.

Status: Yonagunijima I. (RB).

Habitat: Various types of forest, cultivated lands, residential areas.

与那国島 (RB).

疎林, 農耕地, 住宅地に生息する.

Family CETTHIDAE ウグイス科

CETTIA Bonaparte ウグイス属

464. *Cettia diphone* (Kittlitz, 1830) ウグイス

Uguisu Japanese Bush Warbler

Range: E Palearctic. Breeds from e Manchuria to the Yangtze Basin in China, s Ussuriland, Korea, Sakhalin, and Japan. Migratory and sedentary, northern birds wintering to Japan, s China, Thailand, Taiwan, and Philippines.

464-1. *Cettia diphone sakhalinensis* (Yamashina, 1927) カラフトウグイス

Range: Breeds in Sakhalin and s Kurile Is. Winters from c Honshu to Kyushu.

Status: Hokkaido (PV), Rishirito I. (PV), s Kurile Is. (MB), n Honshu (PV), c and sw Honshu (PV, WV), Awashima I. (AV), Sado (PV), Kyushu (PV), Okinawajima I. (IV).

Habitat: Dense thickets and undergrowth in wood-edges and woodlands, shrubby grasslands, garden thickets in resident on migration.

北海道 (PV), 利尻島 (PV), 南千島 (MB), 本州北部 (PV), 本州中・南西部 (PV, WV), 粟島 (AV), 佐渡 (PV), 九州 (PV), 沖縄島 (IV).

林縁や林内の密生した藪, またはササ藪に生息する.

464-2. *Cettia diphone borealis* Campbell, 1892 チョウセンウグイス

Range: Breeds in ne China, adjacent se Russia (s Ussuriland) and Korea. Winters to e China (Fujian), Taiwan and n Philippines (Batan Is. and Luzon).

Status: Rishirito I. (AV: May 1992), Honshu (AV: Hiroshima, Tottori, Shimane), Hegurajima I. (IV), Tsushima (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Okinoerabujima I., Feb. 2006), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Yonagunijima I., Mar. 1994), Kita-Daitojima I. (AV).

Habitat: Dense thickets and undergrowth in wood-edges and woodlands, shrubby grasslands.

利尻島 (AV: 1992 年 5 月), 本州 (AV: 広島, 鳥取, 島根), 舩倉島 (IV), 対馬 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 沖永良部島, 2006 年 2 月), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 与那国島, 1994 年 3 月), 北大東島 (AV).

林縁や林内の密生した藪などに生息する.

464-3. *Cettia diphone cantans* (Temminck & Schlegel, 1847) ウグイス

Range: Breeds in Japan from Hokkaido south to Kyushu, Yakushima I., Tanegashima I., Izu Is., and Tsushima; also Quelpart I. in Korea. Mainly sedentary, wintering to warmer regions and lower elevations.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (RB), Hegurajima I. (MB), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (IV: Mukojima I.), Okinawa Is. (WV), Daito Is. (RB).

Habitat: Dense bamboo thickets, forest undergrowth, edge of cultivation, shrubby grasslands.

北海道 (MB), 本州 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (MB), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (IV: 聶島), 沖縄諸島 (WV), 大東諸島 (RB).

低山帯から亜高山帯までの林縁, 林内の密生した藪, またはササ藪に生息する.

464-4. *Cettia diphone diphone* (Kittlitz, 1830) ハシナガウグイス

Range: Resident on the Ogasawara Is. and Iwo Is.

Status: Ogasawara Is. (FB: Mukojima I. RB: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., Iwoto I. RB: Minami-Iwoto I.).

Habitat: Dense thickets and undergrowth in wood-edges and woodlands, shrubby grasslands.

小笠原群島 (FB: 聶島. RB: 父島, 母島), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島, 硫黄島. RB: 南硫黄島).

林縁や林内の密生した藪などに生息する.

464-5. *Cettia diphone restricta* (Kuroda, 1923) ダイトウウグイス

Range: Resident from the Amami Is. to the Ryukyu Is., also formerly resident on the Daito Is. (Minami-Daitojima I.).

Status: Amami Is. (RB), Okinawa Is. (RB), Daito Is. (FB: Minami-Daitojima I.). Population in Tokara Is. is possibly classified into this subspecies.

Habitat: Dense thickets and undergrowth in wood-edges and woodlands, shrubby grasslands.

奄美諸島 (RB), 沖縄諸島 (RB), 大東諸島 (FB: 南大東島). トカラ列島の繁殖集団も本亜種の可能性がある.

林縁や林内の密生した藪などに生息する。

464-6. *Cettia diphone riukuensis* (Kuroda, 1925) リュウキュウウグイス

Range: Wintering in the Ryukyu Is. Breeding area unknown, but probably in the northern part of the range of the species.

Status: Ryukyu Is. (WV). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Dense thickets and undergrowth in wood-edges and woodlands, shrubby grasslands.

琉球諸島 (WV). 本亜種の分布は再検討が必要である。

林縁や林内の空き地の密生した藪などに生息する。

UROSPHENA Swinhoe ヤブサメ属

465. *Urosphena squameiceps* (Swinhoe, 1863) ヤブサメ

Yabusame Asian Stubtail

Range: E Palearctic. Breeds in se Manchuria, Ussuriland, s Sakhalin, Korea, and Japan. Winters in e Myanmar to Indochina, se China, Hainan, and Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (MB), Tanegashima I. (IV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Dense forest thickets and undergrowth.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (MB), 種子島 (IV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

森林の密生した藪などに生息する。

Family AEGITHALIDAE エナガ科

AEGITHALOS Hermann エナガ属

466. *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) エナガ

Enaga Long-tailed Tit

Range: Palearctic. Breeds from w Europe east across Eurasia to Okhotsk coast, Sakhalin, and Kamchatka, south to the Caucasus, Iran, n Mongolia, China to the Yangtze Basin and Yunnan, Korea, Ussuriland, and Japan. Mainly sedentary.

466-1. *Aegithalos caudatus japonicus* Prazák, 1897 シマエナガ

Range: Breeds in the lower Amur Basin, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is. Sedentary, but winters to warmer areas; casual in Honshu and s Korea.

Status: Hokkaido (RB), Honshu (AV: Aomori, Tochigi, Chiba, Niigata, Naganano).

Habitat: Deciduous and mixed woods.

北海道 (RB), 本州 (AV: 青森, 栃木, 千葉, 新潟, 長野).

平野部や低山帯の落葉広葉樹林や針広混交林に生息する.

466-2. *Aegithalos caudatus magnus* (Clark, 1907) チョウセンエナガ

Range: Resident in s Korea and Tsushima.

Status: Tsushima (RB), Iki (AV).

Habitat: Deciduous woods.

対馬 (RB), 壱岐 (AV).

山地の落葉広葉樹林に生息する.

466-3. *Aegithalos caudatus trivirgatus* (Temminck & Schlegel, 1848) エナガ

Range: Resident in Honshu, Sado, and Oki; also Quelpart I.

Status: Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Mishima I. (AV).

Habitat: Deciduous and mixed woods.

本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (AV).

平野部や低山帯の落葉広葉樹林や針広混交林に生息する.

466-4. *Aegithalos caudatus kiusiuensis* Kuroda, 1923 キュウシュウエナ

ガ

Range: Resident in Shikoku and Kyushu.

Status: Shikoku (RB), Kyushu (RB). Birds of unidentified subspecies were recorded in Tokara Is.

Habitat: Deciduous, evergreen, pine and mixed woods.

四国 (RB), 九州 (RB). トカラ列島では亜種不明の個体が記録されている。

落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, マツ林, 針広混交林に生息する。

Family PHYLLOSCOPIDAE ムシクイ科

PHYLLOSCOPUS Boie ムシクイ属

467. *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758) キタヤナギムシクイ

Kita-yanagi-mushikui Willow Warbler

Range: Palearctic. Breeds from w Europe eastward across Siberia to the Kolyma Basin and Anadyrland, south to the s Urals in w Russia and Vilyui River in Russian Far East. Winters to tropical Africa.

467-1. *Phylloscopus trochilus yakutensis* Ticehurst, 1935 キタヤナギムシクイ

Range: Breeds in c and e Siberia from the Taimyr Peninsula to the Kolyma Basin and Anadyrland, south to the Kansk region in c Russia and Vilyui River in the east. Winters probably to e Africa in Kenya and Uganda; accidental in Japan.

Status: Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Oct. 1981), Tsushima (AV: Sep. 2007), Amami-Oshima I. (AV: Sep. 2001).

舩倉島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 1981 年 10 月), 対馬 (AV: 2007 年 9 月), 奄美大島 (AV: 2001 年 9 月).

468. *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) チフチャフ

Chifuchafu Common Chiffchaff

Range: Mainly w and c Palearctic. Breeds from the British Isles and w Europe, east to the upper Kolyma in ne Siberia, south to the s Caspian Sea, Altai, and nw Mongolia. Winters to tropical Africa, Arabia, w Asia, and c India.

468-1. *Phylloscopus collybita tristis* Blyth, 1843 チフチャフ

Range: Breeds in se Siberia from the upper Enisei to Lake Baikal, north to the upper Kolyma. Winters to the Himalayan region, c India, and Bengal; casual in Japan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Toyama, Nov. 1996, Tokyo, Jan. 2007, Osaka, Nov. 1997, Tottori, Oct. 2007, Shimane, Apr. 2009), Hegurajima I. (AV: Nov. 1997, etc.), Kyushu (AV: Fukuoka, Mar. 2005, Miyazaki, Mar. 2009), Yonagunijima I. (AV: Mar. 2011).

本州 (AV: 宮城, 富山, 1996 年 11 月, 東京, 2007 年 1 月, 大阪, 1997 年 11 月, 鳥取, 2007 年 10 月, 島根, 2009 年 4 月), 舩倉島 (AV: 1997 年 11 月等), 九州 (AV: 福岡, 2005 年 3 月, 宮崎, 2009 年 3 月), 与那国島 (AV: 2011 年 3 月).

469. *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793) モリムシクイ

Mori-mushikui Wood Warbler

Range: W Palearctic. Breeds from w Europe east to the s Urals, south to the Pyrenees, Balkans, and Caucasus. Winters to tropical Africa; accidental in Japan.

Status: Hokkaido (AV: Oct. 1991), Tobishima I. (AV: Oct. 2006), Hegurajima I. (AV: Oct. 1984, etc.).

北海道 (AV: 1991 年 10 月), 飛島 (AV: 2006 年 10 月), 舩倉島 (AV: 1984 年 10 月等).

470. *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842) ムジセッカ

Muji-sekka Dusky Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the Novosibirsk region and Altai to the Okhotsk coast and Anadyrland, south to the e Himalayas, w Szechwan in w China, Mongolia, Manchuria, Ussuriland, and Sakhalin. Winters to e and n India, se Asia, and s China south of the Yangtze Basin; casual in w Europe and Japan.

470-1. *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Blyth, 1842) ムジセッカ

Range: Range of the species except w China, Sikang, and e Himalayas.

Status: Hokkaido (IV), Rishirito I. (AV), Honshu (IV: Aomori, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Nara, Wakayama, Osaka, Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I.

(AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

北海道 (IV), 利尻島 (AV), 本州 (IV: 青森, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 茨城, 千葉, 東京, 静岡, 愛知, 石川, 奈良, 和歌山, 大阪, 兵庫, 島根, 広島, 山口), 粟島 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (AV: 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

疎林, マングローブ林, 農耕地に生息し, しばしば越冬する.

471. *Phylloscopus affinis* (Tickell, 1833) キバラムシクイ

Kibara-mushikui Tickell's Leaf Warbler

Range: C Palearctic. Breeds in Himalayas from n Pakistan and Kashmir, east to sw and c China. Winters to se Nepal, India, s China, Myanmar and nw Thailand.

471-U. *Phylloscopus affinis* ssp. 亜種不明

Status: Hegurajima I. (AV: May 1995).

舩倉島 (AV: 1995 年 5 月).

472. *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863) カラフトムジセッカ

Karafuto-muji-sekka Radde's Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the Novosibirsk region and Altai eastward to Transbaikalia, lower Amur Basin, and Sakhalin, south to nw Manchuria, Ussuriland, and n Korea. Winters from s Myanmar to Indochina; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Yamagata, Niigata, Shizuoka, Ishikawa, Hiroshima, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Saga), Danjo Is. (AV), Sakishima Is. (AV: Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Dense thickets, undergrowth.

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 山形, 新潟, 静岡, 石川, 広島, 山口), 飛島 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 九州 (AV: 佐賀), 男女群島 (AV),

先島諸島 (AV: 宮古島, 西表島, 与那国島).
密な低木林に生息する.

473. *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811) カラフトムシクイ

Karafuto-mushikui Pallas's Leaf Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in se Siberia from the Altai to n Mongolia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Sakhalin. Winters to se Asia and s China; casual in w Europe and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Aichi, Ishikawa, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Saga), Tokara Is. (AV), Iriomotejima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Light coniferous and mixed forests.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 新潟, 東京, 神奈川, 山梨, 愛知, 石川, 島根, 山口), 飛島 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 九州 (AV: 佐賀), トカラ列島 (AV), 西表島 (AV), 与那国島 (AV).

針葉樹林や針広混交林に生息する.

474. *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) キマユムシクイ

Kimayu-mushikui Yellow-browed Warbler

Range: C and e Palearctic. Siberia from the n Urals to the Okhotsk coast and Anadyrland, south to n Mongolia, Amur Basin, n Manchuria, and Ussuriland. Winters to the Himalayas, India, se Asia, Malay Peninsula, and s China. Rare in Japan on migration.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (PV: Aomori, Akita, Miyagi, Niigata, Tochigi, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Fukui, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Tobishima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV: Tokushima, Ehime), Kyushu (PV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Goto Is. (IV), Danjo Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV).

Habitat: Coniferous and mixed woods.

北海道 (PV), 本州 (PV: 青森, 秋田, 宮城, 新潟, 栃木, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 岐阜, 石川, 福井, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 島根, 広島, 山口), 飛島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (IV),

四国 (PV: 徳島, 愛媛), 九州 (PV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 五島列島 (IV), 男女群島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV).
針葉樹林や針広混交林に生息する.

475. *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858) コムシクイ

Ko-mushikui Arctic Warbler

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from n Scandinavia east across Siberia to the Chukot Peninsula, south to the Altai, Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Ussuriland; also w Alaska. Winters to tropical Asia and Indonesian islands.

475-1. *Phylloscopus borealis borealis* (Blasius, 1858) コムシクイ

Range: Breeds in n Scandinavia east across Siberia to the Chukot Peninsula, south to the Altai, Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Ussuriland. Winters to tropical Asia and Indonesian islands.

Status: Honshu (PV: Niigata), Tsushima (PV).

Habitat: Deciduous, coniferous and mixed forests.

本州 (PV: 新潟), 対馬 (PV).

針葉樹林や針広混交林に生息する.

475-2. *Phylloscopus borealis kennicotti* (Baird, 1869) アメリカコムシクイ

Range: Breeds in w Alaska. Winters to tropical Asia and Indonesian islands.

Status: Yaeyama Is. (PV, WV).

Habitat: Wintering in evergreen forest or mangrove.

八重山諸島 (PV, WV).

常緑樹林やマングローブ林で越冬する.

476. *Phylloscopus examinandus* Stresemann, 1913 オオムシクイ

O-mushikui Kamchatka Leaf Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in Kamchatka, Sakhalin, Kurile Is. and Hokkaido (Shiretoko Peninsula). Winters to tropical Asia and Indonesian islands.

Status: Hokkaido (PV, MB: Shiretoko Peninsula), s Kurile Is. (PV, MB), Honshu (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (PV).

Habitat: Deciduous, coniferous and mixed forests.

北海道 (PV, MB: 知床半島), 南千島 (PV, MB), 本州 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (PV). 森林に生息し, 亜高山帯の針葉樹林・落葉広葉樹林で繁殖する.

477. *Phylloscopus xanthodryas* (Swinhoe, 1863) メボソムシクイ

Meboso-mushikui Japanese Leaf Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in the subalpine zone of Japan from Honshu, Shikoku and Kyushu. Winters to se China, Taiwan, Philippines, and possibly Indonesian islands.

Status: Honshu (MB, PV), Sado (PV), Shikoku (MB: Tokushima, Ehime, PV), Kyushu (MB: Oita, PV), Izu Is. (PV: Hachijojima I.), Okinawajima I. (PV), Yaeyama Is. (PV), Daito Is. (PV).

Habitat: Deciduous, coniferous and mixed forests.

本州 (MB, PV), 佐渡 (PV), 四国 (MB: 徳島, 愛媛, PV), 九州 (MB: 大分, PV), 伊豆諸島 (PV: 八丈島), 沖縄島 (PV), 八重山諸島 (PV), 大東諸島 (PV).

森林に生息し, 亜高山帯の針葉樹林・落葉広葉樹林で繁殖する.

478. *Phylloscopus plumbeitarsus* Swinhoe, 1861 ヤナギムシクイ

Yanagi-mushikui Two-barred Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds from ec Siberia to the Okhotsk coast, n Sakhalin, south to ne Mongolia, Manchuria and n Korea. Winters to s China, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam.

Status: Hegurajima I. (AV: May 2001).

舩倉島 (AV: 2001 年 5 月).

479. *Phylloscopus borealoides* Portenko, 1950 エゾムシクイ

Ezo-mushikui Sakhalin Leaf Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in Sakhalin and n Japan from the s Kurile Is. to c Honshu and Shikoku. Winters probably from se China to Thailand and Indochina.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB: n and c Honshu, PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB, PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Coniferous, deciduous and mixed forests in mountain area.

北海道 (MB), 本州 (MB: 中部以北. PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB, PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 宮古島, 与那国島).

山地の落葉広葉樹林, 針広混交林に生息する.

480. *Phylloscopus coronatus* (Temminck & Schlegel, 1847) センダイムシクイ

Sendai-mushikui Eastern Crowned Leaf Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in se Transbaikalia, lower Amur Basin, se Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan; also c and sw Szechwan. Winters to Assam, se Asia, Malay Peninsula, Sumatra, and Java; straggles to Taiwan and Germany.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (MB), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Iki (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Tokashikijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open deciduous or mixed woods.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (MB), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 壱岐 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 渡嘉敷島, 与那国島).

低山帯の森林に生息する.

481. *Phylloscopus ijimae* (Stejneger, 1892) イイジマムシクイ

Iijima-musikui Ijima's Leaf Warbler

Range: E Palearctic. Breeds on the Izu Is. and Tokara Is. Winters to the Philippines (Luzon). Recorded from Honshu, Shikoku, Yakushima I., and Ryukyu Is. on migration.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Wakayama, Yamaguchi), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (AV: Oita, Miyazaki, Kagoshima), Yakushima I. (PV), Izu Is. (MB: Oshima I., Toshima I., Nijijima

I., Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Tokara Is. (MB: Nakanoshima I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yaeyama Is.).

Habitat: Light broad-leaved woods, tangled scrubs and bushes, backyard thickets.

本州 (AV: 茨城, 神奈川, 静岡, 愛知, 和歌山, 山口), 見島 (AV), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (AV: 大分, 宮崎, 鹿児島), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (MB: 大島, 利島, 新島, 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 青ヶ島), トカラ列島 (MB: 中之島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 八重山諸島).

森林, 疎林に生息する.

Family SYLVIIDAE ズグロムシクイ科

SYLVIA Scopoli ズグロムシクイ属

482. *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758) コノドジロムシクイ

Ko-nodojiro-mushikui Lesser Whitethroat

Range: Palearctic. Breeds from the British Isles, e and s Scandinavia, eastward through e Europe to Transbaikalia, south to the Balkans, Asia Minor, w Iran, the Caucasus, s Siberia, and Mongolia. Winters to Africa, n India and sw Asia.

482-U. *Sylvia curruca* ssp. 亜種不明

Status: Hokkaido (AV: Hakodate, Oct. 1994, Nemuro, Dec. 2002 - Jan. 2003, Dec. 2007), Honshu (AV: Yamagata, Feb. 1998, Tokyo, Jan. - Feb. 2008, Aichi, Feb. 2003, Mie, Nov. 2007), Tobishima I. (AV: Oct. 2009), Hegurajima I. (AV: May 2008, Sep. 2009), Shikoku (AV: Kochi, Apr. 2007), Izu Is. (AV: Kozushima I., Nov. 2009), Amami-Oshima I. (AV: Apr. 2007).

北海道 (AV: 函館, 1994 年 10 月, 根室, 2002 年 12 月 - 2003 年 1 月, 2007 年 12 月), 本州 (AV: 山形, 1998 年 2 月, 東京, 2008 年 1 - 2 月, 愛知, 2003 年 2 月, 三重, 2007 年 11 月), 飛島 (AV: 2009 年 10 月), 舩倉島 (AV: 2008 年 5 月, 2009 年 9 月), 四国 (AV: 高知, 2007 年 4 月), 伊豆諸島 (AV: 神津島, 2009 年 11 月), 奄美大島 (AV: 2007 年 4 月).

Family ZOSTEROPIDAE メジロ科

APALOPTERON Bonaparte メグロ属

483. *Apalopteron familiare* (Kittlitz, 1830) メグロ

Meguro Bonin White-eye

Range: E Palearctic. Endemic to Ogasawara Is.

483-1. *Apalopteron familiare familiare* (Kittlitz, 1830) メグロ

Range: Resident on Mukojima Is., also possibly occurred on Chichijima I. formerly.

Status: Ogasawara Is. (FB: Mukojima I., Nakodojima I., Chichijima I.). Extinct.

Habitat: Subtropical virgin and secondary woods, tall bushes.

小笠原群島 (FB: 鴛島, 媒島, 父島). 絶滅.

常緑広葉樹林に生息していた.

483-2. *Apalopteron familiare hahasima* Yamashina, 1930 ハハジマメグロ

Range: Resident on Hahajima Is.

Status: Hahajima Is. (RB: Hahajima I., Mukoujima I., Imotojima I. FB: Meijima I.).

Habitat: Subtropical virgin and secondary woods, tall bushes.

母島列島 (RB: 母島, 向島, 妹島. FB: 姪島).

常緑広葉樹林に生息する.

ZOSTEROPS Vigors & Horsfield メジロ属

484. *Zosterops erythropleurus* Swinhoe, 1863 チョウセンメジロ

Chosen-mejiro Chestnut-flanked White-eye

Range: E Palearctic. Breeds in se Russia (e Amurland, Ussuriland), ne China (Heilongjiang) and n Korea. Winters to s Chine, Myanmar, Thailand, nw Vietnam, Laos and s Cambodia.

Status: Hokkaido (AV: Mt. Hakodateyama, Sep. 1999, Cape Chikyumisaki, Oct. 1999), Honshu (AV: Niigata, Ishikawa, Fukui, Nov. 1974, Shimane) Tobishima I. (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Yonagunijima I. (IV).

Habitat: Forest edges, thickets and deciduous or mixed woods.

北海道 (AV: 函館山, 1999 年 9 月, 地球岬, 1999 年 10 月), 本州 (AV: 新潟, 石川, 福井, 1974 年 11 月, 島根), 飛島 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 与那国島 (IV).

林縁, 灌木林, 広葉樹林などに生息する.

485. *Zosterops japonicus* Temminck & Schlegel, 1845 メジロ

Mejiro Japanese White-eye

Range: E Palearctic and Indomalayan. Breeds in s Sakhalin and Japan, s Korea, Taiwan, e and s China, Hainan, and n Indochina. Mainly sedentary.

485-1. *Zosterops japonicus japonicus* Temminck & Schlegel, 1845 メジロ

Range: Breeds in s Sakhalin and Japan from s and w Hokkaido to Kyushu, Tsushima, and Iki; also s Korea, Quelpart I., and Dagelet I. Sedentary, but frequently migrating to Izu Is., Yakushima I., Tanegashima I., Amami Is., and Okinawa Is. Also recorded (possibly breeds) from Oki, Goto Is., and Danjo Is.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (AV), Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (RB), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Amami Is. (WV), Okinawa Is. (WV: Okinawajima I., Zamamijima I., Kumejima I.).

Habitat: Thickets and undergrowth in deciduous or mixed woods, near human habitations.

北海道 (MB), 南千島 (AV), 本州 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (RB), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 奄美諸島 (WV), 沖縄諸島 (WV: 沖縄島, 座間味島, 久米島).

常緑広葉樹林, 住宅地などに生息する.

485-2. *Zosterops japonicus stejnegeri* Seeböhm, 1891 シチトウメジロ

Range: Resident on Izu Is. Introduced to Ogasawara Is. And also, another subspecies, *Z. j. alani*, was introduced there from Iwo Is. Both subspecies have hybridized and spread in Ogasawara Is.

Status: Honshu (AV: Shizuoka), Izu Is. (RB: Oshima I., Toshima I., Nijijima I., Shikinejima I., Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Aogashima I., Torishima I.), Ogasawara Is. (IB).

Habitat: Dense broad-leaved and mixed woods, tall tangled bushes.

本州 (AV: 静岡), 伊豆諸島 (RB: 大島, 利島, 新島, 式根島, 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 青ヶ島, 鳥島), 小笠原群島 (IB).

常緑広葉樹林に生息する.

485-3. *Zosterops japonicus alani* Hartert, 1905 イオウトウメジロ

Range: Resident on Iwo Is. Introduced to Ogasawara Is. and Minami-Torishima I. And also, another subspecies, *Z. j. stejnegeri*, was introduced to Ogasawara Is. from Izu Is. Both subspecies have hybridized and spread in Ogasawara Is.

Status: Ogasawara Is. (IB), Iwo Is. (RB), Minami-Torishima I. (IB).

Habitat: Dense evergreen broad-leaved woods.

小笠原群島 (IB), 硫黄列島 (RB), 南鳥島 (IB).

常緑広葉樹林に生息する.

485-4. *Zosterops japonicus daitoensis* Kuroda, 1923 ダイトウメジロ

Range: Resident on Daito Is.

Status: Daito Is. (RB: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

大東諸島 (RB: 北大東島, 南大東島).

常緑広葉樹林に生息する.

485-5. *Zosterops japonicus insularis* Ogawa, 1905 シマメジロ

Range: Resident on Yakushima I. and Tanegashima I.; straggles to Okinawa Is.

Status: Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Tokara Is. (RB), Okinawa Is. (AV: Zamamijima I., Kumejima I.). Classification of subspecies in Tokara Is. should be re-examined.

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

屋久島 (RB), 種子島 (RB), トカラ列島 (RB), 沖縄諸島 (AV: 座間味島, 久米島). トカラ列島の亜種は, 分類が確実ではないため再検討が必要である.

常緑広葉樹林に生息する.

485-6. *Zosterops japonicus loochooensis* Tristram, 1889 リュウキュウメジロ

Range: Resident on Amami Is. and Ryukyu Is. south to Yonagunijima I.

Status: Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikajima I., Tokunoshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Agunijima I., Yagajishima I., Iheyajima I., Iejima I., Izenajima I., Kerama Is., Kumejima I.,

Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests.

奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 栗国島, 屋我地島, 伊平屋島, 伊江島, 伊是名島, 慶良間諸島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島). 常緑広葉樹林に生息する.

Family LOCUSTELLIDAE センニュウ科

LOCUSTELLA Kaup センニュウ属

486. *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840) マキノセンニュウ

Makino-sennyu Lanceolated Grasshopper Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the w Urals eastward to the lower Kolyma, Okhotsk coast, and Kamchatka, south to the Altai, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan south to c Honshu. Winters to e India, Myanmar to Indochina, Malay Peninsula, Philippines, Greater Sunda Is., and Borneo.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB: Iwate. CB: Gunma, Shizuoka. PV), Awashima I. (PV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (PV), Kyushu (IV: Saga), Kusagaki Is. (AV), Yoronjima I. (IV), Okinawajima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Open grasslands with scattered shrubs, swampy meadows.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB: 岩手. CB: 群馬, 静岡. PV), 粟島 (PV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (PV), 九州 (IV: 佐賀), 草垣諸島 (AV), 与論島 (IV), 沖縄島 (AV), 与那国島 (AV).

草原に生息する.

487. *Locustella ochotensis* (Middendorff, 1853) シマセンニュウ

Shima-sennyu Middendorff's Grasshopper Warbler

Range: E Palearctic. Breeds from the Okhotsk coast to Kamchatka, Commander Is., Shantar Is., Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido. Winters to the Philippines, Borneo, and Sulawesi; straggles to Alaska.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (PV), Awashima I. (PV),

Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Tokara Is. (PV), Ryukyu Is. (PV).

Habitat: Grasslands with scattered shrubs, costal meadows.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), トカラ列島 (PV), 琉球諸島 (PV).

草原や灌木草原に生息する.

488. *Locustella pleskei* Taczanowski, 1890 ウチヤマセンニュウ

Uchiyama-sennyu Styan's Grasshopper Warbler

Range: E Palearctic. Breeds on small islets off Honshu and Kyushu, Izu Is., islets off Korea and the extreme south of the Russian Far East, Dagelet I., and Quelpart I. Winters to se China south to Fukien and Kwangtung.

Status: Honshu (MB: Mie, Wakayama, Shimane. PV: Fukushima, Chiba, Shizuoka, Tottori, Hiroshima), Shikoku (MB: Tokushima), Koaijima I. (MB), Kyushu (MB: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Tsukuejima I. (MB), Hashirajima I. (MB), Shikanoshima I. (MB), Izu Is. (MB: Toshima I., Nijima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV), Yonagunijima I. (IV).

Habitat: Grasslands with shrubs, bamboo thickets.

本州 (MB: 三重, 和歌山, 島根. PV: 福島, 千葉, 静岡, 鳥取, 広島), 四国 (MB: 徳島), 小安居島 (MB), 九州 (MB: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 机島 (MB), 柱島 (MB), 志賀島 (MB), 伊豆諸島 (MB: 利島, 新島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 青ヶ島), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV), 与那国島 (IV).

島の草原, 笹藪, 低木林に生息する.

489. *Locustella certhiola* (Pallas, 1811) シベリアセンニュウ

Shiberia-sennyu Pallas's Grasshopper Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the Irtysh River to near the Okhotsk coast and Kamchatka, south to c Asia, Altai, e Tian Shan, Transbaikalia, Manchuria, and Ussuriland. Winters to India, n Myanmar to Indochina, Malay Peninsula, and Greater Sunda Is.

489-1. *Locustella certhiola rubescens* Blyth, 1845 シベリアセンニュウ

Range: Breeds in Siberia from the Irtysh River eastward to the Kolyma Basin.

Winters to India, Sri Lanka, and Myanmar; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV: Sep. 1985), Honshu (AV: Tottori, Sep. 1998, Shimane, Sep. 1999, Jun. 2003, Kagoshima, Nov. 1987), Hegurajima I. (AV: May 1987, Jun. 2003), Mishima I. (IV), Kyushu (AV: Kagoshima, Nov. 1987), Tsushima (IV), Tokara Is. (AV: Nakanoshima I., Oct. 2000), Okinawajima I. (AV: May 1999), Yonagunijima I. (AV: May 2002, Mar. 2003, etc.).

北海道 (AV: 1985 年 9 月), 本州 (AV: 鳥取, 1998 年 9 月, 島根, 1999 年 9 月, 2003 年 6 月, 鹿児島, 1987 年 11 月), 舩倉島 (AV: 1987 年 5 月, 2003 年 6 月), 見島 (IV), 九州 (AV: 鹿児島, 1987 年 11 月), 対馬 (IV), トカラ列島 (AV: 中之島, 2000 年 10 月), 沖縄島 (AV: 1999 年 5 月), 与那国島 (AV: 2002 年 5 月, 2003 年 3 月等).

490. *Locustella pryeri* (Seeböhm, 1884) オオセッカ

O-sekka Japanese Marsh Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in Manchuria, Hebei, Jiangxi, Jiangsu, Shanghai in China, and Honshu in Japan, also possibly in s Ussuriland and Korea. Migratory and sedentary, Chinese birds wintering to the Yangtze Basin.

490-1. *Locustella pryeri pryeri* (Seeböhm, 1884) オオセッカ

Range: Breeds in c and n Honshu. Mainly migratory. Winters to warmer areas in Honshu.

Status: Honshu (MB: Aomori, Akita. RB: Ibaraki, Chiba. CB: Tochigi. FB: Miyagi. IV: Iwate, Yamagata, Niigata, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Kyoto, Okayama), Shikoku (IV: Tokushima, Kochi).

Habitat: Swampy areas and marshes, reed beds.

本州 (MB: 青森, 秋田. RB: 茨城, 千葉. CB: 栃木. FB: 宮城. IV: 岩手, 山形, 新潟, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 京都, 岡山), 四国 (IV: 徳島, 高知).

湖沼や河川敷の湿地, 草原などに生息する.

491. *Locustella fasciolata* (Gray, 1861) エゾセンニュウ

Ezo-sennyu Gray's Grasshopper Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in s Siberia from the Novosibirsk region to the lower Amur Basin, n Manchuria, coastal Ussuriland, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido. Winters to the Philippines, Sulawesi, Moluccas, and New Guinea; straggles to w Europe.

491-1. *Locustella fasciolata amnicola* Stepanyan, 1972 エゾセンニュウ

Range: Breeds in Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido. Winters probably to the Philippines, Sulawesi, and Moluccas.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Yakushima I. (PV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV), Daito Is. (AV).

Habitat: Dense thickets, forest edge, edge of cultivation.

北海道 (MB), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 屋久島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV), 大東諸島 (AV).

平地の藪, 特に湿原縁, 川辺の低木林に生息する.

Family ACROCEPHALIDAE ヨシキリ科

ACROCEPHALUS Naumann & Naumann ヨシキリ属

492. *Acrocephalus orientalis* (Temminck & Schlegel, 1847) オオヨシキリ

O-yoshikiri Oriental Reed Warbler

Range: E Palearctic. Breeds in e Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, Japan, and e China south to Fukien. Winters to Assam, se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and Sumatra to the Moluccas.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Iki (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV, PV), Daito Is. (PV).

Habitat: Reed beds, riverbed thickets, cultivated lands.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 壱岐 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV, PV), 大東諸島 (PV).

アシ原, 川辺の低木林, 疎林に生息する.

493. *Acrocephalus bistrigiceps* Swinhoe, 1860 コヨシキリ

Ko-yoshikiri Black-browed Reed Warbler

Range: E Palearctic. Breeds from ne Mongolia and Transbaikalia east to the lower Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, and Japan, south to Korea and e China to the lower Yangtze Basin. Winters from Myanmar to Indochina and se China, occasionally Assam.

493-1. *Acrocephalus bistrigiceps bistrigiceps* Swinhoe, 1860 コヨシキリ

Range: Range of the species except n Manchuria; straggles to Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB: Ehime. FB: Kagawa. PV), Kyushu (MB: Kumamoto, Oita. PV), Tsushima (PV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Open grasslands, tall grasses, reed beds, river beds, swampy and marshy areas.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB: 愛媛. FB: 香川. PV), 九州 (MB: 熊本, 大分. PV), 対馬 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV).

草原, アシ原, 河川敷, 湖沼周辺の草原に生息する.

494. *Acrocephalus sorghophilus* (Swinhoe, 1863) セスジコヨシキリ

Sesuji-ko-yoshikiri Speckled Reed Warbler

Range: E Palearctic. Precise breeding area is not known; evidently ne China (probably wetlands in Liaoning and Hebei). Winters to Philippines.

Status: Yonagunijima I. (AV: Oct. 2002).

与那国島 (AV: 2002 年 10 月).

495. *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) イナダヨシキリ

Inada-yoshikiri Paddyfield Warbler

Range: C Palearctic. Breeds from e Europe (Romania, Bulgaria) east to sw Siberia, s Ukraine, Kazakhstan to upper Enisei River and w Mongolia, and south to ne Iran, Tajikistan and nw China (Xinjiang), possibly also Afghanistan. Winters to se Iran and Indian Subcontinent.

495-U. *Acrocephalus agricola* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Miyagi, Nov. 2005, Oct. 2010), Hegurajima I. (AV: May 1992).

本州 (AV: 宮城, 2005 年 11 月, 2010 年 10 月), 舩倉島 (AV: 1992 年 5 月).

496. *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 ヤブヨシキリ

Yabu-yoshikiri Blyth's Reed Warbler

Range: W Palearctic. Breeds from e Europe (mainly s Finland, Baltic States, Belarus) east to c Russia (upper R Lena and se Altai), and south to n Afghanistan. Winters to s and e Indian Subcontinent and Myanmar.

Status: Hokkaido (AV: Fukushima-cho, Oct. 1999), Hegurajima I. (AV: Oct. 2007), Kumejima I. (AV: May 2000).

北海道 (AV: 福島町, 1999 年 10 月), 舩倉島 (AV: 2007 年 10 月), 久米島 (AV: 2000 年 5 月).

497. *Acrocephalus aedon* (Pallas, 1776) ハシブトオオヨシキリ

Hashibuto-o-yoshikiri Thick-billed Reed Warbler

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and e Siberia from the Novosibirsk region east to Transbaikalia, lower Amur Basin, n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, and possibly Korea. Winters to India, Himalayas, se Asia, Malay Peninsula, and se China; straggles to Japan and w Europe.

497-1. *Acrocephalus aedon stegmanni* Watson, 1985 ハシブトオオヨシキリ

Range: Eastern part of the species range from Transbaikalia and upper Amur Basin eastward.

Status: Honshu (AV: Nagano, May 1927, Shizuoka, Feb. - Apr. 1997), Hegurajima I. (AV: Sep. 2004, May 2008).

本州 (AV: 長野, 1927 年 5 月, 静岡, 1997 年 2 - 4 月), 舩倉島 (AV: 2004 年 9 月, 2008 年 5 月).

IDUNA Keyserling & Blasius ヒメウタイムシクイ属

498. *Iduna caligata* (Lichtenstein, 1823) ヒメウタイムシクイ

Hime-utai-mushikui Booted Warbler

Range: C Palearctic. Breeds in ne Europe from se Finland, w and sw Russia, east to n Kazakhstan, extreme nw China, s Russia and nw Mongolia. Winters to India and Bangladesh.

Status: Hegurajima I. (AV: Sep. 1999, Sep. 2010), Tokara Is. (AV: Tairajima I., Oct. 2009).

舢倉島 (AV: 1999 年 9 月, 2010 年 9 月), トカラ列島 (AV: 平島, 2009 年 10 月).

Family CISTICOLIDAE セツカ科

CISTICOLA Kaup セツカ属

499. *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) セツカ

Sekka Zitting Cisticola

Range: Mainly tropical Old World. Breeds from s Europe and Mediterranean region eastward to India, se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and Greater Sunda Is. to n Australia, north to the Yangtze Basin in China, Taiwan, and c and s Japan; also Africa and Arabia. Sedentary, but winters to warmer areas.

499-1. *Cisticola juncidis brunniceps* (Temminck & Schlegel, 1850) セツカ

Range: Breeds in Japan from Honshu south to the Izu Is. and Ryukyu Is.; also s Korea, Quelpart I. and n Philippines.

Status: N Honshu (MB), c and sw Honshu (RB), Hegurajima I. (IV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Iki (RB), Goto Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB).

Habitat: Open grassy fields, cultivated fields, tall grasses.

本州北部 (MB), 本州中・南西部 (RB), 舢倉島 (IV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB).

草原, 農耕地に生息する.

Family BOMBYCILLIDAE レンジャク科

BOMBYCILLA Vieillot レンジャク属

500. *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758) キレンジャク

Ki-renjaku Bohemian Waxwing

Range: N Holarctic. Breeds in n Eurasia from Scandinavia to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to the Altai, Lake Baikal, and Stanovoi Range; also n North America. Winters to temperate regions.

500-1. *Bombycilla garrulus centralasiae* Poljakov, 1915 キレンジャク

Range: Breeds in e Siberia to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to the Altai, Lake Baikal, Stanovoi Range, and lower Amur Basin. Winters in Mongolia, e China from s Manchuria to the Yangtze Basin, s Ussuriland, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan.

Status: Hokkaido (WV, PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV, PV), Awashima I. (PV), Sado (WV, PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (WV, PV), Shikoku (WV, PV), Kyushu (WV, PV), Tsushima (PV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Light deciduous and mixed woods, cultivated lands, near human habitations.

北海道 (WV, PV), 南千島 (PV), 本州 (WV, PV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV, PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (WV, PV), 四国 (WV, PV), 九州 (WV, PV), 対馬 (PV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV).

平野部の疎林, 農耕地, 住宅地などに生息する.

501. *Bombycilla japonica* (Siebold, 1824) ヒレンジャク

Hi-renjaku Japanese Waxwing

Range: E Palearctic. Breeds from se Siberia to the lower Amur Basin, ne Manchuria, and n Ussuriland. Winters in e China south to the Yangtze Basin, Manchuria, Korea, Sakhalin, and Japan, occasionally Fukien and Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (WV, PV), Awashima I. (PV), Sado (WV, PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV, PV), Kyushu (WV, PV), Tsushima (WV, PV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Light deciduous and mixed woods, cultivated lands, near human habitations.

北海道 (PV), 本州 (WV, PV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV, PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV, PV), 九州 (WV, PV), 対馬 (WV, PV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

平野部の疎林, 農耕地, 住宅地などに生息する.

Family SITTIDAE ゴジュウカラ科

SITTA Linnaeus ゴジュウカラ属

502. *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 ゴジュウカラ

Goju-kara Eurasian Nuthatch

Range: Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from w Europe and nw Africa east across s Siberia to Okhotsk coast, and Kamchatka, south to Iran, nw India, Altai, n Mongolia, China to Fukien and Szechwan, Korea, Sakhalin, Kurile Is., Japan, and Taiwan. Sedentary.

502-1. *Sitta europaea asiatica* Gould, 1835 シロハラゴジュウカラ

Range: Resident in e European Russia and s Siberia from the Urals to Lake Baikal, n Mongolia, Stanovoi Range, lower Amur Basin, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Deciduous, mixed and coniferous forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

低地から山地の落葉広葉樹林, 針広混交林, 常緑針葉樹林に生息する.

502-2. *Sitta europaea amurensis* Swinhoe, 1871 ゴジュウカラ

Range: Resident in Transbaikalia, s Amur Basin north to the middle Zeya and Komsomolsk, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan from Honshu to Kyushu.

Status: Honshu (RB), Oki (RB), Shikoku (RB), n Kyushu (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous, mixed and coniferous forests.

本州 (RB), 隠岐 (RB), 四国 (RB), 九州北部 (RB). 本亜種の分布域は

明確ではないため、検討が必要である。

山地の落葉広葉樹林、亜高山帯の針葉樹林に生息する。

502-3. *Sitta europaea roseilia* Bonaparte, 1850 キュウシュウゴジュウカラ

Range: Resident in s Kyushu (Miyazaki and Kagoshima prefs).

Status: S Kyushu (RB). Distribution of this subspecies should be re-examined.

Habitat: Deciduous broad-leaved and mixed forests.

九州南部 (RB). 本亜種の分布域は明確ではないため、検討が必要である。

山地の落葉広葉樹林、針広混交林に生息する。

Family CERTHIIDAE キバシリ科

CERTHIA Linnaeus キバシリ属

503. *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758 キバシリ

Kibashiri Eurasian Treecreeper

Range: Palearctic. Breeds from the British Isles and c Europe across Eurasia to Okhotsk coast and Sakhalin, south to the Altai, n Mongolia, Manchuria to Hopeh, n Korea, Ussuriland, and Japan; also discrete populations in Iran, Tian Shan, Tibet, and w China. Mainly sedentary.

503-1. *Certhia familiaris daurica* Domaniewski, 1922 キタキバシリ

Range: Breeds in s Siberia from the Enisei and Altai to Transbaikalia, n Mongolia, Amur Basin, Stanovoi Range, and Okhotsk coast, south through Manchuria to Hopeh, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, Hokkaido, and s Kurile Is. Recorded from s Korea. Mainly sedentary.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB).

Habitat: Mixed, coniferous and deciduous broad-leaved forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB).

針広混交林, 常緑針葉樹林, 落葉広葉樹林に生息する。

503-2. *Certhia familiaris japonica* Hartert, 1897 キバシリ

Range: Resident in Honshu, Shikoku, and Kyushu.

Status: Honshu (RB), Hegurajima I. (AV: Oct. 2005), Shikoku (RB: Tokushi-

ma, Ehime, Kochi), Kyushu (RB: Oita, Kumamoto, Miyazaki. IV: Fukuoka, Kagoshima).

Habitat: Deciduous, coniferous and mixed forests.

本州 (RB), 舩倉島 (AV: 2005 年 10 月), 四国 (RB: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (RB: 大分, 熊本, 宮崎. IV: 福岡, 鹿児島).

山地の針葉樹林, 落葉広葉樹林, 針広混交林に生息する.

Family TROGLODYTIDAE ミソサザイ科

TROGLODYTES Vieillot ミソサザイ属

504. *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758) ミソサザイ

Misosazai Eurasian Wren

Range: Holarctic. Breeds from Europe and nw Africa eastward across Eurasia to se Siberia, Kamchatka, and Commander Is., south to the Himalayas, w and n China, Korea, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., Japan, and Taiwan; also Aleutian Is. and North America south to the n US. Migratory and sedentary, wintering in warmer areas.

504-1. *Troglodytes troglodytes dauricus* Dybowski & Taczanowski, 1884
チョウセンミソサザイ

Range: Breeds in se Siberia, ne China, Korea.

Status: Honshu (AV: Shimane, Dec. 1938), Kumejima I. (AV: Dec. 1998).

本州 (AV: 島根, 1938 年 12 月), 久米島 (AV: 1998 年 12 月).

504-2. *Troglodytes troglodytes fumigatus* Temminck, 1835 ミソサザイ

Range: Resident in Hokkaido, s Kurile Is., Honshu, Sado, Oki, Shikoku, Kyushu, Tsushima, Iki, and Oshima in the Izu Is. in Japan and Quelpart I. in Korea.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (RB), Hegurajima I. (WV), Oki (RB), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Danjo Is. (PV), Izu Is. (RB: Oshima I.), Tokara Is. (IV), Yoronjima I. (AV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Dense deciduous and mixed woods, forest edge.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (WV), 隠岐 (RB), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (RB: 大島), トカラ列島 (IV), 与論島

(AV), 琉球諸島 (WV).

おもに山地森林の溪流沿いに生息する。冬期は低地へ移動する。

504-3. *Troglodytes troglodytes mosukei* Momiyama, 1923 モスケミソサザイ

Range: Resident on the Izu Is. (except Oshima I.).

Status: Izu Is. (RB: Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I.).

Habitat: Evergreen broad-leaved forests, forest edge.

伊豆諸島 (RB: 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島).

常緑広葉樹林, 林縁に生息する。

504-4. *Troglodytes troglodytes orii* Yamashina, 1939 ダイトウミソサザイ

Range: Resident on the Daito Is. (Minami-Daitojima I.).

Status: Daito Is. (FB: Minami-Daitojima I.). Extinct.

大東諸島 (FB: 南大東島). 絶滅。

504-5. *Troglodytes troglodytes ogawae* Hartert, 1910 オガワミソサザイ

Range: Resident on Yakushima I. and Tanegashima I.

Status: Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB).

Habitat: Forests.

屋久島 (RB), 種子島 (RB).

森林に生息する。

Family STURNIDAE ムクドリ科

SPODIOPSAR Sharpe ムクドリ属

505. *Spodiopsar sericeus* (Gmelin, 1789) ギンムクドリ

Gin-mukudori Red-billed Starling

Range: E Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds in c and s China to Szechwan, s Shensi and s Anhwei; also Hainan. Sedentary and migratory, wintering south to n Indochina; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Akita, Gunma, Toyama, Ibaraki, Aichi, Ishikawa, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane,

Hiroshima, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawa Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Zamamijima I., Kumejima I.), Sakishima Is. (IV: Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Cultivated lands, grasslands.

北海道 (AV), 本州 (IV: 秋田, 群馬, 富山, 茨城, 愛知, 石川, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 飛島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 沖縄諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 座間味島, 久米島), 先島諸島 (IV: 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島), 南大東島 (IV).

農耕地, 草原などに生息する.

506. *Spodiopsar cineraceus* (Temminck, 1835) ムクドリ

Mukudori White-cheeked Starling

Range: E Palearctic. Breeds in se Transbaikalia, e Mongolia, the middle Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n China from Hopeh to Kansu, Korea, Sakhalin, and Japan. Sedentary and migratory, northern birds wintering south to Myanmar, s China, Taiwan, Hainan, and n Indochina. Recorded on migration from Korea and e China; casual in Philippines.

Status: Hokkaido (MB, locally RB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (WV), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (PV, WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (RB: Oshima I. WV: Niijima I., Shikinejima I. IV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV. RB: Okinawajima I., Iejima I., Nohojima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated lands, open wooded country, residential areas.

北海道 (MB, 一部 RB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (WV), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (PV, WV),

男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (RB: 大島. WV: 新島, 式根島. IV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV. RB: 沖縄島, 伊江島, 野甫島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

農耕地, 疎林, 公園や住宅地に生息し, 冬には農耕地などに多い.

AGROPSAR Oates コムクドリ属

507. *Agropsar sturninus* (Pallas, 1776) シベリアムクドリ

Shiberia-mukudori Daurian Starling

Range: E Palearctic. Breeds from n Mongolia and Transbaikalia to the middle Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Korea, and n China from Hopeh to Kansu. Winters to s Myanmar, se Asia, Malay Peninsula, s China, Hainan, Greater Sunda Is., and Borneo; casual in Japan.

Status: Rishirito I. (AV), Honshu (AV: Yamagata, Aichi, Shimane, Hiroshima), Tobishima I. (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Kagoshima), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Agunijima I., Ikemajima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Cultivated lands.

利尻島 (AV), 本州 (AV: 山形, 愛知, 島根, 広島), 飛島 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 九州 (AV: 鹿児島), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 粟国島, 池間島, 石垣島, 西表島, 与那国島).

農耕地などに生息する.

508. *Agropsar philippensis* (Forster, 1781) コムクドリ

Ko-mukudori Chestnut-cheeked Starling

Range: E Palearctic. Breeds in s Sakhalin and n Japan south to c Honshu. Winters to s Ryukyu Is., Philippines, and Borneo. Recorded or in winter from e China, Taiwan, Sulawesi, and Moluccas on migration; casual in Ussuriland and Korea.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n and c Honshu (MB), sw Honshu (PV. CB: Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV. CB: Fukuoka), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV. WV), Daito Is. (PV).

Habitat: Forests, open woodlands, suburban areas.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (PV. CB: 岡山, 島根, 広島, 山口), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV. CB: 福岡), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV. WV), 大東諸島 (PV).

疎林, 林のある農耕地などに生息し, 渡りの時期には宅地や公園などにも飛来する.

STURNIA Lesson カラムクドリ属

509. *Sturnia sinensis* (Gmelin, 1788) カラムクドリ

Kara-mukudori White-shouldered Starling

Range: Ne Indomalayan. Breeds in s China from se Yunnan to Fukien, and n Indochina. Sedentary and migratory, wintering to se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and rarely Japan; accidental in Myanmar.

Status: Honshu (AV: Yamagata, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Ishikawa, Shizuoka, Aichi, Mie, Osaka, Wakayama, Okayama, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (IV).

Habitat: Cultivated lands.

本州 (AV: 山形, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 石川, 静岡, 愛知, 三重, 大阪, 和歌山, 岡山, 山口), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (IV).

農耕地などに生息する.

PASTOR Temminck バライロムクドリ属

510. *Pastor roseus* (Linnaeus, 1758) バライロムクドリ

Barairo-mukudori Rosy Starling

Range: Palearctic. Breeds from s Ukraine east to the lower Volga steppes, c and e Kazakhstan, w Altai and w Mongolia, south to e Turkey, s Iran, Afghanistan and nw China; also occasionally se Europe and farther e in Russia. Winters to India and Sri Lanka.

Status: Hegurajima I. (IV), Honshu (AV: Tokyo, Shimane), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Kagoshima), Ogasawara Is. (AV: Hahajima I., Jul. 2010), Tokara Is. (IV: Suwanosejima I.), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

舩倉島 (IV), 本州 (AV: 東京, 島根), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 鹿児島), 小笠原群島 (AV: 母島, 2010 年 7 月), トカラ列島 (IV: 諏訪之瀬島), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島, 石垣島, 与那国島).

STURNUS Linnaeus ホシムクドリ属

511. *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 ホシムクドリ

Hoshi-mukudori Common Starling

Range: W and c Palearctic. Breeds from Europe east across Eurasia to Lake Baikal, Altai, w Mongolia, and w Himalayas. Introduced in North America, s Africa, Australia, New Zealand, and Polynesia. Mainly sedentary.

511-1. *Sturnus vulgaris poltaratskyi* Finsch, 1878 ホシムクドリ

Range: Breeds in s Siberia from the Urals to Lake Baikal, Altai, and w Mongolia. Winters to Afghanistan, Baluchistan, and n India; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Fukui, Shiga, Mie, Nara, Wakayama, Osaka, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (AV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated fields, open woodlands.

北海道 (AV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 富山, 茨城, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 滋賀, 三重, 奈良, 和

歌山, 大阪, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島, 山口), 粟島 (AV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (IV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

農耕地, 疎林に生息する.

Family CINCLIDAE カワガラス科

CINCLUS Borkhausen カワガラス属

512. *Cinclus pallasii* Temminck, 1820 カワガラス

Kawagarasu Brown Dipper

Range: Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from n Afghanistan and Himalayas eastward to China, n Indochina, and Taiwan, north to Korea, Manchuria, Ussuriland, Amur Basin, Okhotsk coast, Kamchatka, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Sedentary.

512-1. *Cinclus pallasii pallasii* Temminck, 1820 カワガラス

Range: Range of the species except Afghanistan and from the Himalayas to n Thailand.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Sado (RB), Oki (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Yakushima I. (RB), Tokara Is. (AV).

Habitat: Streams in mountainous areas.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 屋久島 (RB), トカラ列島 (AV).

山地の溪流に生息する.

Family MUSCICAPIDAE ヒタキ科

ZOOTHERA Vigors トラツグミ属

513. *Zoothera sibirica* (Pallas, 1776) マミジロ

Mamijiro Siberian Thrush

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and e Siberia east of the Enisei, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Japan. Winters to se Asia, s China, Malay Peninsula, Sumatra, and Java.

513-1. *Zoothera sibirica davisoni* (Hume, 1877) マミジロ

Range: Breeds in s Sakhalin and Japan. Winters in Myanmar, Indochina, Malay Peninsula, and Sumatra.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n and c Honshu (MB), sw Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Niiijima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Dense deciduous, mixed or coniferous forests with thick undergrowth.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 新島, 八丈島), トカラ列島 (PV), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 西表島).

針葉樹林, 針広混交林などの森林に生息する.

514. *Zoothera dauma* (Latham, 1790) トラツグミ

Tora-tsugumi Scaly Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in e European Russia and s Siberia from the Enisei to the Okhotsk coast, south to n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan; also Himalayas to sw China, India, Sri Lanka, and Greater Sunda Is. Migratory and sedentary, wintering in temperate and tropical regions.

514-1. *Zoothera dauma aurea* (Holandre, 1825) トラツグミ

Range: Breeds in e European Russia and s Siberia east of the Enisei, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan. Winters in s Japan, Taiwan, se China, and possibly se Asia and Philippines; straggles to w Europe.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (RB), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB: Niijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (RB), Iwo Is. (RB: Kita-Iwoto I., Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Forests with dense undergrowth.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 男女群島 (PV), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB: 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (RB), 硫黄列島 (RB: 北硫黄島, 硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV: 南大東島).

林床の密な森林に生息する.

514-2. *Zoothera dauma major* (Ogawa, 1905) オオトラツグミ

Range: Resident on Amami-Oshima I. and Kakeromajima I.

Status: Amami-Oshima I. (RB), Kakeromajima I. (RB).

Habitat: Forests with dense undergrowth.

奄美大島 (RB), 加計呂間島 (RB). 数は少ない.

林床の密な森林に生息する.

514-3. *Zoothera dauma iriomotensis* Nishiumi & Morioka, 2009 コトラツグミ

Range: Resident on the Yaeyama Is. (Iriomotejima I.).

Status: Iriomotejima I. (RB). No reliable records since 1984.

Habitat: Forests.

西表島 (RB). 1984 年以後, 最近の確実な観察例はない.
森林に生息する.

CICHLOPASSER Bonaparte オガサワラガビチョウ属

515. *Cichlopasser terrestris* (Kittlitz, 1830) オガサワラガビチョウ

Ogasawara-gabicho Bonin Thrush

Range: E Palearctic. Endemic to the Ogasawara Is.

Status: Ogasawara Is. (FB: Chichijima I.). 4 specimens were collected in May 1828. Captive individual at Ueno Zoological Gardens was recorded in Dec. 1885. Extinct.

小笠原群島 (FB: 父島). 1828 年 5 月に 4 羽採集. 1885 年 12 月に上野動物園での飼育記録がある. 絶滅.

CATHARUS Bonaparte チャツグミ属

516. *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) ハイイロチャツグミ

Haiiro-cha-tsugumi Grey-cheeked Thrush

Range: Mainly Nearctic. Breeds from ne Siberia to Alaska and Canada. Winters to mainly n South America east of Andes.

516-1. *Catharus minimus aliciae* (Baird, 1858) ハイイロチャツグミ

Range: Breeds in the range of the species except e Canada (Newfoundland).

Status: Hegurajima I. (AV: Oct. 2004).

舢倉島 (AV: 2004 年 10 月).

TURDUS Linnaeus ツグミ属

517. *Turdus hortulorum* Sclater, 1863 カラアカハラ

Kara-akahara Grey-backed Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in se Siberia south of Sakha, middle and lower Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Korea. Winters to se China and n Indochina. Recorded casually from Japan and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Akita, Yamagata, Niigata, Nagano, Toyama, Kanagawa, Aichi, Ishikawa, Wakayama, Osaka, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (IV), Awashima I. (IV), Hegurajima I. (IV), Tsunoshima I. (IV), Mishima I. (IV), Kyushu (IV: Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Ryukyu Is. (IV: Kumejima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Deciduous forest, cultivated land surrounded by forests.

北海道 (AV), 本州 (IV: 秋田, 山形, 新潟, 長野, 富山, 神奈川, 愛知, 石川, 和歌山, 大阪, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 飛島 (IV), 粟島 (IV), 舢倉島 (IV), 角島 (IV), 見島 (IV), 九州 (IV: 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (IV), 琉球諸島 (IV: 久米島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

広葉樹林, 林に囲まれた農耕地などに生息する.

518. *Turdus cardis* Temminck, 1831 クロツグミ

Kuro-tsugumi Japanese Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in n and c Japan and c China in the Yangtze Basin. Winters in s China, Hainan, and n Indochina, occasionally in sw Japan. Recorded from Sakhalin, Moneron I., Izu Is., and Korea.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB, PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Kumejima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Hatomajima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Deciduous and mixed woods, forest edge.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB, PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島, 与論島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 久米島, 伊良部島, 石垣島, 西表島, 鳩間島, 与那国島), 大東諸島 (IV: 北大東島, 南大東島).

針広混交林, 広葉樹林に生息する.

519. *Turdus merula* Linnaeus, 1758 クロウタドリ

Kuro-utadori Common Blackbird

Range: W and c Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from w Europe and nw Africa east through Asia Minor, Iran, India to s China north to the Yangtze Basin, Sri Lanka. Sedentary but winters in warmer areas.

519-1. *Turdus merula mandarinus* Bonaparte, 1850 クロウタドリ

Range: Breeds in se China, south of the Yangtze Basin, west to Szechwan and w Yunnan. Mainly sedentary, but winters to Hainan; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Ishikawa, Shimane), Tobishima I. (AV) Hegurajima I. (IV), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (AV: Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (AV), Goto Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Izenajima I., Tonakijima I., Miyakojima I., Ikemajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Open woodlands, gardens.

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 石川, 島根), 飛島 (AV), 舩倉島 (IV), 四国 (AV: 高知), 九州 (AV: 長崎, 熊本, 鹿児島), 対馬 (AV), 五島列島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 伊是名島, 渡名喜島, 宮古島, 池間島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

疎林, 公園に生息する.

520. *Turdus obscurus* Gmelin, 1789 マミチャジナイ

Mamicha-jinai Eyebrowed Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in c and e Siberia from the Enisei to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to Transbaikalia and Amur Basin. Winters to China, Taiwan, Hainan, se Asia, Philippines, and Greater Sunda Is. Recorded from Sakhalin, Kurile Is., Manchuria, n China, Korea, and Japan on migration; straggles to w Europe.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV, PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV, PV), Kyushu (WV, PV), Tsushima (PV), Iki (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Open woodlands, shrubs.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV, PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (WV), 四国 (WV, PV), 九州 (WV, PV), 対馬 (PV), 壱岐 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV).

森林, 灌木林などに生息する.

521. *Turdus pallidus* Gmelin, 1789 シロハラ

Shirohara Pale Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and sw Japan. Winters in c and sw Japan, Taiwan, s Korea, and e China south to Fukien and Kwangtung.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV, CB: Hiroshima), Awashima I. (PV), Sado (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV, CB), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, urban and suburban areas.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV. CB: 広島), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV, CB), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (WV).

やや開けた森林に生息する.

522. *Turdus chrysolaus* Temminck, 1832 アカハラ

Akahara Brown-headed Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in Sakhalin, Kurile Is., and n and c Japan. Winters in sw Japan, Taiwan, and e China south to Kwangtung and Hainan. Recorded casually from the lower Amur Basin, Ussuriland, Manchuria, Korea, and Philippines.

522-1. *Turdus chrysolaus orii* Yamashina, 1929 オオアカハラ

Range: Breeds on c and s Kurile Is. Winters to Japan.

Status: s Kurile Is. (MB: Etorofuto I.), Honshu (IV: Kanagawa, Shizuoka, Aichi).

Habitat: Deciduous and mixed woods.

南千島 (MB: 択捉島), 本州 (IV: 神奈川, 静岡, 愛知).
森林に生息する.

522-2. *Turdus chrysolaus chrysolaus* Temminck, 1832 アカハラ

Range: Range of the species except the Kurile Is.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I.), Honshu (MB, WV), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV. MB: Tokushima, Kagawa), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Iki (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV, PV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed woods, open forests, forest edge.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島), 本州 (MB, WV), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV. MB: 徳島, 香川), 九州 (WV), 対馬 (PV), 壱岐 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV, PV), 琉球諸島 (WV), 大東

諸島 (IV).

低地 (北海道) から山地の疎林, 森林に生息する.

523. *Turdus celaenops* Stejneger, 1887 アカコッコ

Akakokko Izu Thrush

Range: E Palearctic. Breeds in the Izu Is. from Oshima I. to Aogashima I., Yakushima I., and Tokara Is. Sedentary, but straggles to Honshu southward.

Status: Honshu (WV: Shizuoka. IV: Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Nagano, Mie, Wakayama), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (IV: Miyazaki, Kagoshima), Danjo Is. (WV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (RB: Oshima I., Toshima I., Niihima I., Shikinejima I., Kozushima I., Miyakejima I., Mikurajima I., Hachijojima I., Aogashima I.), Tokara Is. (RB).

Habitat: Evergreen and mixed woods, camellia orchards, near human habitations.

本州 (WV: 静岡. IV: 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 長野, 三重, 和歌山), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (IV: 宮崎, 鹿児島), 男女群島 (WV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (RB: 大島, 利島, 新島, 式根島, 神津島, 三宅島, 御蔵島, 八丈島, 青ヶ島), トカラ列島 (RB).

やや開けた常緑広葉樹林, 混交林に生息する (伊豆諸島, トカラ列島). 屋久島における状況は不明である.

524. *Turdus ruficollis* Pallas, 1776 ノドグロツグミ

Nodoguro-tsugumi Red-throated Thrush

Range: C Palearctic. Breeds in w and c Siberia from e Russia to Transbaikalia, south to the Altai and n Mongolia. Winters to Iran, n India, Himalayas to n Myanmar, and w China.

524-1. *Turdus ruficollis atrogularis* Jarocki, 1819 ノドグロツグミ

Range: Breeds in w Siberia from e Russia and Urals east to the Enisei, south to the n Altai. Winters to Iran, Himalayas, Assam, Myanmar, and Yunnan; occasionally recorded from w Europe and n China (Hopeh) and straggles to Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata), Mishima I. (AV: May 1990), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivation.

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形), 見島 (AV: 1990 年 5 月), 九州 (AV: 福岡, 佐賀), 八重山諸島 (AV: 石垣島).

農耕地近くの開けた森林に生息する.

524-2. *Turdus ruficollis ruficollis* Pallas, 1776 ノドアカツグミ

Range: Breeds in sc Siberia (e Altai and Baikal area) south to n Mongolia and nw China. Winters to ne Indian Subcontinent, ne Myanmar and s China.

Status: Hokkaido (AV: Morimachi, Jan. 2003, Shintotsugawa, Mar. 2005), Honshu (AV: Yamagata, Ishikawa, Osaka, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Kumamoto, Feb. 2010), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV: Tairajima I., Nov. 2004), Amami-Oshima I. (AV: Dec. 2006), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Iriomotejima I., Jan. 2003, Yonagunijima I.).

北海道 (AV: 森町, 2003 年 1 月, 新十津川町, 2005 年 3 月), 本州 (AV: 山形, 石川, 大阪, 島根, 山口), 舩倉島 (AV), 九州 (AV: 熊本, 2010 年 2 月), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV: 平島, 2004 年 11 月), 奄美大島 (AV: 2006 年 12 月), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 西表島, 2003 年 1 月, 与那国島).

525. *Turdus naumanni* Temminck, 1820 ツグミ

Tsugumi Naumann's Thrush

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and e Siberia from the Enisei to the Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to Lake Baikal and Stanovoi Range. Winters to se China, s Korea, and sw Japan, occasionally n Myanmar and Assam.

525-1. *Turdus naumanni eunomus* Temminck, 1831 ツグミ

Range: Breeds in n Siberia from the Taz and Enisei rivers east to Anadyrland, Kamchatka, Commander Is., and probably n Sakhalin. Winters in Japan, Taiwan, and e China, south occasionally to n Myanmar and Assam; rare on the Kurile Is. and casual in w Europe.

Status: Hokkaido (PV, WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, near human habitations.

北海道 (PV, WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (WV), トカ

ラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (WV).
開けた森林, 農耕地, 住宅地周辺に生息する.

525-2. *Turdus naumanni naumanni* Temminck, 1820 ハチジョウツグミ

Range: Breeds in c and se Siberia south of the range of *T. n. eunomus* from the Enisei east through Sakha to the Okhotsk coast, south to Transbaikalia and Stanovoi Range. Winters in Manchuria, e China to the Yangtze Basin, Korea, and Japan, south occasionally to Taiwan, Fukien, and Yunnan; straggles to w Europe and Singapore.

Status: Hokkaido (PV), Honshu (WV, PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Izu Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Open woodlands, open fields, cultivated lands.

北海道 (PV), 本州 (WV, PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 伊豆諸島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV).

開けた森林, 農耕地に生息する. 渡来数は前亜種より少ない.

526. *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 ノハラツグミ

Nohara-tsugumi Fieldfare

Range: Palearctic. Breeds from Scandinavia and c Europe eastward through Siberia to the upper Lena and Aldan rivers, south to the Altai, Sayan, and Lake Baikal. Migratory and sedentary, northern birds wintering south to Europe, Asia Minor, Caucasus, and Iran; straggles to Japan and North America.

Status: Hokkaido (AV: Feb. 1993), Honshu (AV: Miyagi, Jan. 1997, Feb. 2002, Nagano, Jan. 1960, Oct. 1985, Chiba, Saitama, Kanagawa, Feb. 1988, Kyoto), Hegurajima I. (AV: Oct. 2001), Tsushima (AV: Dec. 2010).

北海道 (AV: 1993 年 2 月), 本州 (AV: 宮城, 1997 年 1 月, 2002 年 2 月, 長野, 1960 年 1 月, 1985 年 10 月, 千葉, 埼玉, 神奈川, 1988 年 2 月, 京都), 舩倉島 (AV: 2001 年 10 月), 対馬 (AV: 2010 年 12 月).

527. *Turdus iliacus* Linnaeus, 1758 ワキアカツグミ

Wakiaka-tsugumi Redwing

Range: Palearctic. Breeds from n Europe eastward through Siberia to the Altai, Kolyma Basin, and Lake Baikal; also Iceland and Faeroes. Winters to the British Isles, c and s Europe, Asia Minor, Caucasus, Iran, and Russian Turkestan, occasionally south to n Africa, Canaries, and Near East.

527-1. *Turdus iliacus iliacus* Linnaeus, 1758 フキアカツグミ

Range: Range of the species except Iceland and Faeroes. Straggles to Japan.

Status: Hokkaido (AV: Oct. 1996), Honshu (AV: Aomori, Iwate, Yamagata, Chiba, Saitama, 1933, Ishikawa, Shiga, Jan. 2007, Okayama, Oct. 2003, Shimane, Mar. 2001, Yamaguchi, Feb. 1978, Apr. 1979), Oki (AV: Oct. 1999), Mishima I. (AV: May 1979), Okinawajima I. (AV: Nov. 1983).

北海道 (AV: 1996 年 10 月), 本州 (AV: 青森, 岩手, 山形, 千葉, 埼玉, 1933 年, 石川, 滋賀, 2007 年 1 月, 岡山, 2003 年 10 月, 島根, 2001 年 3 月, 山口, 1978 年 2 月, 1979 年 4 月), 隠岐 (AV: 1999 年 10 月), 見島 (AV: 1979 年 5 月), 沖縄島 (AV: 1983 年 11 月).

528. *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 ヤドリギツグミ

Yadorigi-tsugumi Mistle Thrush

Range: W Palearctic. Breeds from Europe east to w Siberia, n Iran, Turkmenistan and sc Siberia, and south to w Nepal, Altai, nw Africa, Corsica and Sardinia. Winters to n Africa, c to sw Asia.

528-U. *Turdus viscivorus* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Aichi, Feb. 1984), Hegurajima I. (AV: Oct. 1999), Kyushu (AV: Fukuoka, Nov. 1998).

本州 (AV: 愛知, 1984 年 2 月), 舩倉島 (AV: 1999 年 10 月), 九州 (AV: 福岡, 1998 年 11 月).

ERITHACUS Cuvier ヨーロッパコマドリ属

529. *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパコマドリ

Yoroppa-komadori European Robin

Range: W Palearctic. Breeds in Britain, and from Europe east to sw Siberia and w Asia Minor, and also islands in e Atlantic (Azores, Madeira, w Canary Is.), and nw Morocco. Winters to w and s Europe, sw Asia and ne Africa.

529-U. *Erithacus rubecula* ssp. 亜種不明

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Chiba, Nara), Tobishima I. (AV), Hegurajima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 千葉, 奈良), 飛島 (AV), 舩倉島 (AV).

LUSCINIA Forster ノゴマ属

530. *Luscinia akahige* (Temminck, 1835) コマドリ

Komadori Japanese Robin

Range: E Palearctic. Breeds in s Sakhalin and Japan. Mainly migratory, wintering south to se China.

530-1. *Luscinia akahige akahige* (Temminck, 1835) コマドリ

Range: Breeds in s Sakhalin, s Kurile Is., Hokkaido, Honshu, Shikoku, and Kyushu. Winters to se China. Recorded from the Izu Is., Yakushima I., Hopeh and Kiangsu in China, and Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (AV), Izu Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Okinawa Is. (IV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Damp evergreen, mixed or deciduous forests.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (AV), 伊豆諸島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 沖縄諸島 (IV), 与那国島 (AV).

おもに針広混交林に生息する.

530-2. *Luscinia akahige tanensis* (Kuroda, 1923) タネコマドリ

Range: Breeds on the s Izu Is., Yakushima I. and Tanegashima I.

Status: Honshu (AV: Kanagawa), Yakushima I. (MB), Tanegashima I. (MB), Izu Is. (MB: Kozushima I., Miyakejima I., Hachijojima I.).

Habitat: Mixed and broad-leaved evergreen forests of Izu Is., Cryptomeria forests in Yakushima I.

本州 (AV: 神奈川), 屋久島 (MB), 種子島 (MB), 伊豆諸島 (MB: 神津島, 三宅島, 八丈島).

伊豆諸島で常緑広葉樹林に, 屋久島では標高 1,000 m 以上のスギ林に生息する.

531. *Luscinia komadori* (Temminck, 1835) アカヒゲ

Akahige Ryukyu Robin

Range: E Palearctic. Breeds from the Danjo Is., Yakushima I. and Tanegashima I. south through the Tokara Is. and Amami Is. to the Ryukyu Is. Sedentary,

but northern birds also winter to the s Ryukyu Is.

531-1. *Luscinia komadori komadori* (Temminck, 1835) アカヒゲ

Range: Breeds on the Danjo Is., Yakushima I., Tanegashima I., Tokara Is. and Amami Is. Partly migratory to winter in the Yaeyama Is.

Status: Kyushu (AV: Kagoshima), Goto Is. (AV), Danjo Is. (MB), Yakushima I. (MB), Tanegashima I. (MB), Tokara Is. (MB), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kakeromajima I., Tokunoshima I. IV: Okinoerabujima I.), Okinawa Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I.), Miyakojima I. (PV), Yaeyama Is. (WV: Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I., Haterumajima I.).

Habitat: Damp evergreen forests with thick undergrowth.

九州 (AV: 鹿児島), 五島列島 (AV), 男女群島 (MB), 屋久島 (MB), 種子島 (MB), トカラ列島 (MB), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 加計呂麻島, 徳之島. IV: 沖永良部島), 沖縄諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 久米島), 宮古島 (PV), 八重山諸島 (WV: 石垣島, 西表島, 与那国島, 波照間島).

リュウキュウチク林や常緑広葉樹林に生息する.

531-2. *Luscinia komadori namiyei* (Stejneger, 1887) ホントウアカヒゲ

Range: Resident on the Okinawa Is.

Status: Okinawa Is. (RB: Okinawajima I., Iheyajima I., Kerama Is.). No recent records in Kerama Is.

Habitat: Damp evergreen forests with thick undergrowth.

沖縄諸島 (RB: 沖縄島, 伊平屋島, 慶良間諸島). 慶良間諸島では近年の記録がない.

常緑広葉樹林に生息する.

531-3. *Luscinia komadori subrufus* (Kuroda, 1923) ウスアカヒゲ

Range: Known from a single type specimen from Yonagunijima I.

Status: Yaeyama Is. (IV: Yonagunijima I., Oct. 1921). Extinct.

八重山諸島 (IV: 与那国島, 1921 年 10 月). 1 羽の標本があるのみである. 絶滅.

532. *Luscinia svecica* (Linnaeus, 1758) オガワコマドリ

Ogawa-komadori Bluethroat

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from n and c Europe east across n Eurasia to the Okhotsk coast, Chukot Peninsula, and Kamchatka, south to c Asia, nw Himalayas, Mongolia, nw China, and Manchuria; also locally in w

Alaska. Winters to temperate and tropical regions.

532-1. *Luscinia svecica svecica* (Linnaeus, 1758) オガワコマドリ

Range: Breeds in n Eurasia from n and c Europe to the Chukot Peninsula and locally w Alaska, south to n Kamchatka, w Okhotsk coast, and Manchuria (but absent in se Siberia, Transbaikalia, and Amur Basin). E Siberian birds winter in Assam, se Asia, and s China; straggles to Japan and Korea.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata, Niigata, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Osaka, Kyoto, Hyogo, Wakayama, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (AV), Kusagaki Is. (AV), Ogasawara Is. (AV: Hahajima I.), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形, 新潟, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 大阪, 京都, 兵庫, 和歌山, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 香川, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 熊本, 鹿児島), 対馬 (AV), 草垣諸島 (AV), 小笠原群島 (AV: 母島), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 西表島, 与那国島).

533. *Luscinia calliope* (Pallas, 1776) ノゴマ

No-goma Siberian Rubythroat

Range: C and e Palearctic. Breeds from w Siberia to Anadyrland and Kamchatka, south to Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan; also w China in Szechwan and Kansu. Winters to India, se Asia, s China, Taiwan, and Philippines; straggles to w Europe.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (PV. CB: Iwate), c and sw Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Shrubby grasslands, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (PV. CB: 岩手), 本州中・南西部 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島

(PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

草原, 低木林, 農耕地に生息する.

534. *Luscinia cyane* (Pallas, 1776) コルリ

Ko-ruri Siberian Blue Robin

Range: C and e Palearctic. Breeds in se Siberia from the Altai to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea (rare), Sakhalin, and Japan. Winters to Assam, se Asia, s China, Philippines, Sumatra, and Borneo.

534-1. *Luscinia cyane bochaiensis* (Shulpin, 1928) コルリ

Range: Breeds from e Siberia to ne China, n Korea, Ussuriland, Sakhalin and Japan. Winters to Malay Peninsula and Greater Sundas.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV: Miyakejima I., Aogashima I.), Tokara Is. (PV), Okinawa Is. (IV).

Habitat: Mountain forest with dense undergrowth, forest edge.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 三宅島, 青ヶ島), トカラ列島 (PV), 沖縄諸島 (IV).

山地の針広混交林, 落葉広葉樹林などに生息する.

535. *Luscinia sibilans* (Swinhoe, 1863) シマゴマ

Shima-goma Rufous-tailed Robin

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and se Siberia from the Altai and upper Enisei to the Amur Basin, Ussuriland, and Sakhalin, south to Transbaikalia and Manchuria; also Kamchatka. Winters to se Asia, s China, and Hainan. Recorded from Korea, s Kurile Is., Japan, and e China on migration.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV: Etorofuto I., Kunashirito I., Shikotanto I.), Honshu (IV: Yamagata, Niigata, Nagano, Saitama, Ishikawa, Fukui, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, lowland plains.

北海道 (IV), 南千島 (PV: 択捉島, 国後島, 色丹島), 本州 (IV: 山形, 新潟, 長野, 埼玉, 石川, 福井, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 島根, 広島, 山口), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 大分, 宮崎), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (AV), 沖縄島 (AV).

少数が主に日本海側の平地林, 海岸林等を通過する.

TARSIGER Hodgson ルリビタキ属

536. *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773) ルリビタキ

Ruri-bitaki Red-flanked Bluetail

Range: C and e Palearctic. Breeds from n Lapland and Urals east across Siberia to the Okhotsk coast, Sakhalin, and Kamchatka, south to Manchuria, n Mongolia, Ussuriland, and Japan; also Himalayas to se Tibet, Assam, and w China. Winters to temperate regions.

536-1. *Tarsiger cyanurus cyanurus* (Pallas, 1773) ルリビタキ

Range: Range of the species except Himalayas to Tibet, Assam, and w China. Winters from Japan and s Korea to s China, Taiwan, Hainan, and se Asia.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Breeds in subalpine deciduous and coniferous forests. Lower mountain area and lowland forests in winter.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

亜高山帯の針葉樹林やダケカンバ林で繁殖し, 冬季は低山地, 平地の常緑広葉樹林などに生息する.

PHOENICURUS Forster ジョウビタキ属**537. *Phoenicurus erythronotus* (Eversmann, 1841) セアカジョウビタキ**

Seaka-jo-bitaki Eversmann's Redstart

Range: C Palearctic. Breeds from n Tajikistan and se Kazakhstan to Lake Baikal area, nw Mongolia, and w China. Winters to n India.

Status: Rishirito I. (AV: Oct. 2000).

利尻島 (AV: 2000 年 10 月).

538. *Phoenicurus ochruros* (Gmelin, 1774) クロジョウビタキ

Kuro-jo-bitaki Black Redstart

Range: S Palearctic. Breeds from w Europe east across Eurasia to nw China, north to se Siberia and south to Caucasus, nw Africa, Himalayas, and w China. Winters to temperate and tropical regions.

538-1. *Phoenicurus ochruros rufiventris* (Vieillot, 1818) クロジョウビタキ

Range: Breeds in nw and w China and se Tibet. Winters to n India, Himalayas, and Assam to n Myanmar; straggles to Korea and Japan.

Status: Hokkaido (AV: Apr. 1984, Jun. 1999), Honshu (AV: Ibaraki, Jan. 1995, Saitama, winters in 1987, 1988, Kyoto, Apr. 1996), Tobishima I. (AV: Apr. 2005), Awashima I. (AV: Apr. 2010), Hegurajima I. (AV: Apr. 1984, May 2007), Mishima I. (AV: Apr. 1985), Uji Is. (AV), Kumejima I. (AV: Mar. 1999), Iriomotejima I. (AV: Apr. 1996), Yonagunijima I. (AV: Apr. 2004).

北海道 (AV: 1984 年 4 月, 1999 年 6 月), 本州 (AV: 茨城, 1995 年 1 月, 埼玉, 1987 年, 1988 年冬, 京都, 1996 年 4 月), 飛島 (AV: 2005 年 4 月), 栗島 (AV: 2010 年 4 月), 舩倉島 (AV: 1984 年 4 月, 2007 年 5 月), 見島 (AV: 1985 年 4 月), 宇治群島 (AV), 久米島 (AV: 1999 年 3 月), 西表島 (AV: 1996 年 4 月), 与那国島 (AV: 2004 年 4 月).

539. *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) シロビタイジョウビタキ

Shirobitai-jo-bitaki Common Redstart

Range: W and c Palearctic. Breeds in Europe and nw Africa, east to c Siberia and n Mongolia. Winters in c Africa and Arabian Peninsula.

539-1. *Phoenicurus phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) シロビタイジョウビタキ

Range: Breeds in Europe (except se) and nw Africa, east to c Siberia and n Mongolia. Winters to Africa.

Status: Hegurajima I. (AV: Nov. 1998).

舢倉島 (AV: 1998 年 11 月).

540. *Phoenicurus aureus* (Pallas, 1776) ジョウビタキ

Jo-bitaki Daurian Redstart

Range: E Palearctic. Breeds from se Tibet and w China northeast to Mongolia, Lake Baikal, lower Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Korea. Winters in temperate regions.

540-1. *Phoenicurus aureus aureus* (Pallas, 1776) ジョウビタキ

Range: Breeds in se Siberia from the west of Lake Baikal to the lower Amur Basin, Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Korea, and n China in Hopeh and Shansi; Two breeding records in Hokkaido and Nagano. Winters in Japan, s Korea, e and s China, Taiwan, Hainan, and n Indochina.

Status: Hokkaido (WV. CB: c Hokkaido), s Kurile Is. (IV: Kunashirito I.), Honshu (WV. CB: Nagano), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, urban areas.

北海道 (WV. CB: 中部), 南千島 (IV: 国後島), 本州 (WV. CB: 長野), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舢倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

農耕地, 疎林, 住宅地などに生息する.

SAXICOLA Bechstein ノビタキ属**541. *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758) マミジロノビタキ**

Mamijiro-no-bitaki Whinchat

Range: W Palearctic. Breeds from e Europe to w Siberia, northwest and e Asia Minor, Caucasus and nw Iran. Winters to Africa.

Status: Hegurajima I. (AV: Sep. - Oct. 2009), Okinawajima I. (AV: Sep. 1998).

舢倉島 (AV: 2009 年 9 - 10 月), 沖縄島 (AV: 1998 年 9 月).

542. *Saxicola torquatus* (Linnaeus, 1766) ノビタキ

No-bitaki African Stonechat

Range: Palearctic and Afrotropical. Breeds from w Europe eastward across Eurasia to the Okhotsk coast, Ussuriland, Sakhalin, and Japan, south to c Asia, Himalayas, and w China; also Africa (except the Sahara), Madagascar, and Comoros. Migratory and sedentary, northern birds wintering in temperate and tropical regions.

542-1. *Saxicola torquatus stejnegeri* (Parrot, 1908) ノビタキ

Range: Breeds in e Siberia east to the Kolyma Basin and the Okhotsk coast, south to e Mongolia, Amur Basin, Manchuria to n Hopeh, Ussuriland, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan. Winters to Assam, se Asia, s China, Taiwan, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n and c Honshu (MB), sw Honshu (PV. CB: Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV. CB: Fukuoka), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV, WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Open grasslands, meadows with scattered shrubs.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (PV. CB: 兵庫, 島根, 広島, 山口), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舢倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV. CB: 福岡), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV, WV), 大東諸島 (IV).

草原に生息する.

543. *Saxicola caprata* (Linnaeus, 1766) クロノビタキ

Kuro-no-bitaki Pied Bush Chat

Range: Sc Palearctic, Indomalayan, and locally Australasian. Breeds in Iran, Kazakhstan, Afghanistan, Pakistan and from India to se Asia. Northern population winters in India.

543-U. *Saxicola caprata* ssp. 亜種不明

Status: Awashima I. (AV: May 2004), Ryukyu Is. (AV: Kumejima I., Miyakojima I., May 2002, Yonagunijima I., Jan. 1989, Mar. 2004).

粟島 (AV: 2004 年 5 月), 琉球諸島 (AV: 久米島, 宮古島, 2002 年 5 月, 与那国島, 1989 年 1 月, 2004 年 3 月).

544. *Saxicola ferreus* Gray & Gray, 1847 ヤマザキヒタキ

Yamazaki-hitaki Grey Bush Chat

Range: S Asiatic. Breeds from e Afghanistan, nw India, and Himalayas eastward to se Tibet, Assam to n Vietnam, and w and s China north to the Yangtze Basin. Winters to w Pakistan, India, and se Asia.

Status: Tobishima I. (AV: May 2006), Hegurajima I. (AV: 1996, May 2003), Mishima I. (AV: Apr. 1993), Kyushu (AV: Saga, Apr. 1986), Koyajima I. (AV: 1996), Yakushima I. (AV: Mar. - Apr. 1979), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Mar. 2005, Iriomotejima I., Apr. 1983, Yonagunijima I., Mar. 1984, Mar. 1988, Mar. 2005).

飛島 (AV: 2006 年 5 月), 舩倉島 (AV: 1996 年, 2003 年 5 月), 見島 (AV: 1993 年 4 月), 九州 (AV: 佐賀, 1986 年 4 月), 小屋島 (AV: 1996 年), 屋久島 (AV: 1979 年 3 - 4 月), 八重山諸島 (AV: 石垣島, 2005 年 3 月, 西表島, 1983 年 4 月, 与那国島, 1984 年 3 月, 1988 年 3 月, 2005 年 3 月).

OENANTHE Vieillot サバクヒタキ属**545. *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) イナバヒタキ**

Inaba-hitaki Isabelline Wheatear

Range: Mainly c Palearctic. Breeds from se Europe, Asia Minor, Near East, and Caucasus eastward through c Asia to nw China, Mongolia, and Transbaikalia. Winters to tropical Africa, Arabia, Iran, and India; straggles to w Europe and Japan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV: Shikotanto I.), Honshu (AV: Akita,

Aug. 2007, Niigata, Sep. 1997, Chiba, Shizuoka, Nov. 1999, Aichi, Apr. 2000, Sep. 2008, Osaka, Tottori, between 1905 and 1910), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Oita, May 1997), Tsushima (AV: Apr. 1983), Okinawajima I. (AV: Sep. 2000), Yonagunijima I. (AV: Apr. 2005).

北海道 (AV), 南千島 (AV: 色丹島), 本州 (AV: 秋田, 2007 年 8 月, 新潟, 1997 年 9 月, 千葉, 静岡, 1999 年 11 月, 愛知, 2000 年 4 月, 2008 年 9 月, 大阪, 鳥取, 1905 - 1910 の間), 舩倉島 (AV), 九州 (AV: 大分, 1997 年 5 月), 対馬 (AV: 1983 年 4 月), 沖縄島 (AV: 2000 年 9 月), 与那国島 (AV: 2005 年 4 月).

546. *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) ハシグロヒタキ

Hashiguro-hitaki Northern Wheatear

Range: Holarctic. Breeds from w Europe and nw Africa east across Eurasia to the Chukot Peninsula, south to Iran, nw China, Mongolia, and nw Manchuria; also Somaliland in ne Africa, arctic North America, and Greenland. Winters to tropical Africa, Arabia, India, n China, and temperate North America.

546-1. *Oenanthe oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) ハシグロヒタキ

Range: Range of the species except the Iberian Peninsula, nw and ne Africa, ne Canada, and Greenland. E Palearctic birds winter mainly in Mongolia and n China; straggles to e China, Japan, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (AV: Sep. 1986, May 1998), Honshu (AV: Aomori, Oct. 2000, Akita, May 2002, Yamagata, Sep. 1994, Miyagi, May 1996, Tokyo, Nov. 1969, Shizuoka, Oct. 1998, Kyoto, Oct. 1972, Hyogo, Oct. 1998), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Oki (AV: May 1996), Mishima I. (AV: Apr. 1996), Kyushu (AV: Fukuoka, 1978), Tsushima (AV: May 1992), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Oct. 1988), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I., Apr. 1936), Miyakojima I. (AV: Sep. 1991), Iriomotejima I. (AV: Apr. 1996), Yonagunijima I. (AV: Sep. 2003, May 2005).

北海道 (AV: 1986 年 9 月, 1998 年 5 月), 本州 (AV: 青森, 2000 年 10 月, 秋田, 2002 年 5 月, 山形, 1994 年 9 月, 宮城, 1996 年 5 月, 東京, 1969 年 11 月, 静岡, 1998 年 10 月, 京都, 1972 年 10 月, 兵庫, 1998 年 10 月), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 隠岐 (AV: 1996 年 5 月), 見島 (AV: 1996 年 4 月), 九州 (AV: 福岡, 1978 年), 対馬 (AV: 1992 年 5 月), 小笠原群島 (AV: 父島, 1988 年 10 月), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島, 1936 年 4 月), 宮古島 (AV: 1991 年 9 月), 西表島 (AV: 1996 年 4 月), 与那国島 (AV: 2003 年 9 月, 2005 年 5 月).

547. *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770) セグロサバクヒタキ

Seguro-sabaku-hitaki Pied Wheatear

Range: S Palearctic. Breeds from Romania and s Russia east to c Asia, nw Himalayas, n China, Mongolia and Transbaikalia. Winters to tropical Africa and Arabia.

Status: Rishirito I. (AV: Apr. 1991), Honshu (AV: Aomori, May 1998, Oct. 2005, Akita, Apr. 2001, Miyagi, Apr. 1978, Ibaraki, Sep. 1984, Chiba, Sep. 1990, Ishikawa, Apr. 1976), Tobishima I. (AV: May 2005), Hegurajima I. (AV: May 1977, May 1978, Oct. 1981, Nov. 1987), Oki (AV: May 1999), Mishima I. (AV: May 1993), Tsushima (AV).

利尻島 (AV: 1991 年 4 月), 本州 (AV: 青森, 1998 年 5 月, 2005 年 10 月, 秋田, 2001 年 4 月, 宮城, 1978 年 4 月, 茨城, 1984 年 9 月, 千葉, 1990 年 9 月, 石川, 1976 年 4 月), 飛島 (AV: 2005 年 5 月), 舩倉島 (AV: 1977 年 5 月, 1978 年 5 月, 1981 年 10 月, 1987 年 11 月), 隠岐 (AV: 1999 年 5 月), 見島 (AV: 1993 年 5 月), 対馬 (AV).

548. *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825) サバクヒタキ

Sabaku-hitaki Desert Wheatear

Range: S Palearctic. Breeds from s Caucasus eastward through Iran and c Asia to Himalayas, Tibet, w and nw China, and Mongolia; also n Sahara and nw Arabia. Mainly migratory, wintering in ne Africa, Arabia, Iran, Pakistan, and nw India.

548-1. *Oenanthe deserti oreophila* (Oberholser, 1900) サバクヒタキ

Range: Breeds from Pamir and Tibet to the Himalayas, w and nw China. Winters in Arabia, Iran, Pakistan, and nw India; straggles to the Kurile Is. (Simushir I.) and Japan.

Status: Honshu (AV: Iwate, Miyagi, May 1991, Saitama, Nov. 1980, Tokyo, Jan. - Feb. 1968, Aichi, Oct. 1975, May 1980, Mie, Oct. 1983, Nara, Dec. 1988 - Mar. 1989, Hiroshima), Tobishima I. (AV: Oct. 1989), Hegurajima I. (AV: Nov. 1981), Mishima I. (AV: May 1993), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, 1998, Saga, Nov. 2009, Nagasaki, Kumamoto, 1986, Miyazaki, Kagoshima), Ogasawara Is. (AV: Hahajima I., Sep. 1981), Amami Is. (AV: Yoronjima I., Jan. 1981), Okinawajima I. (AV: Jan. 2007), Yonagunijima I. (AV: Feb. 2006).

本州 (AV: 岩手, 宮城, 1991 年 5 月, 埼玉, 1980 年 11 月, 東京, 1968 年 1 - 2 月, 愛知, 1975 年 10 月, 1980 年 5 月, 三重, 1983 年 10 月, 奈

良, 1988 年 12 月 - 1989 年 3 月, 広島), 飛島 (AV, 1989 年 10 月), 舩倉島 (AV, 1981 年 11 月), 見島 (AV: 1993 年 5 月), 四国 (AV: 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 1998 年, 佐賀, 2009 年 11 月, 長崎, 熊本, 1986 年, 宮崎, 鹿児島), 小笠原群島 (AV: 母島, 1981 年 9 月), 奄美諸島 (AV: 与論島, 1981 年 1 月), 沖縄島 (AV: 2007 年 1 月), 与那国島 (AV: 2006 年 2 月).

MONTICOLA Boie イソヒヨドリ属

549. *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758) イソヒヨドリ

Isohiyodori Blue Rock Thrush

Range: S Palearctic, marginally Indomalayan. Breeds from s Europe and nw Africa east through Asia Minor and Iran to Turkestan, Himalayas, China, Manchuria, Korea, s Sakhalin, s Kurile Is., and Japan; also Taiwan, Malay Peninsula, and n Sumatra. Partially migratory, wintering in temperate and tropical regions.

549-1. *Monticola solitarius pandoo* (Sykes, 1832) アオハライソヒヨドリ

Range: Breeds from Pamir and Himalayas east to Assam, s Tibet, and w and s China north to Tian Shan and s Shensi, Hainan, and n Vietnam. Winters to India, Sri Lanka, se Asia, s China, Malay Peninsula, Sumatra, and Borneo; straggles to Japan and Taiwan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Apr. 1985, Shizuoka), Mishima I. (AV: 1998), Kyushu (AV: Nagasaki, May 2002), Ogasawara Is. (AV: Imotojima I., Oct. 2011), Tokara Is. (AV: May 1988), Ishigakijima I. (AV: Feb. 2010), Iriomotejima I. (AV: Apr. 2009), Yonagunijima I. (AV: Mar. 1990).

本州 (AV: 宮城, 1985 年 4 月, 静岡), 見島 (AV: 1998 年), 九州 (AV: 長崎, 2002 年 5 月), 小笠原群島 (AV: 妹島, 2011 年 10 月), トカラ列島 (AV: 1988 年 5 月), 石垣島 (AV: 2010 年 2 月), 西表島 (AV: 2009 年 4 月), 与那国島 (AV: 1990 年 3 月).

549-2. *Monticola solitarius philippensis* (Müller, 1776) イソヒヨドリ

Range: Breeds in Manchuria, Ussuriland, s Sakhalin, Korea, and Japan, south to Shantung in e China, Taiwan, and n Philippines. Migratory and sedentary. Winters south to e China, Hainan, se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and Moluccas.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB: Kunashirito I., Shikotanto I.),

Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (RB), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (RB), Iwo Is. (RB), Tokara Is. (RB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB), Daito Is. (RB).

Habitat: Rocky places on sea coasts, occasionally cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB: 国後島, 色丹島), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (RB), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (RB), 硫黄列島 (RB), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB), 大東諸島 (RB).

海岸や島の岩石地に生息する。

550. *Monticola gularis* (Swinhoe, 1863) ヒメイソヒヨ

Hime-isohiyo White-throated Rock thrush

Range: E Palearctic. Breeds in s Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, and Ussuriland, south to n Korea and Hopeh in e China. Winters to c China, Vietnam, n Thailand, and c Myanmar. Accidental in Japan.

Status: Teurito I. (AV: May 1986), Honshu (AV: Akita, May 1969), Tobishima I. (AV: May 2007), Hegurajima I. (IV: May 1993, May 1994, May 1996, May 1998, etc.), Kyushu (AV: Fukuoka, May 1993), Goto Is. (AV: May 2008), Tokara Is. (AV: Nakanoshima I., Oct. 2007), Iriomotejima I. (AV: Feb. 1986).

天売島 (AV: 1986 年 5 月), 本州 (AV: 秋田, 1969 年 5 月), 飛島 (AV: 2007 年 5 月), 舩倉島 (IV: 1993 年 5 月, 1994 年 5 月, 1996 年 5 月, 1998 年 5 月等), 九州 (AV: 福岡, 1993 年 5 月), 五島列島 (AV: 2008 年 5 月), トカラ列島 (AV: 中之島, 2007 年 10 月), 西表島 (AV: 1986 年 2 月).

MUSCICAPA Brisson サメビタキ属

551. *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) ムナフヒタキ

Munafu-hitaki Spotted Flycatcher

Range: W and c Palearctic. Breeds from e Europe, Ural Mts. to w Siberia (Irtysh River) and nw Africa. Winters to w, e and s Africa.

551-1. *Muscicapa striata mongola* Portenko, 1955 ムナフヒタキ

Range: Breeds in se Altai, east to se Transbaikalia and n Mongolia. Winters to

(uncertain) e and s Africa.

Status: Hegurajima I. (AV: Sep. 2004).

舢倉島 (AV: 2004 年 9 月).

552. *Muscicapa griseisticta* (Swinhoe, 1861) エゾビタキ

Ezo-bitaki Grey-spotted Flycatcher

Range: E Palearctic. Breeds in the lower Amur Basin, e Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kamchatka, and Kurile Is. Winters to Philippines, Sulawesi, Moluccas, and nw New Guinea.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (PV. MB: Iwate), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed woods.

北海道 (MB), 本州 (PV. MB: 岩手), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舢倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV).

落葉広葉樹林, 混交林などに生息する.

553. *Muscicapa sibirica* Gmelin, 1789 サメビタキ

Same-bitaki Dark-sided Flycatcher

Range: E Asiatic. Breeds in s Siberia from the Altai eastward to n Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., Japan, and locally Kamchatka; also e Afghanistan to Assam, n Myanmar, se Tibet, and w China. Migratory and sedentary. Northern birds winter se Asia, Malay Peninsula, se China, Taiwan, Philippines, and Greater Sunda Is.

553-1. *Muscicapa sibirica sibirica* Gmelin, 1789 サメビタキ

Range: Range of the species except the Himalayan region, Tibet, and w China.

Status: Hokkaido (MB), n and c Honshu (MB), sw Honshu (PV. CB: Nara), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV. CB: Tokushima), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV), Daito Is. (IV).

Habitat: Chiefly in coniferous and mixed forests.

北海道 (MB), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (PV. CB: 奈良), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV. CB: 徳島), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV), 大東諸島 (IV).

亜高山の針葉樹林, 針広混交林で繁殖する.

554. *Muscicapa dauurica* Pallas, 1811 コサメビタキ

Ko-same-bitaki Asian Brown Flycatcher

Range: E Asiatic. Breeds in se Siberia from the Enisei to n Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan; also n India and the Himalayas to w China, and Sabah. Northern birds migratory, wintering to India, se Asia, Malay Peninsula, Philippines, and Greater Sunda.

554-1. *Muscicapa dauurica dauurica* Pallas, 1811 コサメビタキ

Range: Range of the species except the mountains of n Thailand, Vietnam, and Sabah. Casual in w Europe.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Iki (MB), Goto Is. (MB), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV: Kozushima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (PV: Okinawajima I., Agunijima I., Tokashikijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (IV).

Habitat: Light deciduous, mixed or coniferous woods in lowlands, occasionally suburban and urban areas.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (MB), 栗島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 壱岐 (MB), 五島列島 (MB), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV: 神津島, 式根島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (PV: 沖縄島, 栗国島, 渡嘉敷島, 宮古島, 石垣島, 与那国島), 大東諸島 (IV).

低山帯の森林に生息する.

555. *Muscicapa ferruginea* (Hodgson, 1845) ミヤマヒタキ

Miyama-hitaki Ferruginous Flycatcher

Range: Indomalayan. Breeds in the e Himalayas, ne India, c and s China, and n Vietnam. Winters in se Asia including Indochina, Greater Sundas, and Philippines. Also in Taiwan as resident.

Status: Honshu (AV: Aichi), Mishima I. (AV), Danjo Is. (AV: Meshima I.), Tokara Is. (AV: Tairajima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

本州 (AV: 愛知), 見島 (AV), 男女群島 (AV: 女島), トカラ列島 (AV: 平島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 宮古島, 与那国島).

FICEDULA Brisson キビタキ属

556. *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) マダラヒタキ

Madara-hitaki European Pied Flycatcher

Range: W and c Palearctic. Breeds from w Europe and nw Africa east through the Balkans, s Russia, and w Siberia to the Enisei River. Winters to tropical Africa.

556-1. *Ficedula hypoleuca sibirica* (Khakhlov, 1915) マダラヒタキ

Range: Breeds in w Siberia from the Urals to the Krasnoyarsk region on the Enisei. Winters possibly to tropical Africa; straggles to Japan.

Status: Honshu (AV: Miyagi, Oct. 2007), Hegurajima I. (AV: Oct. 1991, Sep. 2007).

本州 (AV: 宮城, 2007 年 10 月), 舩倉島 (AV: 1991 年 10 月, 2007 年 9 月).

557. *Ficedula zanthopygia* (Hay, 1845) マミジロキビタキ

Mamijiro-ki-bitaki Yellow-rumped Flycatcher

Range: E Palearctic. Breeds from e Mongolia and s Transbaikalia to the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Korea, south in e China to the lower Yangtze Basin. Winters to se Asia, Malay Peninsula, Sumatra, and Java; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Nagano, Toyama, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Aichi, Gifu, Ishikawa, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Awashima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Miyakojima I. (AV), Yaeyama Is. (AV),

Minami-Daitojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 長野, 富山, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 愛知, 岐阜, 石川, 滋賀, 京都, 大阪, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (IV), 宮古島 (AV), 八重山諸島 (AV), 南大東島 (AV).

558. *Ficedula narcissina* (Temminck, 1836) キビタキ

Ki-bitaki Narcissus Flycatcher

Range: E Palearctic. Breeds in Sakhalin, Japan south to the Ryukyu Is., n China in Hopeh, and occasionally Ussuriland. Winters to tropical Asia.

558-1. *Ficedula narcissina narcissina* (Temminck, 1836) キビタキ

Range: Breeds in Sakhalin and Japan from the s Kurile Is. to Kyushu and Tsushima, occasionally Ussuriland. Winters to se Asia, s China, Hainan, Philippines, and Borneo; straggles to France.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Izu Is. (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (WV, PV), Daito Is. (IV).

Habitat: Lowland forests, forest edge.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (WV, PV), 大東諸島 (IV).
主として低山帯の森林に生息する.

558-2. *Ficedula narcissina owstoni* (Bangs, 1901) リュウキュウキビタキ

Range: Breeds from Yakushima I. and Tanegashima I. south to the s Ryukyu Is. Probably sedentary in the Ryukyu Is.

Status: Honshu (AV: Shimane, May 1999), Yakushima I. (MB), Tanegashima I. (MB), Tokara Is. (MB), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB).

Habitat: Evergreen, mixed and mangrove forests.

本州 (AV: 島根, 1999 年 5 月), 屋久島 (MB), 種子島 (MB), トカラ列

島 (MB), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB).
常緑広葉樹林に生息する.

559. *Ficedula mugimaki* (Temminck, 1836) ムギマキ

Mugimaki Mugimaki Flycatcher

Range: C and e Palearctic. Breeds in se Siberia from the ne Altai east to the Okhotsk coast, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and Sakhalin. Winters to se Asia, Malay Peninsula, s China, Sumatra, Java, and Borneo.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Goto Is. (PV), Danjo Is. (PV), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (PV), Tokara Is. (PV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Lowland forests, forest edge.

北海道 (IV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 五島列島 (PV), 男女群島 (PV), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (PV), トカラ列島 (PV), 琉球諸島 (IV).

平地から山地の森林, 林縁などに生息する.

560. *Ficedula albicilla* (Pallas, 1811) オジロビタキ

Ojiro-bitaki Taiga Flycatcher

Range: Palearctic. Breeds from the Urals east to the Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to n Mongolia, Transbaikalia, and occasionally Ussuriland. Winters to India, Indochina, s China (Kwangtung), Hainan, and Malay Peninsula.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Akita, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Toyama, Ibaraki, Saitama, Chiba, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Nara, Wakayama, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Awashima I. (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (IV: Kagawa, Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Open mixed woodlands.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 秋田, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 富山, 茨城, 埼玉, 千葉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 奈良, 和歌山, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島,

山口), 粟島 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (IV: 香川, 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

疎林に生息する.

CYANOPTILA Blyth オオルリ属

561. *Cyanoptila cyanomelana* (Temminck, 1829) オオルリ

Oruri Blue-and-white Flycatcher

Range: E Palearctic. Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and Japan, south to Hopeh in e China. Winters to tropical Asia.

561-1. *Cyanoptila cyanomelana cumatilis* Thayer & Bangs, 1909 チョウセンオオルリ

Range: Breeds in the Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Korea, and south to Hopeh in e China. Winters to Laos, Vietnam, Greater Sundas, and Philippines.

Status: Kyushu (AV: Kuroshima I., Sep. 1997).

九州 (AV: 黒島, 1997 年 9 月).

561-2. *Cyanoptila cyanomelana cyanomelana* (Temminck, 1829) オオルリ

Range: Breeds in s Kurile Is., Japan, and Korea. Winters in Indochina, e China to Kwangtung, Taiwan, Philippines, and Borneo.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (MB), Awashima I. (PV), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (MB), Mishima I. (PV), Shikoku (MB), Kyushu (MB), Tsushima (MB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV. MB: Kozushima I.), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed forests.

北海道 (MB), 本州 (MB), 粟島 (PV), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (MB), 見島 (PV), 四国 (MB), 九州 (MB), 対馬 (MB), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV. MB: 神津島), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (IV).

広葉樹林, 針広混交林に生息する.

EUMYIAS Cabanis アイイロヒタキ属**562. *Eumyias thalassinus* (Swainson, 1838) ロクショウヒタキ**

Rokusho-hitaki Verditer Flycatcher

Range: Indomalayan. Breeds in the Himalayas, ne India, c and s China, Indochina, Sumatra, and Borneo. Northern population winters in India, s Indochina, and se China.

562-U. *Eumyias thalassinus* ssp. 亜種不明

Status: Ishigakijima I. (AV: Mar. 2011).

石垣島 (AV: 2011 年 3 月).

NILTAVA Hodgson アオヒタキ属**563. *Niltava vivida* (Swinhoe, 1864) チャバラオオルリ**

Chabara-oruri Vivid Niltava

Range: E Palearctic. Breeds in extreme ne India, s China, and Taiwan. Winters in Myanmar and Thailand.

563-1. *Niltava vivida vivida* (Swinhoe, 1864) チャバラオオルリ

Range: Taiwan as resident.

Status: Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., May 1989, Yonagunijima I., Mar. 1998).

琉球諸島 (AV: 沖縄島, 1989 年 5 月, 与那国島, 1998 年 3 月).

Family PRUNELLIDAE イワヒバリ科**PRUNELLA Vieillot カヤクグリ属****564. *Prunella collaris* (Scopoli, 1769) イワヒバリ**

Iwahibari Alpine Accentor

Range: Palearctic. Discrete montane distribution from c and s Europe and nw Africa eastward through the Caucasus, Iran, and Himalayas to China and Taiwan, north to s Siberia, Amur Basin, Ussuriland, and Japan. Sedentary, but winters to lower elevations and warmer areas.

564-1. *Prunella collaris erythropygia* (Swinhoe, 1870) イワヒバリ

Range: Breeds in se Siberia, Mongolia, Amur Basin, China from Manchuria to Hopeh and n Szechwan, Ussuriland, n Korea, and Japan (c Honshu).

Status: Hokkaido (AV), n and c Honshu (RB), sw Honshu (WV: Shiga, Nara. AV: Hyogo, Tottori, Shimane, Hiroshima), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Oita).

Habitat: Bare stony ground, barren slopes, alpine meadows.

北海道 (AV), 本州北・中部 (RB), 本州南西部 (WV: 滋賀, 奈良. AV: 兵庫, 鳥取, 島根, 広島), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 高知), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 大分).

本州の高山で繁殖し, 冬期はやや低い所へ漂行する.

565. *Prunella montanella* (Pallas, 1776) ヤマヒバリ

Yamahibari Siberian Accentor

Range: C and e Palearctic. Breeds from w Siberia to the Okhotsk coast and Chukot Peninsula, south to the Altai, Stanovoi Range, and Amur Basin. Winters to Mongolia, s Manchuria, n China, Korea, Sakhalin, and rarely Japan; straggles to Europe and Alaska.

565-U. *Prunella montanella* ssp. 亜種不明

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Yamagata, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Toyama, Ibaraki, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Osaka, Kyoto, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima), Sado (AV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Saga), Tsushima (AV).

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 山形, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 富山, 茨城, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 大阪, 京都, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 広島), 佐渡 (AV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 九州 (AV: 佐賀), 対馬 (AV).

566. *Prunella rubida* (Temminck & Schlegel, 1845) カヤクグリ

Kayakuguri Japanese Accentor

Range: E Palearctic. Breeds in Japan from Hokkaido and s Kurile Is. to c Honshu, Shikoku and Kyusyu. Sedentary, but winters to lower elevations and warmer areas.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), n Honshu (RB), c and sw Honshu (RB, WV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Oki (IV), Mishima I. (AV), Shikoku

(RB, WV), Kyushu (WV), Izu Is. (WV).

Habitat: Breeds in thickets and undergrowth of subalpine deciduous and mixed woods. Lowland scrub forests, forest edges in winter.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州北部 (RB), 本州中・南西部 (RB, WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (IV), 見島 (AV), 四国 (RB, WV), 九州 (WV), 伊豆諸島 (WV).

亜高山帯の低木林で繁殖し、冬には山麓や暖地の低木林、林縁に生息する。

Family PASSERIDAE スズメ科

PASSER Brisson スズメ属

567. *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) イエスズメ

Ie-suzume House Sparrow

Range: Palearctic and Indomalayan. Breeds from Europe and nw Africa east across Eurasia to India, Myanmar, w China, and lower Amur Basin; also Arabia, Nile Valley, and introduced to the Americas, West Indies, s Africa, Australia, and New Zealand. Mainly sedentary.

567-1. *Passer domesticus domesticus* (Linnaeus, 1758) イエスズメ

Range: Breeds from Europe east through Siberia to n Manchuria and Amur Basin, south to n Kazakhstan and n Mongolia. Introduced to the New World, s Africa, Australia, and New Zealand. Sedentary, but may migrate for short distance; casual in Japan.

Status: Hokkaido (AV: Apr. 1992), Rishirito I. (AV: Aug. 1990), Teurito I. (AV: May 1998), Hegurajima I. (AV: May 1994), Mishima I. (AV: Apr. 2008).

北海道 (AV: 1992 年 4 月), 利尻島 (AV: 1990 年 8 月), 天売島 (AV: 1998 年 5 月), 舩倉島 (AV: 1994 年 5 月), 見島 (AV: 2008 年 4 月).

568. *Passer rutilans* (Temminck, 1836) ニュウナイスズメ

Nyunai-suzume Russet Sparrow

Range: Indomalayan and e Palearctic. Breeds from nw India and Himalayas east through Assam and n Myanmar to n Indochina, s China, and Taiwan, north to Korea, s Manchuria, s Sakhalin, and n Japan. Mainly sedentary, but northern

birds winter to temperate regions.

568-1. *Passer rutilans rutilans* (Temminck, 1836) ニュウナイスズメ

Range: Breeds in c and s China west to e Shensi and e Szechwan, Korea, s Manchuria, s Sakhalin, and n Japan, north of c Honshu. Sedentary and migratory, wintering to sw Japan and e China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n and c Honshu (MB), sw Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (CB, PV), Izu Is. (WV: Hachijojima I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, rice fields, riverbeds.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北・中部 (MB), 本州南西部 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (CB, PV), 伊豆諸島 (WV: 八丈島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 西表島, 与那国島).

疎林, 林縁部, 林のある農耕地に生息し, 冬には水田, 畑地, ヨシ原などに生息する.

569. *Passer montanus* (Linnaeus, 1758) スズメ

Suzume Eurasian Tree Sparrow

Range: Palearctic and Indomalayan. Breeds from Europe east across Eurasia to Okhotsk coast, Sakhalin, Korea, Japan, China, Taiwan and Malay Peninsula, south to n Iran, Himalayas, and Greater Sunda Is. Introduced to North America, Philippines, Borneo, Sulawesi, and Australia. Mainly sedentary.

569-1. *Passer montanus saturatus* Stejneger, 1885 スズメ

Range: Resident in se China, Sakhalin, Japan (except the Ogasawara Is. and Iwo Is.), s Korea, Quelpart I., and Taiwan. Sedentary, but may winter to warmer areas.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (PV), Izu Is. (RB), Tokara Is. (IV), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB), Daito Is. (RB).

Habitat: Cultivated lands, residential areas.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島

(PV), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (PV), 屋久島 (RB), 種子島 (PV), 伊豆諸島 (RB), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB), 大東諸島 (RB).
農耕地, 村落, 住宅地に多数生息する.

Family MOTACILLIDAE セキレイ科

DENDRONANTHUS Blyth イワミセキレイ属

570. *Dendronanthus indicus* (Gmelin, 1789) イワミセキレイ

Iwami-sekirei Forest Wagtail

Range: E Palearctic. Breeds from c and w China to Manchuria, Korea, s Ussuriland, s Sakhalin, and sw Japan. Winters to India, Sri Lanka, se Asia, s China, Sumatra, Java, and Borneo.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV. CB: Tottori, Okayama, Shimane), Higurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (IV), Kyushu (IV. CB: Fukuoka, Saga), Tsushima (AV), Danjo Is. (IV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Deciduous and evergreen forests, cultivated fields, open woodlands.

北海道 (AV), 本州 (IV. CB: 鳥取, 岡山, 島根), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (IV), 九州 (IV. CB: 福岡, 佐賀), 対馬 (AV), 男女群島 (IV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (IV).

落葉広葉樹林, 常緑広葉樹林, 農耕地などに生息する.

MOTACILLA Linnaeus セキレイ属

571. *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 ツメナガセキレイ

Tsumenaga-sekirei Yellow Wagtail

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from Europe and nw Africa east across Eurasia to Anadyrland, Kamchatka, and w coasts of Alaska, south to Asia Minor, Iran, Altai, Mongolia, Ussuriland, and Sakhalin. Winters to tropical regions.

571-1. *Motacilla flava plexa* (Thayer & Bangs, 1914) シベリアツメナガセキレイ

Range: Breeds in n Siberia. Winters in se Asia; Myanmar and e Thailand to se China.

Status: Honshu (AV: Ibaraki, May 1998, Shimane, Yamaguchi), Tsushima (AV: May 1995), Okinawajima I. (AV: Mar. 1988).

本州 (AV: 茨城, 1998 年 5 月, 島根, 山口), 対馬 (AV: 1995 年 5 月), 沖縄島 (AV: 1988 年 3 月).

571-2. *Motacilla flava leucocephala* (Przewalski, 1887) カオジロツメナガセキレイ

Range: Breeds in nw Mongolia, nw China, and se Russia. Winters probably in India.

Status: Tokara Is. (AV: Tairajima I., May 1998, May 2011).

トカラ列島 (AV: 平島, 1998 年 5 月, 2011 年 5 月).

571-3. *Motacilla flava macronyx* (Stresemann, 1920) キタツメナガセキレイ

Range: Breeds from se Transbaikalia to the s Amur Basin and Ussuriland, south to ne Mongolia and c Manchuria. Winters to se Asia, Malay Peninsula, se China, and Sumatra.

Status: Honshu (IV: Aomori, Yamagata, Ibaraki, Kanagawa, Shizuoka, Mie, Shimane, Yamaguchi), Sado (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Kyushu (IV: Saga, Nagasaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Okinawajima I. (IV), Iriomotejima I. (IV), Yonagunijima I. (IV).

本州 (IV: 青森, 山形, 茨城, 神奈川, 静岡, 三重, 島根, 山口), 佐渡 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 九州 (IV: 佐賀, 長崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 奄美大島 (IV), 沖縄島 (IV), 西表島 (IV), 与那国島 (IV).

571-4. *Motacilla flava simillima* Hartert, 1905 マミジロツメナガセキレイ

Range: Breeds in the Shelekhova Gulf coast, Kamchatka, Commander Is. and n Kurile Is. Winters to Myanmar, Andaman Is., se Asia, Philippines, and Indonesia.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (PV), Honshu (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (IV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV),

Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (PV), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Open cultivated lands, marshes, grasslands.

北海道 (MB), 南千島 (PV), 本州 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (IV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (PV), 大東諸島 (AV: 南大東島).

農耕地, 湿原, 草原に生息する.

571-5. *Motacilla flava taivana* (Swinhoe, 1863) ツメナガセキレイ

Range: Breeds in se Siberia, w Okhotsk coast, Shantar Is., lower Amur Basin, Sakhalin, and n Japan. Winters to se Asia, Malay Peninsula, s China, Taiwan, Philippines, and Indonesia.

Status: N Hokkaido (MB), Honshu (IV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I., Hahajima I.), Amami-Oshima I. (PV), Ryukyu Is. (WV, PV).

Habitat: Open cultivated lands, marshes, grasslands.

北海道北部 (MB), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島, 母島), 奄美大島 (PV), 琉球諸島 (WV, PV).

農耕地, 湿原, 草原に生息する.

572. *Motacilla citreola* Pallas, 1776 キガシラセキレイ

Kigashira-sekirei Citrine Wagtail

Range: C Palearctic. Breeds in w Siberia, sw Russia, and from e Iran across c Asia and Tibet to Mongolia, Transbaikalia, and nw Manchuria. Winters to India, se Asia, and s China.

572-1. *Motacilla citreola citreola* Pallas, 1776 キガシラセキレイ

Range: Breeds in Finland, the three Baltic states and Poland, from nw Russia to Transbaikalia, upper Amur Basin, and nw Manchuria, south to the Altai and Mongolia. Winters to Baluchistan, India, se Asia, and s China; casual in Japan and w Europe.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Iwate, Yamagata, Ibaraki, Saitama, Niigata, Aichi, Shiga, Mie, Wakayama, Osaka, Hyogo, Tottori, Shimane,

Yamaguchi), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Oita, Kagoshima), Tsushima (IV), Danjo Is. (AV), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Kumejima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Open cultivated lands, grasslands, marshes, inland waters.

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 岩手, 山形, 茨城, 埼玉, 新潟, 愛知, 滋賀, 三重, 和歌山, 大阪, 兵庫, 鳥取, 島根, 山口), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 大分, 鹿児島), 対馬 (IV), 男女群島 (AV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 栗国島, 久米島, 宮古島, 石垣島, 与那国島).

農耕地, 草地, 湿地, 池沼に生息する.

573. *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 キセキレイ

Ki-sekirei Grey Wagtail

Range: Palearctic. Breeds from Europe and nw Africa east to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to Asia Minor, Iran, Himalayas, n China, and Japan. Winters south to tropical regions.

573-1. *Motacilla cinerea cinerea* Tunstall, 1771 キセキレイ

Range: Range of the species except Azores and Madeira.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (MB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (WV), Goto Is. (WV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (RB), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Mountain streams, cultivated lands. Near human habitations in winter.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (MB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (RB), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (WV).

繁殖期には, 山地の水辺に生息し, 冬には低地の農耕地, 水田跡, 住

宅地にも生息する。

574. *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 ハクセキレイ

Haku-sekirei White Wagtail

Range: Palearctic, marginally Nearctic. Breeds from Europe and nw Africa east through Eurasia to the coast of the Bering Sea and Japan, south to Iran and Himalayas; also w Alaska from Cape Lisburne south to St. Lawrence I. Mainly migratory, wintering to tropical regions.

574-1. *Motacilla alba dukhunensis* Sykes, 1832 ニシシベリアハクセキレイ

Range: Breeds from c Russia to Caucasus, nw Iran, and Altai Mts. Winters from Middle East to India.

Status: Yonagunijima I. (AV: Mar. 1999, Mar. 2002, Apr. 2009).

与那国島 (AV: 1999 年 3 月, 2002 年 3 月, 2009 年 4 月).

574-2. *Motacilla alba personata* Gould, 1861 メンガタハクセキレイ

Range: Breeds in c Asia from Transcaspia and n Iran, Afghanistan, n Pakistan, Kashmir, to s Russia, w Mongolia, and nw China. Winters in Iran and e Arabia to Indian Subcontinent.

Status: Kyushu (AV: Kumamoto, Apr. 2009, Kagoshima, May 2010), Izu Is. (AV: Kozushima I., Apr. 2011), Tokara Is. (AV: Nakanoshima I., Apr. 2002), Amami-Oshima I. (AV: Apr. 2010), Yaeyama Is. (AV: Ishigakijima I., Mar. 2002, Iriomotejima I., Mar. 2009, Yonagunijima I., Mar. 2008).

九州 (AV: 熊本, 2009 年 4 月, 鹿児島, 2010 年 5 月), 伊豆諸島 (AV: 神津島, 2011 年 4 月), トカラ列島 (AV: 中之島, 2002 年 4 月), 奄美大島 (AV: 2010 年 4 月), 八重山諸島 (AV: 石垣島, 2002 年 3 月, 西表島, 2009 年 3 月, 与那国島, 2008 年 3 月).

574-3. *Motacilla alba alboides* Hodgson, 1836 ネパールハクセキレイ

Range: Breeds in Himalayas include ne Pakistan, s China and n Myanmar. South to n Laos and n Vietnam winters in foothills to Bangladesh and n Thailand.

Status: Yonagunijima I. (AV: Feb. 1994).

与那国島 (AV: 1994 年 2 月).

574-4. *Motacilla alba baicalensis* Swinhoe, 1871 シベリアハクセキレイ

Range: Breeds in sc Siberia to Mongolia and ne China. Winters in n India to se

China and c Indochina.

Status: Honshu (AV: Shimane), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Tsushima (AV), Okinawajima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

本州 (AV: 島根), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 対馬 (AV), 沖縄島 (AV), 与那国島 (AV).

574-5. *Motacilla alba ocularis* Swinhoe, 1860 タイワンハクセキレイ

Range: Breeds in ne Siberia from the Enisei River to the Chukot Peninsula, south to about 60° N. Winters to Assam, s China, Taiwan, and Philippines.

Status: Honshu (AV: Yamagata, Niigata, Saitama, Ishikawa, Shiga, Osaka, Tottori, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (IV: Fukuoka, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Yonagunijima I.), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

本州 (AV: 山形, 新潟, 埼玉, 石川, 滋賀, 大阪, 鳥取, 島根, 山口), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (IV: 福岡, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 粟国島, 与那国島), 大東諸島 (AV: 南大東島).

574-6. *Motacilla alba lugens* Gloger, 1829 ハクセキレイ

Range: Breeds in the Okhotsk coast north to Ayan, lower Amur Basin, coast of Ussuriland, Sakhalin, Kamchatka, Commander Is., Kurile Is., Korea, and Japan. Winters to se China, Taiwan, and Japan.

Status: Hokkaido (MB, RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB), sw Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (RB), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (WV).

Habitat: Sea coasts, marshes, cultivated fields, residential areas.

北海道 (MB, RB), 南千島 (RB), 本州 (RB), 本州南西部 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (RB), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (WV).

海岸, 湿地, 草原, 農耕地, 市街地などの開けた場所に生息する.

574-7. *Motacilla alba leucopsis* Gould, 1838 ホオジロハクセキレイ

Range: Breeds in the lower Amur Basin, w Ussuriland, Korea, China from Manchuria and ne Xikang south to Kwangsi and Kwangtung, sw Honshu, and Taiwan. Winters to the Himalayas, se Tibet, Assam, s China, and Taiwan.

Status: Hokkaido (AV), s Kurile Is. (AV), Honshu (IV. CB: Niigata, Ibaraki, Osaka, Tottori, Yamaguchi), Awashima I. (CB), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Oki (IV), Shikoku (IV), Kyushu (PV, CB: Fukuoka, Saga), Tsushima (WV, CB), Danjo Is. (PV), Goto Is. (WV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (PV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV: Minami-Daitojima I.).

Habitat: Sea coasts, marshes, cultivated fields.

北海道 (AV), 南千島 (AV), 本州 (IV. CB: 新潟, 茨城, 大阪, 鳥取, 山口), 粟島 (CB), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 隠岐 (IV), 四国 (IV), 九州 (PV, CB: 福岡, 佐賀), 対馬 (WV, CB), 男女群島 (PV), 五島列島 (WV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (PV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV: 南大東島).

海岸, 湿地, 草原, 農耕地などの開けた場所に生息する.

575. *Motacilla grandis* Sharpe, 1885 セグロセキレイ

Seguro-sekirei Japanese Wagtail

Range: E Palearctic. Breeds in Japan from Hokkaido southward to Honshu, Sado, Shikoku, Kyushu and Oki, s Korea once. Sedentary but also winters to the Izu Is., Okinawajima I., and Korea; straggles to s Sakhalin, Taiwan, and Hopeh in n China.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (AV), Oki (RB), Mishima I. (IV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV), Tokara Is. (AV), Amami Is. (AV: Amami-Oshima I., Yoronjima I.), Okinawajima I. (IV), Iriomotejima I. (AV).

Habitat: River beds, lake shores, cultivated fields, residential areas.

北海道 (MB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (AV), 隠岐 (RB), 見島 (IV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV), トカラ列島 (AV), 奄美諸島 (AV: 奄美大島, 与論島), 沖縄島 (IV), 西表島 (AV).

河原, 湖畔, 農耕地, 住宅地に生息する.

ANTHUS Bechstein タヒバリ属

576. *Anthus richardi* Vieillot, 1818 マミジロタヒバリ

Mamijiro-tahibari Richard's Pipit

Range: Palearctic. Breeds in w Siberia and e Russian, Turkestan, east to the Okhotsk coast, south through China. Northern birds migratory, winters mainly to s and se Asia.

576-1. *Anthus richardi richardi* Vieillot, 1818 マミジロタヒバリ

Range: Breeds in sw Siberia and ne Kazakhstan, east to Lake Baikal. Winters mainly to sw Asia.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Yamagata, Niigata, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Mie, Wakayama, Osaka, Tottori, Shimane, Yamaguchi), Sado (AV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (AV: Tokushima, Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Izu Is. (AV: Miyakejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (PV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated fields, paddy fields, marshes.

北海道 (AV), 本州 (AV: 山形, 新潟, 福島, 茨城, 千葉, 東京, 静岡, 愛知, 三重, 和歌山, 大阪, 鳥取, 島根, 山口), 佐渡 (AV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (AV: 徳島, 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 伊豆諸島 (AV: 三宅島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (PV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV: 北大東島).

農耕地, 水田, 湿地など開けた場所に生息する.

577. *Anthus godlewskii* (Taczanowski, 1876) コマミジロタヒバリ

Ko-mamijiro-tahibari Blyth's Pipit

Range: E Palearctic. Breeds from Transbaikalia and nw Manchuria southward through Mongolia to Ala Shan. Winters to India, Sri Lanka, and Nepal to Assam; casual in Korea and Japan.

Status: Hokkaido (AV: Oct. 1987), Honshu (AV: Niigata, Chiba, Shizuoka, Mie, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Nagasaki, Oita, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV), Amami-

Oshima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Iriomotejima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

北海道 (AV: 1987 年 10 月), 本州 (AV: 新潟, 千葉, 静岡, 三重, 岡山, 島根, 山口), 飛島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 長崎, 大分, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 宮古島 (AV), 西表島 (AV), 与那国島 (AV).

578. *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) マキバタヒバリ

Makiba-tahibari Meadow Pipit

Range: W Palearctic. Breeds in se Greenland, Iceland, nw Europe to w Siberia. Also isolated population in Caucasus. Winters in n Africa, Asia Minor, and s Europe.

578-U. *Anthus pratensis* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (AV: Kyoto, Feb. - Apr. 2011), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Feb. 1997), Amami-Oshima I. (AV: Dec. 2006), Okinawajima I. (AV: Feb. 1999), Yonagunijima I. (AV: Dec. 2002).

本州 (AV: 京都, 2011 年 2 - 4 月), 舩倉島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 1997 年 2 月), 奄美大島 (AV: 2006 年 12 月), 沖縄島 (AV: 1999 年 2 月), 与那国島 (AV: 2002 年 12 月).

579. *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパビンズイ

Yoroppa-binzui Tree Pipit

Range: W and c Palearctic. Breeds from Europe eastward to Lake Baikal and middle Lena, south to the Mediterranean regions, Asia Minor, n Iran, and nw Himalayas. Winters to tropical Africa and India.

579-1. *Anthus trivialis trivialis* (Linnaeus, 1758) ヨーロッパビンズイ

Range: Range of the species except c Asia to the Himalayas and n India. Winters to the Mediterranean regions, Africa, s Iran, Afghanistan, and India; casual in Japan.

Status: Honshu (AV: Niigata, Feb. 1965), Tobishima I. (IV), Hegurajima I. (IV), Kyushu (AV: Kagoshima, Jun. 1995), Tsushima (AV: May 1993), Tokara Is. (AV), Okinawajima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

本州 (AV: 新潟, 1965 年 2 月), 飛島 (IV), 舩倉島 (IV), 九州 (AV: 鹿児島, 1995 年 6 月), 対馬 (AV: 1993 年 5 月), トカラ列島 (AV), 沖縄島 (AV), 宮古島 (AV), 与那国島 (AV).

580. *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 ビンズイ

Binzui Olive-backed Pipit

Range: C and e Palearctic. Breeds from w Siberia eastward to the Okhotsk coast, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kamchatka, and Kurile Is., south to the Himalayas, w China, Korea, and Japan. Winters to India, se Asia, s China, Taiwan, and Philippines.

580-1. *Anthus hodgsoni yunnanensis* Uchida & Kuroda, 1916 カラフトビンズイ

Range: Range of the species except from the Himalayas to w China, Korea, and Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (AV: Yamagata, Niigata), Kyushu (WV: Saga).

Habitat: Grasslands, cultivated fields.

北海道 (IV), 本州 (AV: 山形, 新潟), 九州 (WV: 佐賀).

草原, 農耕地などに生息する.

580-2. *Anthus hodgsoni hodgsoni* Richmond, 1907 ビンズイ

Range: Breeds from the Himalayas to w China, Korea, and Japan. Both *A. h. yunnanensis* and *A. h. hodgsoni* winter in the same area.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (MB), c and sw Honshu (RB, WV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (RB, WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Breed in forests and grasslands. Pine forests in winter.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (RB, WV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (RB, WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV).

森林, 草原で繁殖し, 冬季は松林に生息することが多い.

581. *Anthus gustavi* Swinhoe, 1863 セジロタヒバリ

Sejiro-tahibari Pechora Pipit

Range: C and e Palearctic. Breeds from w Siberia east through n Siberia to the Chukot Peninsula, Kamchatka, and Commander Is.; also s Ussuriland and ne China. Winters to south to the Philippines, Lesser Sunda Is., Borneo, Sulawesi,

and Moluccas.

581-1. *Anthus gustavi gustavi* Swinhoe, 1863 セジロタヒバリ

Range: Range of the species except the Commander Is. and s Ussuriland and ne China; rare in Japan on migration.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Niigata, Chiba, Saitama, Shizuoka, Wakayama, Tottori, Shimane, Yamaguchi), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Ryukyu Is. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 新潟, 千葉, 埼玉, 静岡, 和歌山, 鳥取, 島根, 山口), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 鹿児島), 対馬 (PV), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (AV), 琉球諸島 (AV).

582. *Anthus roseatus* Blyth, 1847 ウスベニタヒバリ

Usubeni-tahibari Rosy Pipit

Range: Se Palearctic and n Indomalayan. Breeds in mountains from ne Afghanistan and Himalayas eastward to w China, include ne India and se China, probably also n and ne Myanmar. Winters to s and n India, Bangladesh, and n Thailand.

Status: Kyushu (AV: Fukuoka, Jan. - Mar. 2009).

九州 (AV: 福岡, 2009 年 1 - 3 月).

583. *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) ムネアカタヒバリ

Muneaka-tahibari Red-throated Pipit

Range: N Palearctic. Breeds from n Scandinavia east through Siberian tundras to the Chukot Peninsula and nw Alaska, also in Kamchatka and n Kurile Is. Winters to n India, se Asia, Philippines, Borneo, and Sulawesi; straggles to Baja California.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (PV), Honshu (PV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (AV: Kita-Iwoto I.), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV: Kita-Daitojima I., Minami-Daitojima I.).

Habitat: Cultivated lands, wet grasslands, swampy areas.

北海道 (IV), 南千島 (PV), 本州 (PV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島

(PV), 見島 (PV), 四国 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (AV: 北硫黄島), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV: 北大東島, 南大東島).

農耕地, 草原, 水田, 湿地, 河口部などに生息する.

584. *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771) タヒバリ

Tahibari Buff-bellied Pipit

Range: Holarctic. Breeds from c Siberia to the Okhotsk coast and Kamchatka, south to lower Amur Basin, Sakhalin, and Kurile Is.; also w Greenland and North America. Winters to temperate and tropical regions.

584-1. *Anthus rubescens japonicus* Temminck & Schlegel, 1847 タヒバリ

Range: Breeds in se Siberia east of Lake Baikal, lower Amur Basin, Sakhalin, Kamchatka, and Kurile Is. Winters to n India, se Asia, and s China; straggles to Alaska.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (WV), Tokara Is. (PV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Cultivated lands, grassland, swampy areas, sea coasts.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (WV), トカラ列島 (PV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV).

農耕地, 湿地, 海岸, 草原などの開けた場所に生息する.

Family FRINGILLIDAE アトリ科

FRINGILLA Linnaeus アトリ属

585. *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 ズアオアトリ

Zu-ao-atori Common Chaffinch

Range: W and c Palearctic. Breeds from w Europe and n Africa east to c Siberia (east to the upper Enisei) and Transcaspia, south to Asia Minor and Iran; also Azores, Canaries, and Crete. Northern birds migratory, wintering to Egypt, Iraq, and w Asia.

585-1. *Fringilla coelebs coelebs* Linnaeus, 1758 ズアオアトリ

Range: Range of the species except the British Isles, Caucasus, Transcaspia, Crete, n Africa, Azores, Madeira, and Canaries; accidental in Japan.

Status: Rishirito I. (AV: Apr. 1990).

利尻島 (AV: 1990 年 4 月). 1 例の記録がある.

586. *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 アトリ

Atori Brambling

Range: N Palearctic. Breeds from Scandinavia east through Siberia to Okhotsk coast, Sakhalin and Kamchatka, south to n Baltic States, the Kazan region in w Russia, Altai, nw Mongolia, and the lower Amur Basin. Winters to Europe, n Africa, Near East, s China, Korea, Japan, and occasionally Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Open woods, tall bushes, cultivated fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

疎林, 低木林, 農耕地に生息する.

CHLORIS Cuvier カワラヒワ属

587. *Chloris sinica* (Linnaeus, 1766) カワラヒワ

Kawara-hiwa Oriental Greenfinch

Range: E Palearctic. Breeds in Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., and Kamchatka, south to w and e China to Szechwan and Kwantung,

Korea, and Japan. Northern birds migratory, wintering to warmer regions.

587-1. *Chloris sinica kawarahiba* (Temminck, 1836) オオカワラヒワ

Range: Breeds in Kamchatka, n Kurile Is. south at least to Simushir I., and Sakhalin. Winters to Japan; casual in Taiwan.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Hegurajima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Yakushima I. (WV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (WV: Okinawajima I., Iheyajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Taketomijima I., Kohamajima I., Kuroshima I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 舩倉島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 屋久島 (WV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (WV: 沖縄島, 伊平屋島, 宮古島, 石垣島, 竹富島, 小浜島, 黒島).

村落周辺, 疎林, 農耕地に生息する.

587-2. *Chloris sinica minor* (Temminck & Schlegel, 1848) カワラヒワ

Range: Breeds in Japan, and Quelpart I. Sedentary, but northern birds wintering to sw Japan.

Status: Hokkaido (MB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Oki (RB), Hegurajima I. (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Goto Is. (RB), Izu Is. (RB), Tokara Is. (RB), Amami-Oshima I. (IV), Zamamijima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Kita-Daitojima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, river beds, shrubby, residential areas.

北海道 (MB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 隠岐 (RB), 舩倉島 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 五島列島 (RB), 伊豆諸島 (RB), トカラ列島 (RB), 奄美大島 (IV), 座間味島 (AV), 宮古島 (AV), 北大東島 (AV).

疎林, 農耕地, 河川敷, 灌木草原, 住宅地に生息する.

587-3. *Chloris sinica kittlitzi* (Seeböhm, 1890) オガサワラカワラヒワ

Range: Resident on Ogasawara Is. and Iwo Is.

Status: Ogasawara Is. (WV: Hahajima I. RB: Hirashima I., Mukoujima I., An-ejima I., Imotojima I., Meijima I. FB: Mukojima I., Chichijima I.), Iwo Is. (FB: Kita-Iwoto I., Iwoto I. RB: Minami-Iwoto I.).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands.

小笠原群島 (WV: 母島. RB: 平島, 向島, 姉島, 妹島, 姪島. FB: 賀島,

父島), 硫黄列島 (FB: 北硫黄島, 硫黄島. RB: 南硫黄島).
疎林, 農耕地に生息する.

CARDUELIS Brisson マヒワ属

588. *Carduelis spinus* (Linnaeus, 1758) マヒワ

Ma-hiwa Eurasian Siskin

Range: Palearctic. Two widely separated populations in w and e Palearctic. Breeds in the west from the British Isles and Scandinavia east to w Siberia in the Omsk and Novosibirsk regions, south to the Pyrenees, Alps, Asia Minor, and n Iran and, with a wide gap in c Eurasia, from s Sakha south to Amur Basin, s Okhotsk coast, Ussuriland, Sakhalin, and n Japan (north of c Honshu). Winters to s Europe, nw Africa, Near East, and s Iran in the west, and e China to Fukien and Kwangtung, Korea, Japan, and Taiwan in the east; casual in Philippines.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (WV. RB: Aomori. CB: Niigata, Ishikawa), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV. CB: Tokushima), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (WV), Iwo Is. (PV), Tokara Is. (WV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Breeds in coniferous and mixed forests. Open woodlands, cultivated lands in winter.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (WV. RB: 青森. CB: 新潟, 石川), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV. CB: 徳島), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (WV), 硫黄列島 (PV), トカラ列島 (WV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

常緑針葉樹林や針広混交林で繁殖し, 冬には低地の疎林や農耕地などに飛来する.

589. *Carduelis flammea* (Linnaeus, 1758) ベニヒワ

Beni-hiwa Common Redpoll

Range: N Holarctic. Breeds from the British Isles and n Scandinavia east through arctic Siberia to Chukot Peninsula and Kamchatka, south to the Sayans, the Stanovoi Range, and Sakhalin; also in Iceland, the Alps, arctic North America, and s Greenland. Winters to s Europe, Caucasus, Turkestan, Mongolia,

e China to the lower Yangtze Basin, Japan, and n US.

589-1. *Carduelis flammea flammea* (Linnaeus, 1758) ベニヒワ

Range: Range of the species except Iceland, the British Isles, the Alps, Baffin I., and Greenland.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (IV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV), Kyushu (AV), Tsushima (AV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Iriomotejima I.).

Habitat: Open deciduous woods, bushes, cultivated lands, grasslands.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (IV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV), 九州 (AV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 西表島).

開けた落葉広葉樹林, 低木林, 農耕地, 草原などに生息する.

590. *Carduelis hornemanni* (Holböll, 1843) コベニヒワ

Ko-beni-hiwa Arctic Redpoll

Range: N Holarctic. Breeds in arctic tundras in Eurasia and North America from Lapland east through northernmost Russia, Siberia and n Kamchatka to Alaska and n Canada, south to Quebec and Labrador; also Baffin I. and n Greenland. Winters to temperate regions south to Baltic states, n Mongolia, and n US, occasionally to e China, Korea, and Japan.

590-1. *Carduelis hornemanni exilipes* (Coues, 1862) コベニヒワ

Range: Range of the species except Ellsmere I., Baffin I., and Greenland.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (AV: Aomori, Tochigi, Toyama, Ishikawa, Nagano, Gifu, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (AV).

Habitat: Open deciduous woods, bushes.

北海道 (IV), 本州 (AV: 青森, 栃木, 富山, 石川, 長野, 岐阜, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV).

開けた落葉広葉樹林, 低木林などに生息する.

LEUCOSTICTE Swainson ハギマシコ属

591. *Leucosticte arctoa* (Pallas, 1811) ハギマシコ

Hagi-mashiko Asian Rosy Finch

Range: E Palearctic. Breeds in the mountains of c and e Siberia from the Altai

and Sayans to n Mongolia, Transbaikalia, Koryakland, Kamchatka, and n Kurile Is. Sedentary but winters in lower elevations and warmer areas.

591-1. *Leucosticte arctoa brunneonucha* (Brandt, 1842) ハギマシコ

Range: Breeds in the mountains of e Siberia from Lena River to Koryakland and Kamchatka, south to Stanovoi and Tukuringra mountains, n Kurile Is., and possibly in the mountains of Hokkaido. Winters to Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan south to Kyushu.

Status: Hokkaido (RB, WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (WV), Kyushu (IV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV: Hachijojima I.).

Habitat: Barren and rocky fields with scattered vegetation, open woodlands.

北海道 (RB, WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (WV), 九州 (IV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV: 八丈島).

高標高の岩礫地, 崖地に生息し, 冬には海岸の崖地, 疎林, 草原, 荒地などに飛来する.

URAGUS Keyserling & Blasius ベニマシコ属

592. *Uragus sibiricus* (Pallas, 1773) ベニマシコ

Beni-mashiko Long-tailed Rosefinch

Range: C and e Palearctic. Breeds in s Siberia from the Novosibirsk region east to the Altai, n Mongolia, Transbaikalia, and lower Amur Basin, south to Manchuria, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, s Kurile Is., and n Japan south to n Honshu; also w China from Sikang and Szechwan to Shensi. Migratory and sedentary, northern birds wintering to the Tian Shan, Dzungaria, n China (Hopeh), s Korea, and sw Japan.

592-1. *Uragus sibiricus sanguinolentus* (Temminck & Schlegel, 1848) ベニマシコ

Range: Breeds in Sakhalin and n Japan from s Kurile Is. to northernmost Honshu. Winters in Japan south to Honshu, rarely Kyushu.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (CB: Aomori. WV), Awashima I. (WV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (IV: Shikinejima I.), Ogasawara Is. (AV: Hahajima I.).

Habitat: Forest edge, shrubby grasslands, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (CB: 青森. WV), 粟島 (WV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (IV: 式根島), 小笠原群島 (AV: 母島).

灌木草原, 林縁, 林のある農耕地などに生息する.

CHAUNOPROCTUS Bonaparte オガサワラマシコ属

593. *Chaunoproctus ferreorostris* (Vigors, 1829) オガサワラマシコ

Ogasawara-mashiko Bonin Grosbeak

Range: E Palearctic. Endemic to Ogasawara Is.

Status: Ogasawara Is. (FB: Chichijima I.). About 10 specimens were collected in 1827 and 1828. Extinct.

Habitat: Coastal forests.

小笠原群島 (FB: 父島). 1827 - 1828 年に約 10 羽が採集された. 絶滅. 海岸の森林に生息していた.

CARPODACUS Kaup オオマシコ属

594. *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) アカマシコ

Aka-mashiko Common Rosefinch

Range: Palearctic. Breeds from ne Europe east across Siberia to Anadyrland and Kamchatka, south to s Russia, Altai, Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, and n Sakhalin; also from Asia Minor and Caucasus east through the Himalayas to mountains of w and s China. Winters to s Asia.

594-1. *Carpodacus erythrinus grebnitskii* Stejneger, 1885 アカマシコ

Range: Breeds in e Siberia from Lena River to Anadyrland and Kamchatka, south to Mongolia, Ussuriland, and n Sakhalin. Winters to s China, south of Yangtze Basin; casual in Japan and Quelpart I.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (AV: Yamagata, Niigata, Tochigi, Toyama, Saitama, Yamanashi, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Fukui, Mie, Kyoto, Hyogo, Tottori, Shimane), Sado (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Futaoijima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime, Kochi), Kyushu (AV: Fukuoka, Nagasaki, Kagoshima), Tsushima (IV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Tokara Is. (AV: Tairajima I.), Amami-Oshima I. (AV), Agunijima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, grasslands.

北海道 (IV), 本州 (AV: 山形, 新潟, 栃木, 富山, 埼玉, 山梨, 静岡, 愛知, 石川, 福井, 三重, 京都, 兵庫, 鳥取, 島根), 佐渡 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 蓋井島 (AV), 四国 (AV: 愛媛, 高知), 九州 (AV: 福岡, 長崎, 鹿児島), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), トカラ列島 (AV: 平島), 奄美大島 (AV), 栗国島 (AV), 与那国島 (AV).

疎林, 草原などに生息する.

595. *Carpodacus roseus* (Pallas, 1776) オオマシコ

O-mashiko Pallas's Rosefinch

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and e Siberia from the Altai east to se Sakha, south to the Sayans, n Lake Baikal, Stanovoi Range, and Sakhalin. Winters to Manchuria, Ussuriland, Korea, Sakhalin, and Japan, south to e China, north of Yangtze Basin, and the Zaisan Nor region; casual in w Russia and c Europe.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (AV), Sado (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (IV: Tokushima), Kyushu (IV), Tsushima (AV), Tokara Is. (AV: Akusekijima I.), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Ishigakijima I.).

Habitat: Open woodlands, forest edge, low bushes in cultivated lands and riverbeds.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 栗島 (AV), 佐渡 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (IV: 徳島), 九州 (IV), 対馬 (AV), トカラ列島 (AV: 悪石島), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 石垣島).

疎林, 農耕地に接する低木林などに生息する.

PINICOLA Vieillot ギンザンマシコ属

596. *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758) ギンザンマシコ

Ginzan-mashiko Pine Grosbeak

Range: Holarctic. Breeds from n Scandinavia east across n Siberia to Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to the mountains of s Siberia, n Mongolia, Stanovoi Range, Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido; also n North America south to w US. Northern birds winter to temperate regions.

596-1. *Pinicola enucleator kamtschatkensis* (Dybowski, 1883) コバシギ

ンザンマシコ

Range: Breeds in Russian Far East and Kamchatka. Mainly sedentary, occasionally wintering to Sakhalin and Kurile Is.; straggles to Commander Is., Pribilof Is., and Japan.

Status: Hokkaido (AV: 1986 - 1987), Honshu (AV: Niigata, Feb. 1957), Hegurajima I., (AV: Nov. 2001).

北海道 (AV: 1986 - 1987 年), 本州 (AV: 新潟, 1957 年 2 月), 舩倉島 (AV: 2001 年 11 月).

596-2. *Pinicola enucleator sakhalinensis* Buturlin, 1915 ギンザンマシコ

Range: Breeds in Sakhalin, Kurile Is., and Hokkaido. Mainly sedentary; casual in Honshu.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), Honshu (IV: Iwate, Yamagata, Miyagi, Akita, Niigata, Gunma, Nagano, Toyama, Chiba, Aichi, Ishikawa, Shiga, Kyoto, Tottori, Hiroshima), Hegurajima I. (IV).

Habitat: Dwarf pine forests in summer, coniferous forests in winter.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州 (IV: 岩手, 山形, 宮城, 秋田, 新潟, 群馬, 長野, 富山, 千葉, 愛知, 石川, 滋賀, 京都, 鳥取, 広島), 舩倉島 (IV).

ハイマツ林で繁殖し, 冬期にはより低地の針葉樹林に生息する.

LOXIA Linnaeus イスカ属**597. *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758 イスカ**

Isuka Common Crossbill

Range: Holarctic, marginally neotropical. Breeds from w Europe and nw Africa east through Siberia to Okhotsk coast and Amur Basin, south to the Altai, n Mongolia, Transbaikalia, Ussuriland, and n Japan; also Asia Minor, Caucasus, Turkestan, Himalayas to w China, s Assam, n Luzon, and North America south to Nicaragua. Mainly sedentary, but more or less nomadic and irruptive.

597-1. *Loxia curvirostra japonica* Ridgway, 1884 イスカ

Range: Breeds in the lower Amur Basin, Ussuriland, and n Japan from Hokkaido south to the mountains in c Honshu. Recorded from Hopeh, Sakhalin, and Kurile Is. Sedentary and migratory, wintering to Manchuria, Korea, e China south to Yangtze Basin, and Japan.

Status: Hokkaido (RB, WV), s Kurile Is. (RB), Honshu (RB: Miyagi, Nagano,

Yamanashi. CB: Tottori, Shimane. WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (AV), Iwo Is. (AV: Iwoto I.), Tokara Is. (AV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Miyakojima I.).

Habitat: Coniferous and mixed forests, open woodlands.

北海道 (RB, WV), 南千島 (RB), 本州 (RB: 宮城, 長野, 山梨. CB: 鳥取, 島根. WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (AV), 硫黄列島 (AV: 硫黄島), トカラ列島 (AV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 宮古島).
山地の針葉樹林, 針広混交林に生息する.

598. *Loxia leucoptera* Gmelin, 1789 ナキイスカ

Naki-isuka Two-barred Crossbill

Range: Holarctic. Breeds from n Scandinavia and ne Russia east across Siberia to Sakha; also North America south to s Canada and n New York. Mainly sedentary, but more or less nomadic and irruptive and winters to Europe, e China, and Sakhalin.

598-1. *Loxia leucoptera bifasciata* (Brehm, 1827) ナキイスカ

Range: Range of the species except North America. Casual in Japan.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Ibaraki, Saitama, Kanagawa, Shiga, Mie, Wakayama, Kyoto, Osaka, Okayama, Shimane. CB: Tottori), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Kumamoto), Tsushima (AV), Izu Is. (AV).

Habitat: Coniferous and mixed forests, open woodlands.

北海道 (IV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 山形, 宮城, 福島, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 茨城, 埼玉, 神奈川, 滋賀, 三重, 和歌山, 京都, 大阪, 岡山, 島根. CB: 鳥取), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 九州 (AV: 熊本), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV).

針葉樹林, 針広混交林に生息する.

PYRRHULA Brisson ウソ属

599. *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758) ウソ

Uso Eurasian Bullfinch

Range: Palearctic. Breeds from w Europe and Azores east across Siberia to

Okhotsk coast and Kamchatka, south to the Caucasus, n Iran, Altai, n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan. Migratory and sedentary, wintering to temperate Eurasia.

599-1. *Pyrrhula pyrrhula cassinii* Baird, 1869 ベニバラウソ

Range: Breeds on the n Okhotsk coast south to Ayan, Kamchatka, and n Kurile Is. (Paramushir I.). Winters irregularly or accidentally to the lower Amur Basin, Hopeh in e China, Ussuriland, Korea, Sakhalin, and rarely Japan; casual in St. Lawrence I. and Alaska.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), Honshu (AV: Yamagata, Miyagi, Niigata, Toyama, Nagano, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Osaka, Wakayama, Tottori, Okayama, Shimane, Hiroshima), Sado (AV), Hegurajima I. (AV), Kyushu (AV: Nagasaki, Miyazaki).

Habitat: Coniferous and mixed forests.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州 (AV: 山形, 宮城, 新潟, 富山, 長野, 神奈川, 山梨, 静岡, 岐阜, 石川, 大阪, 和歌山, 鳥取, 岡山, 島根, 広島), 佐渡 (AV), 舩倉島 (AV), 九州 (AV: 長崎, 宮崎).

針葉樹林, 針広混交林に生息する.

599-2. *Pyrrhula pyrrhula rosacea* Seebohm, 1882 アカウソ

Range: Breeds in the lower Amur Basin, Ussuriland, and Sakhalin. Winters to Manchuria, Korea, e China south to Yangtze Basin, and Japan.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (WV), Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (AV), Izu Is. (WV).

Habitat: Coniferous and mixed forests.

北海道 (WV), 南千島 (WV), 本州 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (WV).

針葉樹林, 針広混交林に生息する.

599-3. *Pyrrhula pyrrhula griseiventris* Lafresnaye, 1841 ウソ

Range: Breeds in c Kurile Is. and n Japan from s Kurile Is. to the mountains of c Honshu. Sedentary, but winters in lower elevations and warmer areas.

Status: Hokkaido (RB), s Kurile Is. (RB), n and c Honshu (RB), sw Honshu (WV), Awashima I. (IV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (WV: Oshima I., Kozushima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Okinawajima I. (AV).

Habitat: Coniferous and mixed forests.

北海道 (RB), 南千島 (RB), 本州北・中部 (RB), 本州南西部 (WV), 粟島 (IV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (WV: 大島, 神津島, 三宅島, 八丈島), 沖縄島 (AV).

針葉樹林, 針広混交林に生息し, 冬期には山麓部や平地の森林にも生息する.

COCCOTHAUSTES Brisson シメ属

600. *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) シメ

Shime Hawfinch

Range: Palearctic. Breeds from w Europe and nw Africa east through Asia Minor and s Siberia to Amur Basin, Ussuriland, Sakhalin and Kamchatka, south to the Caucasus, Turkestan, Altai, Transbaikalia, Manchuria, n Korea, and n Japan. Migratory and sedentary, wintering to temperate Eurasia and n Africa.

600-1. *Coccothraustes coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) シベリアシメ

Range: Range of the species except from Ukraine to s Russia and n Iran, c Asia, Sakhalin, Japan, and n Africa; casual in Japan.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (WV), Honshu (IV: Aomori, Fukui, Nagano, Tottori).

Habitat: Open woodlands.

北海道 (IV), 南千島 (WV), 本州 (IV: 青森, 福井, 長野, 鳥取).
疎林や低木林に生息する.

600-2. *Coccothraustes coccothraustes japonicus* Temminck & Schlegel, 1848 シメ

Range: Breeds in Sakhalin, s Kamchatka, and n Japan from s Kurile Is. through Hokkaido south to c Honshu. Migratory and sedentary, wintering south to Ryukyu Is. and Iwo Is. Recorded from Quelpart I.; accidental in Taiwan.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (WV. CB: Akita, Iwate, Yamagata, Fukushima, Nagano), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (WV), Yoronjima I. (IV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed forests, open woodlands, near human habitation.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (WV. CB: 秋田, 岩手, 山形, 福島, 長野), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (WV), 与論島 (IV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

落葉広葉樹林, 針広混交林で繁殖し, 冬には疎林, 低木林, 農耕地などに生息する.

EOPHONA Gould イカル属

601. *Eophona migratoria* Hartert, 1903 コイカル

Ko-ikaru Chinese Grosbeak

Range: E Palearctic. Breeds in s Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea and, with a gap in distribution, from Yangtze Basin west to Szechwan. Winters to s China, Korea, Japan, Taiwan, and occasionally n Indochina.

601-1. *Eophona migratoria migratoria* Hartert, 1903 コイカル

Range: Range of the species except Yangtze Basin to Szechwan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (WV. CB: Saitama, Tokyo, Shimane), Sado (WV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (IV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (AV: Nijima I., Shikinejima I., Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Ishigakijima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, sparse woods.

北海道 (AV), 本州 (WV. CB: 埼玉, 東京, 島根), 佐渡 (WV), 舩倉島 (IV), 見島 (IV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (AV: 新島, 式根島, 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV: 沖縄島, 粟国島, 宮古島, 石垣島, 西表島, 与那国島), 南大東島 (AV).

低地の疎林, 農耕地等に生息する.

602. *Eophona personata* (Temminck & Schlegel, 1848) イカル

Ikaru Japanese Grosbeak

Range: E Palearctic. Breeds in the lower Amur Basin, e Manchuria, Hopeh in n China, Ussuriland, and Japan. Migratory and sedentary, wintering to s Japan; recorded from Korea on migration.

602-1. *Eophona personata personata* (Temminck & Schlegel, 1848) イカル

Range: Breeds in Japan from Hokkaido south to Kyushu. Sedentary, but also winters in warmer areas from sw Honshu to Kyushu and occasionally reaching Izu Is., Ogasawara Is., Quelpart I., Taiwan, and Fukien.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (IV), Honshu (RB), Awashima I. (MB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (PV), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (IV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (IV), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV), Daito Is. (IV).

Habitat: Deciduous and mixed woods, open woodlands, gardens.

北海道 (MB), 南千島 (IV), 本州 (RB), 粟島 (MB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (PV), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (IV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (IV), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV), 大東諸島 (IV).

落葉広葉樹林, 針広混交林で繁殖し, 冬には疎林, 低木林, 農耕地などに生息する.

Family CALCARIIDAE ツメナガホオジロ科**CALCARIUS Bechstein ツメナガホオジロ属****603. *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758) ツメナガホオジロ**

Tsumenaga-hojiro Lapland Bunting

Range: N Holarctic. Breeds in tundras of arctic and subarctic Eurasia and North America; also s Greenland. Winters to temperate regions.

603-1. *Calcarius lapponicus coloratus* Ridgway, 1898 ツメナガホオジロ

Range: Breeds in Kamchatka, Commander Is., and Shelekhova Gulf coast of

Okhotsk Sea. Winters to e China south to Yangtze Basin and Hokkaido in Japan. Recorded from Manchuria, Korea, Sakhalin, Kurile Is., and Japan on migration.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (IV), Honshu (IV), Sado (IV), Tobishima I. (IV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Oita, Kagoshima), Tsushima (AV), Izu Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Tonakijima I., Miyakojima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Coastal barren wastes, bare grounds, cultivated fields.

北海道 (WV), 南千島 (IV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 飛島 (IV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 大分, 鹿児島), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 渡名喜島, 宮古島, 与那国島).

海岸部の草地, 畑地などに生息する.

PLECTROPHENAX Stejneger ユキホオジロ属

604. *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758) ユキホオジロ

Yuki-hojiro Snow Bunting

Range: N Holarctic. Breeds in tundras of arctic and subarctic Eurasia and North America; also coasts of Greenland. Winters to temperate regions.

604-1. *Plectrophenax nivalis vlasowae* Portenko, 1937 ユキホオジロ

Range: Breeds in arctic Siberia from the lower Pechora to Chukot Peninsula, Anadyrland, and e Kamchatka; also Severnaya Zemlya, New Siberian Is., and Wrangel I. Winters from the Altai to Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Sakhalin, Kurile Is., n Japan, and occasionally Korea and Hopeh in n China.

Status: Hokkaido (WV), Honshu (IV), Sado (IV), Mishima I. (AV), Hegurajima I. (IV), Oki (IV), Kyushu (AV: Fukuoka, Miyazaki), Tsushima (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Coasts barren fields, cultivated fields.

北海道 (WV), 本州 (IV), 佐渡 (IV), 見島 (AV), 舩倉島 (IV), 隠岐 (IV), 九州 (AV: 福岡, 宮崎), 対馬 (AV), 与那国島 (AV).

冬期, 海岸など植被のないような環境, 農耕地に生息する.

604-2. *Plectrophenax nivalis townsendi* Ridgway, 1887 オオユキホオジ

ロ

Range: Breeds on Commander Is., Pribilof Is., and w Aleutian Is. Mainly sedentary, but occasionally winters to Kurile Is. and Alaska.

Status: S Kurile Is. (WV).

Habitat: Open lands, sea coast, bare ground.

南千島 (WV).

冬期, 海岸など植被のない環境, 農耕地に生息する.

Family PARULIDAE アメリカムシクイ科

SETOPHAGA Swainson ハゴロモムシクイ属

605. *Setophaga coronata* (Linnaeus, 1766) キヅタアメリカムシクイ

Kizuta-amerikamushikui Yellow-rumped Warbler

Range: Nearctic and Neotropical. Breeds in North America from Alaska to w US, Mexico and Guatemala. Migratory and sedentary. Northern birds wintering to Panama, West Indies, Mexico, Guatemala, and Honduras.

605-1. *Setophaga coronata coronata* (Linnaeus, 1766) キヅタアメリカムシクイ

Range: Breeds in s Canada and ne US. Migratory. Winters to se US, e Middle America, Caribbean, and Bermuda.

Status: Honshu (AV: Kanagawa, Jan. - Apr. 2010).

本州 (AV: 神奈川, 2010 年 1 - 4 月).

CARDELLINA Bonaparte アカガオアメリカムシクイ属

606. *Cardellina pusilla* (Wilson, 1811) ウィルソンアメリカムシクイ

Uiruson-amerikamushikui Wilson's Warbler

Range: Nearctic. Breeds in n North America from Alaska east to e Canada, and the east coast of North America south to s California. Migratory. Winters to Mexico, Panama, Costa Rica, and Guatemala.

606-U. *Cardellina pusilla* ssp. 亜種不明

Status: Hegurajima I. (AV: Oct. 1991).

舢倉島 (AV: 1991 年 10 月).

Family EMBERIZIDAE ホオジロ科

EMBERIZA Linnaeus ホオジロ属

607. *Emberiza lathamii* Gray, 1831 レンジャクノジコ

Renjaku-nojiko Crested Bunting

Range: Indomalayan. Breeds from n Pakistan east to s China, south to c India, Myanmar, Laos, and n Vietnam. Migratory. Winters to Thailand.

Status: Iriomotejima I. (AV: May 1987).

西表島 (AV: 1987 年 5 月).

608. *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758 キアオジ

Ki-aoji Yellowhammer

Range: W and c Palearctic. Breeds from w Europe and nw Russia east to Vi-luyi and Chona Rivers in w Russian Far East, south to Kirghiz Steppes, Altai, and Sayans; also Caucasus and n Iran. Winters to n Africa, w and c Asia, and n Mongolia.

608-1. *Emberiza citrinella erythrogenys* Brehm, 1855 キアオジ

Range: Range of the species except the British Isles, Europe, and n Russia, west of the Urals. Straggles to n China and Japan.

Status: Honshu (AV: Ishikawa, Oct. 1950, Oct. 1954, Nagano, Dec. 1935, Aichi, Feb. 1975, Hiroshima, 1999), Hegurajima I. (AV: May 1999, Oct. 2008), Kyushu (AV: Oita, Dec. 1998), Tsushima (AV).

本州 (AV: 石川, 1950 年 10 月, 1954 年 10 月, 長野, 1935 年 12 月, 愛知, 1975 年 2 月, 広島, 1999 年), 舢倉島 (AV: 1999 年 5 月, 2008 年 10 月), 九州 (AV: 大分, 1998 年 12 月), 対馬 (AV).

609. *Emberiza leucocephalos* Gmelin, 1771 シラガホオジロ

Shiraga-hojiro Pine Bunting

Range: C and e Palearctic. Breeds in Siberia from the Urals east to Okhotsk coast, Amur Basin, and Sakhalin, south to the Tian Shan, n Mongolia, and Transbaikalia. Also, ne Tsinghai and Kansu. Migratory and sedentary, wintering

to Iran, Turkestan, China from Manchuria to Yangtze Basin, and rarely Japan.

609-1. *Emberiza leucocephalos leucocephalos* Gmelin, 1771 シラガホオジロ

Range: Range of the species except ne Tsinghai and Kansu.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (AV), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Yamanashi, Nagano, Shizuoka, Aichi, Gifu, Ishikawa, Fukui, Shiga, Nara, Wakayama, Hyogo, Tottori, Shimane, Hiroshima), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (IV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Ehime), Kyushu (IV: Fukuoka, Oita, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (IV), Tokara Is. (AV), Izu Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Miyakojima I. (AV), Ishigakijima I. (AV), Yonagunijima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, open habitats, cultivated lands.

北海道 (IV), 南千島 (AV), 本州 (IV: 青森, 岩手, 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 茨城, 千葉, 東京, 山梨, 長野, 静岡, 愛知, 岐阜, 石川, 福井, 滋賀, 奈良, 和歌山, 兵庫, 鳥取, 島根, 広島), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (IV), 見島 (AV), 四国 (AV: 愛媛), 九州 (IV: 福岡, 大分, 熊本, 鹿児島), 対馬 (IV), トカラ列島 (AV), 伊豆諸島 (AV), 奄美大島 (AV), 宮古島 (AV), 石垣島 (AV), 与那国島 (AV).

疎林, 伐開地, 農耕地に生息する.

610. *Emberiza cioides* Brandt, 1843 ホオジロ

Hojiro Meadow Bunting

Range: C and e Palearctic. Breeds in Turkestan, Mongolia, and s Siberia from the Altai to Amur Basin, south to Manchuria, Ussuriland, Korea, e China to Kwangtung, and Japan. Mainly sedentary.

610-1. *Emberiza cioides ciopsis* Bonaparte, 1850 ホオジロ

Range: Breeds in Japan from Hokkaido and s Kurile Is. south to Kyushu, Tsushima, Yakushima I., Tanegashima I., and Izu Is.; also Quelpart I. and Dagelet I. in Korea. Sedentary, but northern birds winter south to c Honshu. Recorded from c Kurile Is. and s Sakhalin; straggles to Moneron I. off Sakhalin.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB), Awashima I. (RB), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (RB), Mishima I. (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Iki (RB), Goto Is. (RB), Danjo Is. (RB), Yakushima I. (RB), Tanegashima I. (RB), Izu Is. (RB), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (WV),

Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, grasslands, meadows.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB), 粟島 (RB), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (RB), 見島 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 五島列島 (RB), 男女群島 (RB), 屋久島 (RB), 種子島 (RB), 伊豆諸島 (RB), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

疎林, 農耕地, 草原, 牧草地, 伐開地等に生息する.

611. *Emberiza buchanani* Blyth, 1845 イワバホオジロ

Iwaba-hojiro Grey-necked Bunting

Range: Palearctic. Breeds from e Turkey across c Asia to c China. Migratory. Winters to India.

611-U. *Emberiza buchanani* ssp. 亜種不明

Status: Tobishima I. (AV: Sep. 2008), Hegurajima I. (AV: Oct. 1997).

飛島 (AV: 2008 年 9 月), 舩倉島 (AV: 1997 年 10 月).

612. *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758 ズアオホオジロ

Zu-ao-hojiro Ortolan Bunting

Range: W and c Palearctic. Breeds from w Europe east across w Siberia to the Altai and nw Mongolia, south to n Algeria, Asia Minor, Iran, and Kirghiz Steppes. Winters to e Africa and s Arabia; straggles to Japan.

Status: Hegurajima I. (AV: Oct. 1986), Tokunoshima I. (AV: Jun. 2006), Kumejima I. (AV: Jun. 2006).

舩倉島 (AV: 1986 年 10 月), 徳之島 (AV: 2006 年 6 月), 久米島 (AV: 2006 年 6 月).

613. *Emberiza tristrami* Swinhoe, 1870 シロハラホオジロ

Shirohara-hojiro Tristram's Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in the middle Amur Basin, n Manchuria, and Ussuriland. Winters to s China, south of Yangtze Basin, west to Szechwan and Yunnan, and rarely Japan; accidental in Myanmar.

Status: Hokkaido (AV), Rebunto I. (AV), Honshu (IV: Yamagata, Miyagi, Niigata, Tochigi, Gunma, Nagano, Ibaraki, Tokyo, Shizuoka, Gifu, Ishikawa, Fukui, Kyoto, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (PV), Oki (AV), Mishima I. (PV),

Futaojima I. (AV), Tsunoshima I. (AV), Kyushu (AV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Forest edges, cultivated lands.

北海道 (AV), 礼文島 (AV), 本州 (IV: 山形, 宮城, 新潟, 栃木, 群馬, 長野, 茨城, 東京, 静岡, 岐阜, 石川, 福井, 京都, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 飛島 (AV), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (PV), 隠岐 (AV), 見島 (PV), 蓋井島 (AV), 角島 (AV), 九州 (AV: 福岡, 佐賀, 長崎, 熊本, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 栗国島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

林縁や農耕地などに生息する.

614. *Emberiza fucata* Pallas, 1776 ホオアカ

Hoaka Chestnut-eared Bunting

Range: E Palearctic. Breeds from ne Mongolia, Transbaikalia, and the middle Amur Basin to Manchuria, Ussuriland, s Sakhalin, Korea, and Japan; also Himalayas to w and se China, south of Yangtze Basin. Migratory and sedentary, wintering in Assam to Indochina, s China, Hainan, and s Japan.

614-1. *Emberiza fucata fucata* Pallas, 1776 ホオアカ

Range: Range of the species except the Himalayas to w and s China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB, WV), Awashima I. (PV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (CB, WV), Kyushu (RB: Oita, Kumamoto. WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Open and brushy grasslands, cultivated lands.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB, WV), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (CB, WV), 九州 (RB: 大分, 熊本. WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV).

灌木草原や農耕地などに生息する.

615. *Emberiza pusilla* Pallas, 1776 コホオアカ

Ko-hoaka Little Bunting

Range: N Palearctic. Breeds in n Siberia from Lapland and nw Russia east

to the n Okhotsk coast, and Anadyrland, south to n Lake Baikal and s Sakha. Winters to the e Himalayas, Assam to Indochina, and s China; occasional or accidental in Japan, Taiwan, Philippines, and Europe.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (IV), Tobishima I. (IV), Awashima I. (PV), Sado (PV), Mishima I. (PV), Futaojima I. (IV), Shikoku (IV), Kyushu (WV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Goto Is. (IV), Yakushima I. (IV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Tokara Is. (IV), Amami-Oshima I. (WV), Ryukyu Is. (WV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, sparse woods, cultivated lands.

北海道 (IV), 本州 (IV), 飛島 (IV), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 見島 (PV), 蓋井島 (IV), 四国 (IV), 九州 (WV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 五島列島 (IV), 屋久島 (IV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), トカラ列島 (IV), 奄美大島 (WV), 琉球諸島 (WV), 南大東島 (AV).

疎林や農耕地などに生息する.

616. *Emberiza chrysophrys* Pallas, 1776 キマユホオジロ

Kimayu-hojiro Yellow-browed Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in se Siberia in s Sakha east to Aldan River, south to n Lake Baikal and n Stanovoi Range. Winters to e China, south of Yangtze Basin. Recorded from Manchuria, Ussuriland, and Korea on migration; occasional or accidental in Japan and w Europe.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Iwate, Yamagata, Niigata, Ibaraki, Aichi, Ishikawa, Fukui, Mie, Nara, Kyoto, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (AV: Ehime, Kochi), Kyushu (AV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Agunijima I., Miyakojima I., Iriomotejima I., Yonagunijima I.).

北海道 (AV), 本州 (AV: 岩手, 山形, 新潟, 茨城, 愛知, 石川, 福井, 三重, 奈良, 京都, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 飛島 (AV), 粟島 (AV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (AV: 愛媛, 高知), 九州 (AV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 栗国島, 宮古島, 西表島, 与那国島).

617. *Emberiza rustica* Pallas, 1776 カシラダカ

Kashiradaka Rustic Bunting

Range: N Palearctic. Breeds from Lapland and n Russia east to Okhotsk coast,

Anadyrland, and Kamchatka, south to the n Altai, Sayans, and the middle Amur Basin; also recorded in summer from Sakhalin, n Kurile Is., and Commander Is. Winters to China from Hopeh to Fukien and Szechwan, Tian Shan, and Japan; straggles to Turkey and Europe.

617-1. *Emberiza rustica latifascia* Portenko, 1930 カシラダカ

Range: Breeds from Lake Baikal east to Anadyrland, and Kamchatka. Winters in Japan, also possibly in Korea and e China.

Status: Hokkaido (PV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Minami-Daitojima I. (AV).

Habitat: Open woodlands, sparse woods, cultivated lands, suburban and urban areas.

北海道 (PV), 南千島 (PV), 本州 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 南大東島 (AV).

疎林, 伐開地, 農耕地等に生息する. 青森, 佐賀, 対馬で夏の観察記録がある.

618. *Emberiza elegans* Temminck, 1836 ミヤマホオジロ

Miyama-hojiro Yellow-throated Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, Korea, and sw Japan (sw Honshu and Tsushima); also w China. Migratory and sedentary, wintering in Korea, Japan, and e China south to Fukien; casual in Sakhalin, Kurile Is., Ryukyu Is., and Taiwan.

618-1. *Emberiza elegans elegans* Temminck, 1836 ミヤマホオジロ

Range: Range of the species except w China.

Status: Hokkaido (WV), s Kurile Is. (PV), Honshu (WV, CB: Hiroshima), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (WV), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (CB, WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (AV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (AV).

Habitat: Open woodlands, cultivated lands, riverside thickets.

北海道 (WV), 南千島 (PV), 本州 (WV, CB: 広島), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (WV), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (CB, WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (AV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (AV).

疎林や農耕地等に生息する。対馬と広島で繁殖が確認されている。

619. *Emberiza aureola* Pallas, 1773 シマアオジ

Shima-aoji Yellow-breasted Bunting

Range: Palearctic. Breeds from Finland (occasionally) and n Russia east across n Eurasia to Okhotsk coast, Anadyrland, and Kamchatka, south to Kirghiz Steppes, n Mongolia, Manchuria, Ussuriland, n Korea, Sakhalin, Kurile Is., and n Japan. Winters from e India to Indochina, Malay Peninsula, se China, and Hainan.

619-1. *Emberiza aureola ornata* Shulpin, 1928 シマアオジ

Range: Breeds in Amur Basin, the s Okhotsk coast, Manchuria, Ussuriland, n Korea, Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, and n Japan, Hokkaido; has bred in Aomori and Akita. Winters to se Asia and se China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (IV. CB: Aomori, Akita), Awashima I. (IV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (IV: Ehime, Kochi), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Miyazaki), Tsushima (PV), Danjo Is. (IV), Izu Is. (AV: Hachijojima I.), Ogasawara Is. (AV: Chichijima I.), Iwo Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Grasslands with scattered shrubs, cultivated fields.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (IV. CB: 青森, 秋田), 粟島 (IV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (IV: 愛媛, 高知), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 宮崎), 対馬 (PV), 男女群島 (IV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島), 小笠原群島 (AV: 父島), 硫黄列島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (IV), 琉球諸島 (IV).

草原, 灌木草原, 農耕地に生息する。

620. *Emberiza rutila* Pallas, 1776 シマノジコ

Shima-nojiko Chestnut Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in s Siberia from the n and w Lake Baikal region to Okhotsk coast and the lower Amur Basin, south to Transbaikalia, Manchuria,

and n Ussuriland. Winters in Assam to Indochina, Malay Peninsula, and s China; occasional or accidental in Japan, Taiwan, and Europe.

Status: Hokkaido (AV), Rishirito I. (AV), Honshu (AV: Aomori, Iwate, Akita, Nagano, Tokyo, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Wakayama, Hyogo, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Tobishima I. (AV), Awashima I. (AV), Sado (AV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Tsunoshima I. (AV), Kyushu (IV: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Kagoshima), Tsushima (PV), Danjo Is. (AV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV).

北海道 (AV), 利尻島 (AV), 本州 (AV: 青森, 岩手, 秋田, 長野, 東京, 静岡, 愛知, 石川, 和歌山, 兵庫, 島根, 広島, 山口), 飛島 (AV), 粟島 (AV), 佐渡 (AV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 角島 (AV), 九州 (IV: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 鹿児島), 対馬 (PV), 男女群島 (AV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV).

621. *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 ズグロチャキンチョウ

Zuguro-chakincho Black-headed Bunting

Range: W Palearctic. Breeds from se Italy and Balkans east to Asia Minor, Crete, Cyprus, Near East, Caucasus, sw Russia, and Iran. Winters to w India; straggles to the British Isles, w Europe, and Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (AV: Akita, Yamagata, Niigata, Chiba, Shizuoka, Wakayama, Shimane, Yamaguchi), Tobishima I. (AV: May 1988), Awashima I. (AV), Hegurajima I. (AV), Mishima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Nagasaki, Oita, Kagoshima), Tsushima (AV), Izu Is. (AV: Hachijojima I., Nov. 1928, Nov. 1930), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Ryukyu Is. (AV: Okinawajima I., Tokashikijima I., Oct. 1985, Miyakojima I., Ishigakijima I., Feb. 2008, Yonagunijima I., Dec. 1985, etc.), Minami-Daitojima I. (AV).

北海道 (AV), 本州 (AV: 秋田, 山形, 新潟, 千葉, 静岡, 和歌山, 島根, 山口), 飛島 (AV: 1988 年 5 月), 粟島 (AV), 舩倉島 (AV), 見島 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 長崎, 大分, 鹿児島), 対馬 (AV), 伊豆諸島 (AV: 八丈島, 1928 年 11 月, 1930 年 11 月), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 琉球諸島 (AV: 沖縄島, 渡嘉敷島, 1985 年 10 月, 宮古島, 石垣島, 2008 年 2 月, 与那国島, 1985 年 12 月等), 南大東島 (AV).

622. *Emberiza bruniceps* Brandt, 1841 チャキンチョウ

Chakincho Red-headed Bunting

Range: C Palearctic. Breeds from the lower Volga across c Asia to c China. Migratory. Winters to s India.

Status: Tobishima I. (AV: May 1995), Hegurajima I. (AV), Tsushima (AV), Yonagunijima I. (AV).

飛島 (AV: 1995 年 5 月), 舢倉島 (AV), 対馬 (AV), 与那国島 (AV).

623. *Emberiza sulphurata* Temminck & Schlegel, 1848 ノジコ

Nojiko Yellow Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in Japan, Honshu. Winters to Fukien and Kwangtung in se China, Taiwan, and n Philippines; also recorded from s Korea on migration.

Status: Hokkaido (AV), n and c Honshu (MB: Aomori, Fukushima, Gunma, Tokyo, Kanagawa, Niigata, Yamanashi, Nagano, Shizuoka), sw Honshu (PV: CB: Tottori), Awashima I. (PV), Sado (PV), Hegurajima I. (PV), Oki (PV), Mishima I. (PV), Kyushu (PV), Tsushima (PV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (PV), Izu Is. (PV), Tokara Is. (PV), Amami-Oshima I. (IV), Ryukyu Is. (IV).

Habitat: Open fields with low bush, also edge and shrubby grasslands, forest edge.

北海道 (AV), 本州北・中部 (MB: 青森, 福島, 群馬, 東京, 神奈川, 新潟, 山梨, 長野, 静岡), 本州南西部 (PV: CB: 鳥取), 粟島 (PV), 佐渡 (PV), 舢倉島 (PV), 隠岐 (PV), 見島 (PV), 九州 (PV), 対馬 (PV), 男女群島 (PV), 屋久島 (PV), 伊豆諸島 (PV), トカラ列島 (PV), 奄美大島 (IV), 琉球諸島 (IV).

疎林, 林縁に生息する. 本州では局地的に繁殖する.

624. *Emberiza spodocephala* Pallas, 1776 アオジ

Aoji Black-faced Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in Siberia from the Altai and the upper Enisei to Okhotsk coast, the lower Amur Basin, and Sakhalin, south to the Sayans, Transbaikalia, Manchuria, Ussuriland, n Korea, w China to Sikang and n Yunnan, and n Japan. Winters to the Himalayas, se Asia, s China, s Korea, s Japan, and Taiwan.

624-1. *Emberiza spodocephala spodocephala* Pallas, 1776 シベリアアオジ

Range: Breeds in s Siberia, east of the Altai, Transbaikalia, Amur Basin, Manchuria, Ussuriland, n Sakhalin, and n Korea. Winters to e and s China, Hainan,

s Korea, and Taiwan.

Status: Honshu (IV: Aomori, Yamagata, Niigata, Tochigi, Toyama, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Ishikawa, Shiga, Shimane, Hiroshima, Yamaguchi), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Tsunoshima I. (AV), Shikoku (AV: Tokushima), Kyushu (AV: Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (PV), Tokara Is. (AV), Amami-Oshima I. (AV), Agunijima I. (AV), Yaeyama Is. (AV).

本州 (IV: 青森, 山形, 新潟, 栃木, 富山, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 石川, 滋賀, 島根, 広島, 山口), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 角島 (AV), 四国 (AV: 徳島), 九州 (AV: 佐賀, 長崎, 熊本, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (PV), トカラ列島 (AV), 奄美大島 (AV), 栗国島 (AV), 八重山諸島 (AV).

624-2. *Emberiza spodocephala personata* Temminck, 1836 アオジ

Range: Breeds in c and s Sakhalin and Japan from s Kurile Is. to c Honshu. Winters to sw Japan, and Quelpart I., occasionally reaching e and s China.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB, WV), Awashima I. (PV), Sado (CB, WV), Hegurajima I. (MB), Oki (WV), Mishima I. (WV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV), Daito Is. (IV).

Habitat: Open woodlands, low bushes, forest edge, undergrowth, cultivated lands.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB, WV), 栗島 (PV), 佐渡 (CB, WV), 舩倉島 (MB), 隠岐 (WV), 見島 (WV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), 小笠原群島 (IV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV), 大東諸島 (IV).

疎林, 林縁部, 灌木草原, 農耕地などに生息する.

625. *Emberiza variabilis* Temminck, 1836 クロジ

Kuroji Grey Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in s Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, and Japan south to c Honshu. Winters from c Honshu to Ryukyu Is.; casual in e China and Ussuriland.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), Honshu (RB, MB, WV), Awashima I. (PV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Oki (WV), Mishima I. (PV), Shikoku

(RB: Tokushima. WV), Kyushu (WV), Tsushima (WV), Iki (WV), Goto Is. (WV), Danjo Is. (PV), Yakushima I. (WV), Tanegashima I. (WV), Izu Is. (WV), Tokara Is. (WV), Amami Is. (WV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Dense thickets and thick undergrowth of deciduous and mixed forests.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州 (RB. MB. WV), 粟島 (PV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 隠岐 (WV), 見島 (PV), 四国 (RB: 徳島. WV), 九州 (WV), 対馬 (WV), 壱岐 (WV), 五島列島 (WV), 男女群島 (PV), 屋久島 (WV), 種子島 (WV), 伊豆諸島 (WV), トカラ列島 (WV), 奄美諸島 (WV), 琉球諸島 (WV).

林床植物の密な落葉広葉樹林や針広混交林に生息する。

626. *Emberiza pallasi* (Cabanis, 1851) シベリアジュリン

Shiberia-jurin Pallas's Reed Bunting

Range: C and e Palearctic. Breeds in c and e Siberia from Taz River and the upper Enisei to Chukot Peninsula, south to the Altai, Mongolia, Transbaikalia, Amur Basin, and n Manchuria. Winters to temperate regions.

626-1. *Emberiza pallasi polaris* Middendorff, 1853 シベリアジュリン

Range: Breeds in c and e Siberia east to Chukot Peninsula, south to n Lake Baikal and the middle Lena. Winters to s Manchuria, Ussuriland, Korea, e China south to the lower Yangtze Basin, and occasionally Japan.

Status: Hokkaido (AV), Honshu (IV: Aomori, Yamagata, Niigata, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Shizuoka, Aichi, Gifu, Shiga, Osaka, Hyogo, Tottori, Okayama, Shimane, Yamaguchi), Mishima I. (AV: May 1992), Shikoku (AV: Kochi), Kyushu (WV: Fukuoka, Saga, Mar. 1925, Nagasaki, Miyazaki, Kagoshima), Tsushima (AV: Nov. 2007, Feb. 2008). Birds of unidentified subspecies were recorded in various locations.

北海道 (AV), 本州 (IV: 青森, 山形, 新潟, 茨城, 埼玉, 東京, 神奈川, 静岡, 愛知, 岐阜, 滋賀, 大阪, 兵庫, 鳥取, 岡山, 島根, 山口), 見島 (AV: 1992 年 5 月), 四国 (AV: 高知), 九州 (WV: 福岡, 佐賀, 1925 年 3 月, 長崎, 宮崎, 鹿児島), 対馬 (AV: 2007 年 11 月, 2008 年 2 月). 亜種不明の個体が各地で観察されている。

626-2. *Emberiza pallasi pallasi* (Cabanis, 1851) オオシベリアジュリン

Range: Breeds from the Altai and Sayans to Transbaikalia, Amur Basin, n Mongolia, Manchuria, and Tian Shan. Mainly sedentary, wintering to Chinese

Turkestan and Inner Mongolia; accidental in Japan in Kyushu.

Status: Kyushu (AV: Saga, Jan. 1924). No reliable records over the last 50 years.

九州 (AV: 佐賀, 1924 年 1 月). 採集記録が 1 例ある. 最近 50 年間以上, 確実な国内記録がない.

627. *Emberiza yessoensis* (Swinhoe, 1874) コジュリン

Ko-jurin Japanese Reed Bunting

Range: E Palearctic. Breeds in se Manchuria, Ussuriland, and Japan. Migratory and sedentary, wintering in e China from Hopeh and Shantung to the lower Yangtze Basin (occasionally to Fukien), s Korea, and Japan.

627-1. *Emberiza yessoensis yessoensis* (Swinhoe, 1874) コジュリン

Range: Breeds in n and c Honshu and Kyushu. Recorded from Hokkaido and s Kurile Is. Winters in warmer areas on Pacific coast.

Status: Hokkaido (IV), s Kurile Is. (IV), n and c Honshu (RB, MB: Aomori, Miyagi, Akita, Ibaraki, Gunma, Chiba, Niigata, Toyama, Yamanashi, Nagano, Shizuoka), sw Honshu (WV), Sado (RB), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (AV), Shikoku (WV), Kyushu (MB: Kumamoto. WV), Danjo Is. (PV).

Habitat: Grasslands, marshes, reed beds.

北海道 (IV), 南千島 (IV), 本州北・中部 (RB, MB: 青森, 宮城, 秋田, 茨城, 群馬, 千葉, 新潟, 富山, 山梨, 長野, 静岡), 本州南西部 (WV), 佐渡 (RB), 舩倉島 (PV), 見島 (AV), 四国 (WV), 九州 (MB: 熊本. WV), 男女群島 (PV).

草原など開けた環境に生息する. 北海道では近年確かな記録がない.

628. *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758) オオジュリン

O-jurin Common Reed Bunting

Range: Palearctic. Breeds from w Europe east across Eurasia to the lower Lena and Okhotsk coast, south to Asia Minor, c Asia, Mongolia, Manchuria, and Ussuriland; also nw Africa, c China, Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, and n Japan south to n Honshu. Migratory and sedentary, wintering in temperate Eurasia.

628-1. *Emberiza schoeniclus pyrrhulina* (Swinhoe, 1876) オオジュリン

Range: Breeds in Kamchatka, Kurile Is., Sakhalin, the lower Amur Basin, Ussuriland, Hokkaido, and n Honshu. Winters from Manchuria to Hopeh (rarely to

Yangtze Basin), Korea (occasional), and s Japan from c Honshu to Kyushu.

Status: Hokkaido (MB), s Kurile Is. (MB), n Honshu (MB), c and sw Honshu (WV), Awashima I. (PV), Sado (WV), Hegurajima I. (PV), Mishima I. (PV), Shikoku (WV), Kyushu (WV), Tsushima (IV), Izu Is. (WV), Tokara Is. (IV), Yoronjima I. (AV), Ryukyu Is. (WV).

Habitat: Shrubby grasslands, reed beds, wet grasslands, margin of marshes. Reed beds along rivers, estuaries, sea coast in winter.

北海道 (MB), 南千島 (MB), 本州北部 (MB), 本州中・南西部 (WV), 粟島 (PV), 佐渡 (WV), 舩倉島 (PV), 見島 (PV), 四国 (WV), 九州 (WV), 対馬 (IV), 伊豆諸島 (WV), トカラ列島 (IV), 与論島 (AV), 琉球諸島 (WV).

湿原, 草原に生息する. 冬には川沿いのヨシ原などに生息する.

PASSERELLA Swainson ゴマフスズメ属

629. *Passerella iliaca* (Merrem, 1786) ゴマフスズメ

Gomafu-suzume Fox Sparrow

Range: Nearctic. Breeds from Alaska and Canada south to s California and Quebec. Winters to s US and nw Mexico.

629-1. *Passerella iliaca unalaschcensis* (Gmelin, 1789) ゴマフスズメ

Range: Breeds in Alaska and e Aleutian Is. west to Unalaska. Winters to Pacific coast of US from Vancouver to s California and occasionally Baja California; straggles to Anadyrland and Japan.

Status: Hokkaido (AV: Feb. 1985), Honshu (AV: Tochigi, Nov. 1935).

北海道 (AV: 1985 年 2 月), 本州 (AV: 栃木, 1935 年 11 月). 2 例の記録がある.

MELOSPIZA Baird ウタスズメ属

630. *Melospiza melodia* (Wilson, 1810) ウタスズメ

Uta-suzume Song Sparrow

Range: Nearctic. Breeds in the west coast of North America from Aleutian Is. to cw Mexico; also ne North America. Migratory and sedentary. Northern birds wintering to the west coast of North America from w Canada to nw Mexico, and se US.

630-U. *Melospiza melodia* ssp. 亜種不明

Status: Mishima I. (AV: May 2007).

見島 (AV: 2007 年 5 月).

ZONOTRICHIA Swainson ミヤマシトド属

631. *Zonotrichia leucophrys* (Forster, 1772) ミヤマシトド

Miyama-shitodo White-crowned Sparrow

Range: Nearctic. Breeds from Alaska and Canada south to California, the Rockies, and Quebec. Migratory and sedentary, wintering to US, c Mexico, and Cuba.

631-1. *Zonotrichia leucophrys gambelii* (Nuttall, 1840) ミヤマシトド

Range: Breeds in w North America from Alaska and Yukon Territory south to British Columbia and n Washington, east to Hudson Bay. Winters to s British Columbia and w US south to Baja California and c Mexico; straggles to Japan.

Status: Hokkaido (AV: Mar. 1969, Feb. 1975), Honshu (AV: Aomori, Jan. 2003, Yamagata, Niigata, Apr. 2000, Gunma, Oct. 1977, Saitama, Nov. 1994, Chiba, Dec. 1936, Tokyo, Mar. 1964, Ishikawa, Oct. 1992, Hyogo, Apr. 2006), Mishima I. (AV: Apr. 1985), Shikoku (AV: Ehime), Hegurajima I. (AV: Apr. and Oct. 1977).

北海道 (AV: 1969 年 3 月, 1975 年 2 月), 本州 (AV: 青森, 2003 年 1 月, 山形, 新潟, 2000 年 4 月, 群馬, 1977 年 10 月, 埼玉, 1994 年 11 月, 千葉, 1936 年 12 月, 東京, 1964 年 3 月, 石川, 1992 年 10 月, 兵庫, 2006 年 4 月), 見島 (AV: 1985 年 4 月), 四国 (AV: 愛媛), 舩倉島 (AV: 1977 年 4, 10 月).

632. *Zonotrichia atricapilla* (Gmelin, 1789) キガシラシトド

Kigashira-shitodo Golden-crowned Sparrow

Range: Nearctic. Breeds in w North America east of the Rockies from Alaska south to British Columbia and n Washington. Winters in the west coast of US south to Baja California and n Mexico; straggles to Japan.

Status: Hokkaido (AV: Apr. 1988, Jan. 2000), Honshu (AV: Saitama, Apr. 2011, Chiba, Jan. - Apr. 2011, Tokyo, Dec. 1935, Niigata, May 1986, Osaka, Dec. 2006 - Apr. 2007), Awashima I. (AV: May 1997), Sado (AV: Jan. 1980), Hegurajima I. (AV: May and Oct. 1990).

北海道 (AV: 1988 年 4 月, 2000 年 1 月), 本州 (AV: 埼玉, 2011 年 4 月, 千葉, 2011 年 1 - 4 月, 東京, 1935 年 12 月, 新潟, 1986 年 5 月, 大阪, 2006 年 12 月 - 2007 年 4 月), 粟島 (AV: 1997 年 5 月), 佐渡 (AV: 1980 年 1 月), 舩倉島 (AV: 1990 年 5 月, 10 月).

PASSERCULUS Bonaparte サバンナシトド属

633. *Passerculus sandwichensis* (Gmelin, 1789) サバンナシトド

Sabanna-shitodo Savannah Sparrow

Range: Nearctic and n Neotropical. Breeds in North America, Mexico, and sw Guatemala. Migratory and sedentary. Northern birds wintering to s US, Mexico, and Bahamas.

633-1. *Passerculus sandwichensis sandwichensis* (Gmelin, 1789) サバンナシトド

Range: Breeds from e Alaska to sw Canada. Winters to s California.

Status: Hokkaido (AV: Nemuro, Feb. 2004), Honshu (IV: Aomori, Iwate, Miyagi, Niigata, Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokyo, Aichi, Ishikawa, Shimane), Hegurajima I. (AV), Shikoku (AV: Kagawa, Kochi), Kyushu (IV: Nagasaki, Kagoshima), Okinawajima I. (AV).

北海道 (AV: 根室, 2004 年 2 月), 本州 (IV: 青森, 岩手, 宮城, 新潟, 埼玉, 茨城, 千葉, 東京, 愛知, 石川, 島根), 舩倉島 (AV), 四国 (AV: 香川, 高知), 九州 (IV: 長崎, 鹿児島), 沖縄島 (AV).

Part B
Introduced Species and Subspecies
外来種・亜種

Order GALLIFORMES キジ目

Family PHASIANIDAE キジ科

BAMBUSICOLA Gould コジュケイ属

1. *Bambusicola thoracicus* (Temminck, 1815) コジュケイ

Kojukei Chinese Bamboo Partridge

Range: Resident in s China and Taiwan. Two subspecies.

1-1. *Bambusicola thoracicus thoracicus* (Temminck, 1815) コジュケイ

Range: Resident in s China from Shensi to Fukien, Kwangsi, and Szechwan. Introduced in Japan.

Status: Honshu (RB: south of Miyagi), Sado (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (RB), Iwo Is. (RB: Iwoto I.).

Habitat: Dense bushes, cultivated fields.

本州 (RB: 宮城以南), 佐渡 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (RB), 硫黄列島 (RB: 硫黄島). 1919 年に神奈川で放鳥された. 低木林や農耕地に生息する.

1-2. *Bambusicola thoracicus sonorivox* Gould, 1863 テッケイ

Range: Resident in Taiwan. Introduced in c Japan.

Status: C Honshu (RB: Hyogo).

Habitat: Dense bushes.

本州中部 (RB: 兵庫). 1933 年に神戸付近で放鳥された. 低木林に生息する.

SYRMATICUS Wagler ヤマドリ属

2. *Syrmaticus soemmerringii* (Temminck, 1830) ヤマドリ

See Part A (No. 4).

2-1. *Syrmaticus soemmerringii scintillans* (Gould, 1866) ヤマドリ

See Part A (No. 4-1).

2-2. *Syrmaticus soemmerringii subrufus* (Kuroda, 1919) ウスアカヤマドリ

See Part A (No. 4-2).

2-U. *Syrmaticus soemmerringii* ssp. 亜種不明

Status: Awajishima I. (RB), Shodoshima I. (RB), Oki (RB).

Habitat: Forests.

淡路島 (RB), 小豆島 (RB), 隠岐 (RB).

森林に生息する.

PHASIANUS Linnaeus キジ属

3. *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 キジ

See Part A (No. 5).

3-1. *Phasianus colchicus karpowi* Buturlin, 1904 コウライキジ

Range: Resident in s Manchuria, Hopeh, and Korea, Introduced in Quelpart I. and Japan.

Status: Hokkaido (RB), Honshu (RB), Shikoku (RB: Ehime), Kyushu (RB: Nagasaki), Tsushima (RB), Iki (RB), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Izenajima I., Miyakojima I., Ishigakijima I.).

Habitat: Dense bushes, cultivated fields.

北海道 (RB), 本州 (RB), 四国 (RB: 愛媛), 九州 (RB: 長崎), 対馬 (RB), 壱岐 (RB), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 伊是名島, 宮古島, 石垣島).

低木林や農耕地に生息する.

3-U. *Phasianus colchicus* ssp. 亜種不明

Status: Oki (RB), Mishima I. (RB), Iwo Is. (RB: Iwoto I.), Izu Is. (RB: Niiijima I., Shikinejima I., Miyakejima I., Hachijojima I.), Tokara Is. (RB: Nakanoshima I., Suwanosejima I.), Amami Is. (RB: Amami-Oshima I., Kikaijima I., Toku-

noshima I., Okinoerabujima I., Yoronjima I.), Miyakojima I. (RB), Kita-Daitojima I. (RB).

隠岐 (RB), 見島 (RB), 硫黄列島 (RB: 硫黄島), 伊豆諸島 (RB: 新島, 式根島, 三宅島, 八丈島), トカラ列島 (RB: 中之島, 諏訪之瀬島), 奄美諸島 (RB: 奄美大島, 喜界島, 徳之島, 沖永良部島, 与論島), 宮古島 (RB), 北大東島 (RB).

PAVO Linnaeus クジャク属

4. *Pavo cristatus* Linnaeus, 1758 インドクジャク

Indo-kujaku Indian Peafowl

Range: W Indomalayan. Breeds from Pakistan through most of India (south from Himalayas) to Sri Lanka; may still occur in Bangladesh. Introduced to many parts of the world, but usually remains semi-feral.

Status: Sakishima Is. (RB, CB: Miyakojima I., Irabujima I., Ishigakijima I., Kuroshima I., Kohamajima I., Aragusukujima I., Yonagunijima I.).

Habitat: Dense bushes, cultivated fields.

先島諸島 (RB, CB: 宮古島, 伊良部島, 石垣島, 黒島, 小浜島, 新城島, 与那国島).

低木林や農耕地に生息する.

Order ANSERIFORMES カモ目

Family ANATIDAE カモ科

BRANTA Scopoli コクガン属

5. *Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) カナダガン

Kanada-gan Canada Goose

Range: Nearctic. Breeds in s and e Alaska, Canada, n US, and w Greenland. Northern birds winter to s US and n Mexico. Introduced in Britain, Ireland, Norway, Sweden, Finland, and New Zealand.

5-1. *Branta canadensis moffitti* Aldrich, 1946 オオカナダガン

Range: Breeds in the northern part of the Great Plains. Partly migratory to winter s US and n Mexico.

Status: Honshu (RB, CB: Ibaraki, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka).

Habitat: Freshwater lakes, rivers.

本州 (RB, CB: 茨城, 神奈川, 山梨, 静岡).

湖沼, 河川に生息.

CYGNUS Garsault ハクチョウ属**6. *Cygnus atratus* (Latham, 1790) コクチョウ**

Kokucho Black Swan

Range: Australasian. Breeds in Australia and Tasmania. Introduced and well established in New Zealand. Sedentary.

Status: Hokkaido (IV), Honshu (RB: Ibaraki, IV: Iwate, Miyagi, Fukushima, Tochigi, Gunma, Chiba, Tokyo), Kyushu (CB: Miyazaki).

Habitat: Freshwater lakes, marshes, large rivers.

北海道 (IV), 本州 (RB: 茨城. IV: 岩手, 宮城, 福島, 栃木, 群馬, 千葉, 東京), 九州 (CB: 宮崎).

湖沼, 河川に生息.

7. *Cygnus olor* (Gmelin, 1789) コブハクチョウ

See Part A (No. 17).

Order COLUMBIFORMES ハト目**Family COLUMBIDAE ハト科****COLUMBA Linnaeus カワラバト属****8. *Columba livia* Gmelin, 1789 カワラバト (ドバト)**

Kawara-bato (Do-bato) Rock Dove

Range: Resident in temperate and tropical Eurasia from the British Isles and

Iberian Peninsula across Europe to China, Turkestan, south to India, and Sri Lanka; also in and w Africa. About 9-13 subspecies. Introduced over the world.

Status: Hokkaido (RB), Honshu (RB), Awashima I. (AV), Sado (RB), Shikoku (RB), Kyushu (RB), Tsushima (RB), Izu Is. (IV: Shikinejima I., Miyakejima I.), Ogasawara Is. (IV), Tokara Is. (IV), Amami Is. (RB), Ryukyu Is. (RB).

Habitat: Suburban and urban areas.

北海道 (RB), 本州 (RB), 粟島 (AV), 佐渡 (RB), 四国 (RB), 九州 (RB), 対馬 (RB), 伊豆諸島 (IV: 式根島, 三宅島), 小笠原諸島 (IV), トカラ列島 (IV), 奄美諸島 (RB), 琉球諸島 (RB).

農耕地や市街地に生息する.

STREPTOPELIA Bonaparte キジバト属

9. *Streptopelia decaocto* (Frivaldszky, 1838) シラコバト

See Part A (No. 75).

9-1. *Streptopelia decaocto decaocto* (Frivaldszky, 1838) シラコバト

See Part A (No. 75-1).

Order CICONIIFORMES コウノトリ目

Family CICONIIDAE コウノトリ科

CICONIA Brisson コウノトリ属

10. *Ciconia boyciana* Swinhoe, 1873 コウノトリ

See Part A (No. 119).

Order PELECANIFORMES ペリカン目

Family THRESKIORNITHIDAE トキ科

NIPPONIA Reichenbach トキ属

11. *Nipponia nippon* (Temminck, 1835) トキ

See Part A (No. 152).

Order CHARADRIIFORMES チドリ目

Family RECURVIROSTRIDAE セイタカシギ科

HIMANTOPUS Brisson セイタカシギ属

12. *Himantopus himantopus* (Linnaeus, 1758) セイタカシギ

See Part A (No. 210).

12-1. *Himantopus himantopus mexicanus* (Müller, 1776) クロエリセイタカシギ

Range: Breeds in w and s US to n and c Southern America, West Indies and Galapagos. Mainly sedentary.

Status: Honshu (CB: Osaka, WV: Aichi, Kyoto, Nara).

Habitat: Shallow marshes, rice fields.

本州 (CB: 大阪, WV: 愛知, 京都, 奈良).

水田, 河口部, 湖沼畔, 湿地に生息する.

Order PSITTACIFORMES インコ目

Family PSITTACIDAE インコ科

MELOPSITTACUS Gould セキセイインコ属

13. *Melopsittacus undulatus* (Shaw, 1805) セキセイインコ

Sekisei-inko Budgerigar

Range: Resident in Australia. Monotypic. Introduced in Japan and s US.

Status: C and sw Honshu (CB: Tokyo, Yamanashi, Okayama), Kyushu (CB: Fukuoka).

Habitat: Reed marshes.

本州中・南西部 (CB: 東京, 山梨, 岡山). 九州 (CB: 福岡).
ヨシ原に生息する.

PSITTACULA Cuvier ダルマインコ属

14. *Psittacula eupatria* (Linnaeus, 1766) オオホンセイインコ

O-honsei-inko Alexandrine Parakeet

Range: Resident in s Asia from e Afghanistan and Sri Lanka to Vietnam. Five subspecies. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州中部 (CB: 東京).

樹木の多い住宅地や農耕地に生息する.

15. *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) ホンセイインコ

Honsei-inko Rose-ringed Parakeet

Range: Resident in tropical Africa from Senegambia to Somalia and s Asia from Pakistan, India and Sri Lanka to Myanmar. Four subspecies.

15-1. *Psittacula krameri manillensis* (Bechstein, 1800) ワカケホンセイインコ

Range: Resident in the Indian Peninsula and Sri Lanka. Introduced in Europe, Japan, and US

Status: C and se Honshu (RB: Gunma, Chiba, Saitama, Tokyo, Kanagawa. CB: Gifu, Aichi, Kyoto, Hiroshima).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州中・南西部 (RB: 群馬, 千葉, 埼玉, 東京, 神奈川. CB: 岐阜, 愛知, 京都, 広島).

樹木の多い住宅地や農耕地に生息する.

16. *Psittacula alexandri* (Linnaeus, 1758) ダルマインコ

Daruma-inko Red-breasted Parakeet

Range: Resident in s Asia from the Himalayas to s China, Vietnam, Andaman Is., Java and Bali. Eight subspecies.

16-1. *Psittacula alexandri fasciata* (Müller, 1776) ダルマインコ

Range: Resident from the Himalayas to s China, Hainan, and Vietnam. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Residential areas with trees.

本州中部 (CB: 東京).

樹木の多い住宅地に生息する.

MYIOPSITTA Bonaparte オキナインコ属

17. *Myiopsitta monachus* (Boddaert, 1783) オキナインコ

Okina-inko Monk Parakeet

Range: Resident in Bolivia, s and se Brazil, Paraguay, Uruguay, and Argentina.

17-U. *Myiopsitta monachus* ssp. 亜種不明

Status: Sw Honshu (CB: Hyogo).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州南西部 (CB: 兵庫).

樹木の多い住宅地や農耕地に生息する.

Order PASSERIFORMES スズメ目

Family CORVIDAE カラス科

UROCISSA Cabanis サンジャク属

18. *Urocissa caerulea* Gould, 1863 ヤマムスメ

Yamamusume Taiwan Blue Magpie

Range: Resident in Taiwan.

Status: Sw Honshu (CB: Hyogo).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州南西部 (CB: 兵庫).

樹木の多い住宅地や農耕地に生息する.

PICA Brisson カササギ属

19. *Pica pica* (Linnaeus, 1758) カササギ

See Part A (No. 430).

19-1. *Pica pica serica* Gould, 1845 カササギ

See Part A (No. 430-1).

Family ZOSTEROPIDAE メジロ科

ZOSTEROPS Vigors & Horsfield メジロ属

20. *Zosterops japonicus* Temminck & Schlegel, 1845 メジロ

See Part A (No. 485).

20-1. *Zosterops japonicus stejnegeri* Seeböhm, 1891 シチトウメジロ

See Part A (No. 485-2).

20-2. *Zosterops japonicus alani* Hartert, 1905 イオウトウメジロ

See Part A (No. 485-3).

Family TIMALIIDAE チメドリ科

GARRULAX Lesson ガビチヨウ属

21. *Garrulax canorus* (Linnaeus, 1758) ガビチヨウ

Gabicho Chinese Hwamei

Range: Resident in China north to Shensi and s Kansu, west to Yunnan, Hainan, Taiwan, and n Indochina. Three subspecies. Introduced in Japan.

21-U. *Garrulax canorus* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (RB: Miyagi, Tochigi, Fukushima, Gunma, Nagano, Ibaraki, Saitama, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Shizuoka, Aichi), Kyushu (RB: Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki).

Habitat: Open woods in hills and plains.

本州 (RB: 宮城, 栃木, 福島, 群馬, 長野, 茨城, 埼玉, 東京, 神奈川, 山梨, 静岡, 愛知), 九州 (RB: 福岡, 佐賀, 長崎, 大分, 熊本, 宮崎).

丘陵地や平野部の低木林に生息する.

22. *Garrulax cineraceus* (Godwin-Austen, 1874) ヒゲガビチヨウ

Hige-gabicho Moustached Laughingthrush

Range: Resident from Assam east across Myanmar, n Indochina, and to e China, north to Hopeh.

22-U. *Garrulax cineraceus* ssp. 亜種不明

Status: Shikoku (RB: Ehime, Kochi).

Habitat: Forests, shrubs at low altitudes.

四国 (RB: 愛媛, 高知).

低標高地の森林, 低木林に生息する.

23. *Garrulax perspicillatus* (Gmelin, 1789) カオグロガビチヨウ

Kaoguro-gabicho Masked Laughingthrush

Range: Resident in China and Vietnam, north to s Shansi and Honan. Monotypic. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (RB: Tokyo. CB: Gunma, Kanagawa).

Habitat: Broad-leaved and mixed forests, bamboo shrubs at low altitudes.

本州中部 (RB: 東京, CB: 群馬, 神奈川).

低標高の山地や平野部の低木林や竹林に生息する。

24. *Garrulax sannio* Swinhoe, 1867 カオジロガビチョウ

Kaojiro-gabicho White-browed Laughingthrush

Range: Resident in s Asia from Assam east across Tibet, n Indochina, east to se China. Sedentary.

24-U. *Garrulax sannio* ssp. 亜種不明

Status: C Honshu (RB: Gunma. IV: Ibaraki, Chiba).

Habitat: Forests, shrubs.

本州中部 (RB: 群馬. IV : 茨城, 千葉).

森林, 低木林に生息する.

LEIOTHRIX Swainson ソウシチョウ属

25. *Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) ソウシチョウ

Soshicho Red-billed Leiothrix

Range: Resident in s Asia from e Punjab and w India east to s China and n Vietnam. About six subspecies. Introduced in Japan and Hawaii.

25-U. *Leiothrix lutea* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (RB: south of Kanto), Shikoku (RB), Kyushu (RB).

Habitat: Forests, shrubs.

本州 (RB: 関東以南), 四国 (RB), 九州 (RB).

森林, 低木林に生息する.

Family STURNIDAE ムクドリ科

ACRIDOTHERES Vieillot ハツカチョウ属

26. *Acridotheres cristatellus* (Linnaeus, 1766) ハツカチョウ

Hakkacho Crested Myna

Range: Resident in e Asia from c and s China to Indochina, Hainan and Taiwan. Three subspecies.

26-1. *Acridotheres cristatellus cristatellus* (Linnaeus, 1766) ハッカチョウ

Range: Resident in c and s China. Introduced in Japan, Canada (Vancouver I.), and Philippines.

Status: Honshu (RB: Tokyo, Kanagawa, Shiga, Osaka, Kyoto, Hyogo), Shikoku (CB: Kagawa).

Habitat: Cultivated fields, residential area with woods.

本州 (RB: 東京, 神奈川, 滋賀, 大阪, 京都, 兵庫), 四国 (CB: 香川).
農耕地, 林がある住宅地などに生息する.

27. *Acridotheres javanicus* Cabanis, 1851 モリハッカ

Mori-hakka White-vented Myna

Range: Resident on Java and Bali. Monotypic. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (CB: Tokyo), Yonagunijima I. (CB).

Habitat: Cultivated fields, parks.

本州中部 (CB: 東京), 与那国島 (CB).

農耕地や公園に生息する.

28. *Acridotheres ginginianus* (Latham, 1790) ハイイロハッカ

Haiiro-Hakka Bank Myna

Range: Resident in Pakistan, n India, Nepal, and w Assam. Monotypic. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州中部 (CB: 東京).

農耕地や住宅地に生息する.

29. *Acridotheres tristis* (Linnaeus, 1766) インドハッカ

Indo-hakka Common Myna

Range: Resident in s Asia from Afghanistan, India, and Sri Lanka east to Vietnam and Malay Peninsula. Two subspecies.

28-1. *Acridotheres tristis tristis* (Linnaeus, 1766) インドハッカ

Range: Range of the species except Sri Lanka. Introduced in South Africa, Japan, Australia, and New Zealand.

Status: C Honshu (CB: Chiba, Kanagawa), Ishigakijima I. (CB).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州中部 (CB: 千葉, 神奈川), 石垣島 (CB).
農耕地や住宅地に生息する.

GRACUPICA Lesson クビウムクドリ属

30. *Gracupica contra* (Linnaeus, 1758) ホオジロムクドリ

Hojiro-mukudori Pied Myna

Range: Resident in s Asia from India east to Laos and Sunda Is. Five subspecies. Introduced in Japan.

30-U. *Gracupica contra* ssp. 亜種不明

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Cultivated fields, residential areas.

本州中部 (CB: 東京).

農耕地や住宅地に生息する.

Family PLOCEIDAE ハタオリドリ科

PLOCEUS Cuvier キハタオリ属

31. *Ploceus intermedius* Rüppell, 1845 メンハタオリドリ

Men-hataoridori Lesser Masked Weaver

Range: Resident in e and s Africa. Three subspecies. Introduced in Japan.

31-U. *Ploceus intermedius* ssp. 亜種不明

Status: C Honshu (CB: Chiba).

Habitat: Open woodlands, cultivated fields, parks.

本州中部 (CB: 千葉).

疎林, 農耕地, 公園に生息する.

EUPLECTES Swainson キンランチョウ属

32. *Euplectes orix* (Linnaeus, 1758) オオキンランチョウ

O-Kinrancho Southern Red Bishop

Range: Resident in s Africa south from sw Kenya.

32-U. *Euplectes orix* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (CB: Shizuoka, Kyoto).

Habitat: Cultivated fields, grasslands.

本州 (CB: 静岡, 京都).

農耕地や草原に生息する.

Family ESTRILDIDAE カエデチヨウ科**ESTRILDA Swainson カエデチヨウ属**33. *Estrilda melpoda* (Vieillot, 1817) ホオアカカエデチヨウ

Hoaka-kaedecho Orange-cheeked Waxbill

Range: Resident in w tropical Africa from Senegambia east to Lake Chad and Zaire. Introduced in Japan, Hawaii, and Puerto Rico. Two subspecies.

33-U. *Estrilda melpoda* ssp. 亜種不明

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Clear-cut area in forests, grasslands.

本州中部 (CB: 東京).

伐採跡や草原に生息する.

34. *Estrilda troglodytes* (Lichtenstein, 1823) カエデチヨウ

Kaedecho Black-rumped Waxbill

Range: Resident in w tropical Africa from Senegambia east to Sudan and Eritrea. Monotypic. Introduced in Japan, Hawaii, and Puerto Rico.

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: River beds, marshes.

本州中部 (CB: 東京).

湿地, 河川敷などに生息する.

AMANDAVA Blyth ベニスズメ属35. *Amandava amandava* (Linnaeus, 1758) ベニスズメ

Benisuzume Red Avadavat

Range: Resident in s Asia from Pakistan to Vietnam and Sunda Is. Three sub-

species. Introduced in Japan, Singapore, Sumatra, Philippines, Hawaii, and Fiji.

35-U. *Amandava amandava* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (CB: Tochigi, Tokyo, Kanagawa, Yamanashi, Kyoto, Osaka, Hyogo, Yamaguchi), Shikoku (CB: Tokushima, Ehime), Kyushu (CB: Fukuoka, Kagoshima).

Habitat: Reed marshes.

本州 (CB: 栃木, 東京, 神奈川, 山梨, 京都, 大阪, 兵庫, 山口), 四国 (CB: 徳島, 愛媛), 九州 (CB: 福岡, 鹿児島).

ヨシ原に生息する.

LONCHURA Sykes キンパラ属

36. *Lonchura striata* (Linnaeus, 1766) コシジロキンパラ

Koshijiro-kinpara White-rumped Munia

Range: Resident from n and s India, Nepal, Sri Lanka east across Myanmar, Thailand, and Indochina, east to e China; also Andaman Is., Nicobar Is., Sumatra, Hainan, and Taiwan.

36-U. *Lonchura striata* ssp. 亜種不明

Status: Okinawajima I. (RB).

Habitat: Cultivated fields, grasslands.

沖縄島 (RB).

農耕地, 草地に生息する.

37. *Lonchura punctulata* (Linnaeus, 1758) シマキンパラ

Shima-kinpara Scaly-breasted Munia

Range: Resident in s Asia from India and Sri Lanka east to Vietnam, the Malay Peninsula, Indonesian islands, and Philippines. About twelve subspecies.

37-1. *Lonchura punctulata topela* (Swinhoe, 1863) シマキンパラ

Range: Resident in s China, Hainan, Thailand, Vietnam, and Taiwan. Introduced in Mauritius, Reunion, Seychelles, Japan, Australia, and Hawaii.

Status: Amami Is. (CB: Amami-Oshima I., Tokunoshima I.), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Kumejima I., Izenajima I., Iheyajima I., Tokashikijima I., Miyakojima I. PV: Yonagunijima I.).

Habitat: Cultivated fields, grasslands.

奄美諸島 (CB: 奄美大島, 徳之島), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 久米島, 伊是名島, 伊平屋島, 渡嘉敷島, 宮古島. PV: 与那国島). 与那国島は台湾からの自然飛来の可能性がある.

農耕地, 草地に生息する.

38. *Lonchura malacca* (Linnaeus, 1766) ギンパラ

Ginpara Tricolored Munia

Range: Resident in the Indian Peninsula and Sri Lanka. Monotypic. Introduced in Japan, Hong Kong, and Hawaii (Oahu).

Status: Honshu (CB: Tokyo, Hyogo), Ryukyu Is. (CB: Okinawajima I., Miyakojima I.).

Habitat: Cultivated fields, grasslands, shrubs.

本州 (CB: 東京, 兵庫), 琉球諸島 (CB: 沖縄島, 宮古島).

農耕地, 草地, ヨシ原, 低木林に生息する.

39. *Lonchura atricapilla* (Vieillot, 1807) キンパラ

Kinpara Chestnut Munia

Range: Resident in s Asia from Nepal and nw India east to Philippines and Sulawesi, north to s China (Yunnan), and Taiwan. About ten subspecies. Introduced in Japan, Australia, Micronesia, Hawaii, and Puerto Rico.

39-U. *Lonchura atricapilla* ssp. 亜種不明

Status: Honshu (CB: Tokyo, Osaka, Hyogo, Yamaguchi), Shikoku (CB: Kochi), Kyushu (CB: Fukuoka), Ryukyu Is. (RB: Okinawajima I., Miyakojima I.).

Habitat: Cultivated fields, grasslands, shrubs.

本州 (CB: 東京, 大阪, 兵庫, 山口), 四国 (CB: 高知), 九州 (CB: 福岡), 琉球諸島 (RB: 沖縄島, 宮古島).

農耕地, 草地, ヨシ原, 低木林に生息する.

40. *Lonchura maja* (Linnaeus, 1766) ヘキチヨウ

Hekicho White-headed Munia

Range: Resident in s Thailand, the Malay Peninsula, and Sunda Is. east to Bali. Monotypic. Introduced in Japan.

Status: Honshu (CB: Tokyo, Hyogo), Shikoku (CB: Tokushima).

Habitat: Abandoned rice fields, reed marshes.

本州 (CB: 東京, 兵庫), 四国 (CB: 徳島).

休耕田やヨシ原に生息する.

41. *Lonchura oryzivora* (Linnaeus, 1758) ブンチョウ

Buncho Java Sparrow

Range: Resident in Java, Bali and Lombok. Monotypic. Introduced in China, Japan, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, Philippines, Indonesian islands, e Africa, s US, and Hawaii.

Status: Honshu (CB: Tokyo, Osaka, Hyogo), Kyushu (CB: Fukuoka).

Habitat: Abandoned rice fields, open woods.

本州 (CB: 東京, 大阪, 兵庫), 九州 (CB: 福岡).

休耕田や屋敷林に生息する.

Family VIDUIDAE テンニンチョウ科**VIDUA Cuvier テンニンチョウ属****42. *Vidua paradisaea* (Linnaeus, 1758) ホウオウジャク**

Hoojaku Long-tailed Paradise Whydah

Range: Resident in Africa from Sudan and Eritrea south to s Africa. Monotypic. Introduced in Japan.

Status: C Honshu (CB: Tokyo).

Habitat: Rice fields, reclaimed areas.

本州中部 (CB: 東京).

水田, 埋立地などに生息する.

Family THRAUPIDAE フウキンチョウ科**PAROARIA Bonaparte コウカンチョウ属****43. *Paroaria coronata* (Miller, 1776) コウカンチョウ**

Kokancho Red-crested Cardinal

Range: Resident in South America from se Brazil to e Bolivia and c Argentina. Monotypic. Introduced in Japan and Hawaii.

Status: Honshu (CB: Saitama, Tokyo, Osaka).

Habitat: Shrubs, bushes.

本州 (CB: 埼玉, 東京, 大阪).
低木林や藪に生息する.

Appendix A

Species and Subspecies with no records over the last 50 years in Japan

最近 50 年以上国内で記録のない種・亜種

- Dendrocygna javanica* リュウキュウガモ (6)
Cygnus olor コブハクチョウ (17)
Tadorna cristata カンムリツクシガモ (23)
Columba versicolor † オガサワラカラスバト † (72)
Columba jouyi † リュウキュウカラスバト † (73)
Ixobrychus sinensis bryani マリアナヨシゴイ (133-2)
Nycticorax caledonicus crassirostris † ハシブトゴイ † (140-1)
Porzana cinerea brevipes † マミジロクイナ † (172-1)
Charadrius mongolus mongolus モウコメダイチドリ (205-1)
Numenius tenuirostris シロハラチュウシャクシギ (229)
Procelsterna cerulea saxatilis ハイイロアジサシ (276-1)
Sterna lunata ナンヨウマミジロアジサシ (309)
Alca torda islandica オオハシウミガラス (326-1)
Otus lempiji ussuriensis サメイロオオコノハズク (366-1)
Todiramphus miyakoensis † ミヤコショウビン † (382)
Merops ornatus ハチクイ (386)
Jynx torquilla chinensis シベリアアリスイ (388-1)
Dryocopus javensis richardsi † キタタキ † (395-1)
Falco columbarius pacificus ヒガシコチョウゲンボウ (403-2)
Falco peregrinus furuitii † シマハヤブサ † (407-3)
Lanius excubitor mollis シベリアオオモズ (425-1)
Nucifraga caryocatactes macrorhynchos ハシナガホシガラス (431-1)
Poecile montanus sachalinensis カラフトコガラ (441-1)
Poecile varius orii † ダイトウヤマガラ † (442-4)
Apalopteron familiare familiare † メグロ † (483-1)
Troglodytes troglodytes orii † ダイトウミソサザイ † (504-4)
Cichlopasser terrestris † オガサワラガビチョウ † (515)
Luscinia komadori subrufus † ウスアカヒゲ † (531-3)

Chaunoproctus ferreorostris † オガサワラマシコ † (593)

Emberiza pallasi pallasi オオシベリアジュリン (626-2)

* カッコ内の数字は Part A の種番号.

* Numbers in the parentheses are sp. No. in Part A.

* † は絶滅した種・亜種.

* Extinct species and subspecies are indicated as † .

Appendix B

Species and Subspecies Presently Unaccepted 検討中の種・亜種

- Anser albifrons gambelli* オオマガン
Branta canadensis parvipes チュウカナダガン
Branta hutchinsii taverneri チュウショウカナダガン
Somateria mollissima ホンケワタガモ (オオケワタガモ)
Bucephala islandica キタホオジロガモ
Lophodytes cucullatus オウギアイサ
Streptopelia chinensis chinensis カノコバト
Macropygia tenuirostris オナガバト
Diomedea exulans ワタリアホウドリ
Daption capense マダラフルマカモメ
Pterodroma ultima ウスハジロミズナギドリ
Pterodroma cahow バミューダミズナギドリ
Pterodroma arminjoniana ムナフシロハラミズナギドリ
Pterodroma cervicalis クビワオオシロハラミズナギドリ
Pterodroma cookii ハジロシロハラミズナギドリ
Garrodia nereis ヒメアシナガウミツバメ
Fregetta grallaria シロハラウミツバメ
Oceanodroma microsoma コウミツバメ
Fregata andrewsi シロハラグンカンドリ
Ardeola speciosa ジャワアカガシラサギ
Plegadis falcinellus ブロンズトキ
Crex crex ウズラクイナ
Porphyrio porphyrio セイケイ
Clamator jacobinus クロシロカンムリカッコウ
Aerodramus vanikorensis ムジアナツバメ
Aerodramus fuciphagus germani マレーアナツバメ (ジャワアナツバメ)
Hirundapus cochinchinensis formosanus クロビタイハリオアマツバメ
Tachymarptis melba シロハラアマツバメ
Apus apus pekinensis ヨーロッパアマツバメ

Charadrius mongolus schaeferi チベットメダイチドリ
Arenaria melanocephala クロキョウジョシギ
Calidris pusilla ヒレアシトウネン
Calidris alpina kistchinski カムチャツカハマシギ
Calidris alpina actites カラフトハマシギ
Larus delawarensis オビハシカモメ
Larus californicus カリフォルニアカモメ
Larus cachinnans cachinnans カスピセグロカモメ
Brachyramphus brevirostris コバシウミスズメ
Synthliboramphus hypoleucus セグロウミスズメ
Ptychoramphus aleuticus アメリカウミスズメ
Haliastur indus シロガシラトビ
Circus pygargus ヒメハイイロチュウヒ
Accipiter gentilis schvedowi チョウセンオオタカ
Buteo lagopus kamtschatkensis カムチャツカケアシノスリ
Buteo lagopus sanctijohannis クロケアシノスリ
Aquila nipalensis ソウゲンワシ
Falco peregrinus calidus ウスハヤブサ
Lanius cristatus cristatus カラアカモズ
Lanius cristatus confusus ウスアカモズ
Alauda gulgula タイワンヒバリ
Ptyonoprogne rupestris チャイロツバメ
Hypsipetes leucocephalus クロヒヨドリ
Cettia diphone canturians カラウグイス
Phylloscopus armandii モウコムジセッカ
Phylloscopus humei バフマユムシクイ
Phylloscopus trochiloides trochiloides ニシヤナギムシクイ
Phylloscopus tenellipes アムールムシクイ
Phylloscopus reguloides claudiae ヒマラヤムシクイ
Phylloscopus ricketti マユグロムシクイ
Paradoxornis webbianus fulvicauda ダルマエナガ
Heterophasia auricularis ミミジロチメドリ
Bradypterus davidi バイカルオウギセッカ
Acrocephalus concinens コバネヨシキリ
Hippolais icterina キイロウタムシクイ

Prinia inornata マミハウチワドリ
Aplonis panayensis ミドリカラスモドキ
Turdus philomelos ウタツグミ
Phoenicurus frontalis ルリビタイジョウビタキ
Rhyacornis fuliginosa カワビタキ
Myiomela leucura コンヒタキ
Saxicola insignis オオノビタキ
Monticola saxatilis コシジロイソヒヨドリ
Ficedula narcissina elisae キムネビタキ
Ficedula parva ニシオジロビタキ
Niltava sundara コチャバラオオルリ
Anthus campestris ムジタヒバリ
Anthus gustavi menzbieri コセジロタヒバリ
Anthus rubescens rubescens アメリカタヒバリ
Anthus spinoletta blakistoni サメイロタヒバリ
Chloris sinica ussuriensis チョウセンカワラヒワ
Carduelis carduelis ゴシキヒワ
Emberiza cioides castaneiceps チョウセンホオジロ
Emberiza aureola aureola キタシマアオジ

INDEX

A

- aalge, Uria* 185
Accipiter 199
Accipitridae 192
Accipitriiformes 191
Acridotheres 396
Acrocephalidae 297
Acrocephalus 297
Actitis 143
acuminata, Calidris 150
acuta, Anas 22
adamsii, Gavia 51
aedon, Acrocephalus 299
Aegithalidae 282
Aegithalos 282
Aegolius 213
Aegyptius 196
Aerodramus 110
aeruginosus, Circus 197
Aethia 189
affinis, Aythya 29
affinis, Phylloscopus 285
agricola, Acrocephalus 298
Agropsar 307
Aix 16
akahige, Luscinia 321
alani, Zosterops 293, 394
Alauda 269
Alaudidae 267
alba, Ardea 83, 84
alba, Calidris 146
alba, Gygis 161
alba, Motacilla 348
albatrus, Phoebastria 53
albellus, Mergellus 34
albeola, Bucephala 33
albicilla, Ficedula 338
albicilla, Haliaeetus 194
albidus, Accipiter 201
albifrons, Anser 9
albifrons, Sterna 175
alboides, Motacilla 348
Alca 185
Alcedinidae 217
Alcedo 220
Alcidae 184
aleutica, Sterna 175
alexandri, Psittacula 393
alexandrinus, Charadrius 119
aliciae, Catharus 313
Alle 184
alle, Alle 184
alpestris, Eremophila 270
alpina, Calidris 151
amamiensis, Parus 265
amamii, Dendrocopos 227
amamii, Poecile 263
Amandava 399
amandava, Amandava 399
Amaurornis 96
amaurotis, Hypsipetes 276
americana, Anas 19
americana, Aythya 26
americana, Melanitta 32
amnicola, Locustella 297
amurensis, Butorides 80
amurensis, Dendrocopos 228
amurensis, Falco 234
amurensis, Sitta 302
anaethetus, Sterna 176
Anas 17
Anatidae 6, 388
anatum, Falco 239
Anous 159
Anser 6
anser, Anser 8
Anseriformes 6, 388
Anthropoides 93
Anthus 351
antiquus, Synthliboramphus 187
Apalopteron 291
Apodidae 110
Apodiformes 110
apricaria, Pluvialis 115
Apus 112
aquaticus, Rallus 95
Aquila 205
arctica, Gavia 50
articola, Calidris 152
arctoa, Leucosticte 359
Ardea 82
Ardeidae 74
Ardeola 80
Arenaria 144
argentatus, Larus 170
ariel, Fregata 67, 68
arquata, Numenius 135
arra, Uria 184
Artamidae 240
Artamus 240

arvensis, Alauda 269
asiatica, Sitta 302
Asio 215
ater, Periparus 264
atlanticus, Anser 11
atra, Fulica 101, 102
atratus, Cygnus 389
atricapilla, Lonchura 401
atricapilla, Zonotrichia
 384
atricilla, Larus 165
atrocaudata, Terpsiphone
 245
atrogularis, Turdus 317
atthis, Alcedo 220
aurea, Zoothera 311
aureola, Emberiza 377
auritus, Podiceps 39
auroreus, Phoenicurus 327
avosetta, Recurvirostra
 124
awokera, Picus 231, 232
Aythya 25
azurea, Hypothymis 245

B

bacchus, Ardeola 80
baeri, Aythya 27
baicalensis, Motacilla 348
bairdii, Calidris 149
Bambusicola 386
bangsi, Halcyon 218
bangsi, Sterna 178
bannermani, Puffinus 60
baueri, Limosa 132
bengalensis, Alcedo 220

bengalensis, Centropus
 104
bengalensis, Sterna 175
benghalensis, Rostratula
 157
bergii, Sterna 174
bernicla, Branta 12
bianchii, Lanius 250
biarmicus, Panurus 266
bicolor, Tachycineta 272
bifasciata, Loxia 364
bimaculata, Melanocorypha
 267
bistrigiceps, Acrocephalus
 298
blakistoni, Ketupa 211
bochaiensis, Luscinia 324
Bombycilla 301
Bombycillidae 301
bonasia, Tetrastes 1
borealis, Cettia 279
borealis, Phylloscopus 287
borealoides, Phylloscopus
 288
borissowi, Bubo 211
borodinonis, Hypsipetes
 277
Botaurus 74
boycciana, Ciconia 66, 390
brachydactyla, Calandrella
 267
Brachyramphus 187
brachyrhynchus, Larus 168
brandtii, Garrulus 251
Branta 11, 388
brevipes, Heteroscelus 141

brevipes, Porzana 99, 404
brevirostris, Aerodramus
 110
brevirostris, Dendrocopos
 229
brevirostris, Dicrurus 245
brevirostris, Rissa 162
brewsteri, Sula 70
bruniceps, Emberiza 378
brunneonucha, Leucosticte
 360
brunnicephalus, Larus 164
brunniceps, Cisticola 300
bryani, Ixobrychus 75, 404
bryani, Puffinus 61
Bubo 210
bubo, Bubo 210
Bubulcus 81
buccinator, Cygnus 13
Bucephala 33
bucephalus, Lanius 247
Bucerotiformes 216
buchanani, Emberiza 373
bulleri, Puffinus 58
Bulweria 61
bulwerii, Bulweria 61
Butastur 202
Buteo 203
buteo, Buteo 203
Butorides 79

C

cachinnans, Larus 171
caerulea, Urocissa 394
caerulescens, Anser 10
caeruleus, Elanus 193

- Calandrella* 267
Calcariidae 368
Calcarius 368
caledonicus, *Nycticorax* 79
Calidris 145
caligata, *Iduna* 299
calliope, *Luscinia* 323
Calonectris 56
calonyx, *Eurystomus* 223
Campephagidae 240
canadensis, *Branta* 388
canadensis, *Grus* 90
canagicus, *Anser* 11
candida, *Gygis* 161
canorus, *Cuculus* 108
canorus, *Garrulax* 395
cantans, *Cettia* 280
canus, *Larus* 167
canus, *Picus* 232
canutus, *Calidris* 145
capillatus, *Phalacrocorax* 72
caprata, *Saxicola* 329
Caprimulgidae 109
Caprimulgiformes 109
Caprimulgus 109
carbo, *Cepphus* 186
carbo, *Phalacrocorax* 71
Cardellina 370
cardis, *Turdus* 314
Carduelis 358
carneipes, *Puffinus* 59
carolinensis, *Anas* 25
Carpodacus 361
caryocatactes, *Nucifraga* 254
caspia, *Sterna* 173
cassinii, *Pyrrhula* 365
castro, *Oceanodroma* 62
Catharus 313
caudacutus, *Hirundapus* 111
caudatus, *Aegithalos* 282
celaenops, *Turdus* 317
centralasiae, *Bombycilla* 301
Centropus 104
Cepphus 186
Cerorhinca 190
Certhia 303
Certhiidae 303
certhiola, *Locustella* 295
cerulea, *Procelsterna* 160
cervinus, *Anthus* 354
Cettia 279
Cettiidae 279
Ceyx 221
Chalcophaps 47
Charadriidae 113
Charadriiformes 113, 391
Charadrius 117
Chaunoproctus 361
cheela, *Spilornis* 196
cheleensis, *Calandrella* 268
cherrug, *Falco* 236
chinensis, *Jynx* 224, 404
chinensis, *Oriolus* 242
chinensis, *Riparia* 271
chirurgus, *Hydrophasianus* 156
Chlidonias 180
Chloris 356
chloris, *Todiramphus* 220
chloropus, *Gallinula* 100, 101
chrysaetos, *Aquila* 206
chrysolaus, *Turdus* 316
chrysophrys, *Emberiza* 375
Cichlopasser 312
Ciconia 65, 390
Ciconiidae 65, 390
Ciconiiformes 65, 390
Cinclidae 310
Cinclus 310
cineraceus, *Garrulax* 395
cineraceus, *Spodiopsar* 306
cinerea, *Ardea* 82
cinerea, *Gallicrex* 100
cinerea, *Motacilla* 347
cinerea, *Porzana* 99
cinereus, *Vanellus* 114
cinereus, *Xenus* 142
cinnamomeus, *Ixobrychus* 76
cioides, *Emberiza* 372
ciopsis, *Emberiza* 372
Circus 197
cirrhatata, *Fratercula* 191
Cisticola 300
Cisticolidae 300
citreola, *Motacilla* 346
citrinella, *Emberiza* 371
Clamator 104
clanga, *Aquila* 205
Clangula 32
clangula, *Bucephala* 33

chypeata, Anas 21
Coccothraustes 366
coccothraustes,
Coccothraustes 366
coelebs, Fringilla 355, 356
colchicus, Phasianus 4,
 387
collaris, Aythya 27
collaris, Prunella 340
collaris, Toderamphus 220
collurio, Lanius 249
collybita, Phylloscopus
 283
coloratus, Calcarius 368
Columba 42, 389
columba, Cepphus 186
columbarius, Falco 235
columbianus, Cygnus 13,
 14
Columbidae 42, 389
Columbiformes 42, 389
connectens, Corvus 258
consobrinus, Remiz 260
contra, Gracupica 398
Coraciidae 223
Coraciiformes 217
Coracina 240
corax, Corvus 258
corniculata, Fratercula
 190
coromanda, Halcyon 217
coromandelianus, Nettapus
 17
coromandus, Bubulcus 81
coromandus, Clamator 104
coronata, Paroaria 402

coronata, Setophaga 370
coronatus, Phylloscopus
 289
corone, Corvus 256
Corvidae 251, 394
Corvus 255
Coturnicops 94
Coturnix 2
crassirostris, Larus 166
crassirostris, Nycticorax
 79, 404
creatopus, Puffinus 59
crecca, Anas 24
crispus, Pelecanus 73
cristata, Sterna 174
cristata, Tadorna 16, 404
cristatella, Aethia 190
cristatellus, Acridotheres
 396, 397
cristatus, Lanius 248
cristatus, Pavo 388
cristatus, Podiceps 38
Cuculidae 104
Cuculiformes 104
cucullata, Pitta 239
Cuculus 106
cumatilis, Cyanoptila 339
cuneatus, Puffinus 57
curonicus, Charadrius 118
curruca, Sylvia 290
curtus, Anser 7
curvirostra, Loxia 363
cyane, Luscinia 324
cyaneus, Circus 198
Cyanistes 266
cyanomelana, Cyanoptila

339
Cyanopica 253
Cyanoptila 339
cyanurus, Tarsiger 325
cyanus, Cyanistes 266
cyanus, Cyanopica 253
cygnoides, Anser 6
Cygnus 13, 389
cygnus, Cygnus 14

D

dactylatra, Sula 68
daitoensis, Zosterops 293
dasypus, Delichon 275
dauma, Zoothera 311
daurica, Certhia 303
daurica, Hirundo 274
dauricus, Troglodytes 304
dauurica, Muscicapa 335
dauuricus, Corvus 255
davisoni, Zoothera 311
dealbatus, Charadrius 119
decaocto, Streptopelia 46,
 390
Delichon 274
Dendrocopos 225
Dendrocygna 6
Dendronanthus 344
deserti, Oenanthe 331
Dicruridae 243
Dicrurus 243
diffusus, Oriolus 242
Diomedidae 52
diphone, Cettia 279, 280
discors, Anas 21
divaricatus, Pericrocotus

241
domesticus, *Passer* 342
dominica, *Pluvialis* 116
dorotheae, *Phaethon* 41
dougallii, *Sterna* 177
Dryocopus 231
dubius, *Charadrius* 118
dukhunensis, *Motacilla*
 348
dumetorum, *Acrocephalus*
 299
dybowskii, *Otis* 103

E

eburnea, *Pagophila* 162
Egretta 84
Elanus 193
elegans, *Emberiza* 376
elegans, *Otus* 209
Emberiza 371
Emberizidae 371
enucleator, *Pinicola* 362
Eophona 367
epops, *Upupa* 216
Eremophila 270
erithaca, *Ceyx* 221
Erithacus 320
erythrinus, *Carpodacus*
 361
erythrogeus, *Emberiza*
 371
erythronotus, *Phoenicurus*
 326
erythropleurus, *Zosterops*
 291
erythropus, *Anser* 9

erythropus, *Tringa* 136
erythropygia, *Prunella* 341
erythrothorax, *Porzana* 98
Estrilda 399
Estrildidae 399
Eudynamys 105
eulophotes, *Egretta* 86
Eumyias 340
eunomus, *Turdus* 318
eupatria, *Psittacula* 392
Euplectes 398
eurhythmus, *Ixobrychus* 76
eurizonoides, *Rallina* 94
europaea, *Sitta* 302
Eurynorhynchus 153
Eurystomus 223
examinandus, *Phylloscopus*
 287
exasperatus, *Oceanites* 62
excubitor, *Lanius* 250
exilipes, *Carduelis* 359
exquisitus, *Coturnicops* 94
externa, *Pterodroma* 54

F

fabalis, *Anser* 7
falcata, *Anas* 18
falcinellus, *Limicola* 153
Falco 233
Falconidae 233
Falconiformes 233
familiale, *Apalopteron*
 291, 404
familiaris, *Certhia* 303
fasciata, *Psittacula* 393
fasciolata, *Locustella* 296

ferina, *Aythya* 26
ferreorostris, *Chaunoproctus*
 361, 405
ferreus, *Saxicola* 329
ferruginea, *Calidris* 150
ferruginea, *Muscicapa* 335
ferruginea, *Tadorna* 16
Ficedula 336
flammea, *Carduelis* 358,
 359
flammeus, *Asio* 215, 216
flava, *Eremophila* 270
flava, *Motacilla* 344
flavicollis, *Ixobrychus* 77
flavipes, *Tringa* 139
formosa, *Anas* 24
formosae, *Treron* 48
Fratercula 190
Fregata 67
Fregatidae 67
Fringilla 355
Fringillidae 355
frugilegus, *Corvus* 256
fucata, *Emberiza* 374
fuiyamae, *Accipiter* 202
Fulica 101
fulicarius, *Phalaropus* 155
fuligula, *Aythya* 28
Fulmarus 53
fulva, *Pluvialis* 115
fumigatus, *Troglodytes* 304
funereus, *Aegolius* 213
furcata, *Oceanodroma* 64,
 65
furuitii, *Falco* 238, 404
fusca, *Melanitta* 31

fusca, *Porzana* 98
fusca, *Sterna* 177
fuscatus, *Phylloscopus* 284
fuscescens, *Strix* 212
fuscolloides, *Calidris* 149
fuscus, *Larus* 172

G

galericulata, *Aix* 16
Gallicrex 100
Galliformes 1, 386
Gallinago 127
gallinago, *Gallinago* 129
Gallinula 100
Gallirallus 95
gambelii, *Zonotrichia* 384
Garrulax 395
Garrulus 251
garrulus, *Bombycilla* 301
garzetta, *Egretta* 85
Gavia 50
Gaviidae 50
Gaviiformes 50
Gelochelidon 172
genei, *Larus* 163
gentilis, *Accipiter* 201
ginginianus, *Acridotheres* 397
glacialis, *Fulmarus* 53
glandarius, *Garrulus* 251
Glareola 158
glareola, *Tringa* 140
Glareolidae 158
glaucescens, *Larus* 168
glaucoides, *Larus* 169
godlewskii, *Anthus* 351
goisagi, *Gorsachius* 77
Gorsachius 77
Gracupica 398
grandis, *Motacilla* 350
grebnitskii, *Carpodacus* 361
grisegena, *Podiceps* 38
griseisticta, *Muscicapa* 334
griseiventris, *Pyrrhula* 365
griseus, *Limnodromus* 130
griseus, *Puffinus* 58
Gruidae 90
Gruiformes 90
Grus 90
grus, *Grus* 92
gularis, *Accipiter* 200
gularis, *Monticola* 333
gustavi, *Anthus* 353, 354
guttifer, *Tringa* 139
gutturalis, *Hirundo* 273
Gygis 161

H

haemastica, *Limosa* 132
Haematopodidae 122
Haematopus 122
hahasima, *Apalopteron* 291
Halcyon 217
Haliaeetus 194
haliaeetus, *Pandion* 191, 192
hanedae, *Phalacrocorax* 72
hardwickii, *Gallinago* 127
heinei, *Larus* 168
heliaca, *Aquila* 205
hemilasius, *Buteo* 204
hendersoni, *Limnodromus* 130
hensoni, *Poecile* 261
Heteroscelus 141
heuglini, *Larus* 172
hiaticula, *Charadrius* 117
Hierococcyx 106
Himantopus 123, 391
himantopus, *Calidris* 152
himantopus, *Himantopus* 123, 391
Hirundapus 111
Hirundinidae 271
Hirundo 272
hirundo, *Sterna* 179
Histrionicus 30
histrionicus, *Histrionicus* 30
hodgsoni, *Anthus* 353
holbollii, *Podiceps* 38
hondoensis, *Dendrocopos* 230
hondoensis, *Strix* 212
horii, *Picus* 232
hornemanni, *Carduelis* 359
hortulana, *Emberiza* 373
hortulorum, *Turdus* 313
hottentottus, *Dicrurus* 244
humilis, *Streptopelia* 47
hutchinsii, *Branta* 11
hybrida, *Chlidonias* 180
Hydrobatidae 62
Hydrophasianus 156

hyemalis, *Clangula* 32
hyperboreus, *Larus* 169
hyperythrus, *Dendrocopos* 225
hyperythrus, *Hierococcyx* 106
hypoleuca, *Ficedula* 336
hypoleuca, *Pterodroma* 56
hypoleucos, *Actitis* 143
hypoleucus, *Elanus* 193
Hypothymis 245
Hypsipetes 276

I

ibis, *Bubulcus* 81
ichthyaetus, *Larus* 166
Iduna 299
ijimae, *Phylloscopus* 289
ijimae, *Riparia* 271
ijimae, *Syrmaticus* 4
iliaca, *Passerella* 383
iliacus, *Turdus* 319, 320
illex, *Terpsiphone* 246
immer, *Gavia* 51
immutabilis, *Phoebastria* 52
incanus, *Heteroscelus* 141
indica, *Chalcophaps* 47
indicus, *Anser* 10
indicus, *Butastur* 202
indicus, *Caprimulgus* 109
indicus, *Dendronanthus* 344
indicus, *Rallus* 95
inexpectata, *Pterodroma* 55

inornata, *Uria* 185
inornatus, *Phylloscopus* 286
inouyei, *Picoides* 230
insignis, *Falco* 235
insularis, *Periparus* 264
insularis, *Zosterops* 293
intermedia, *Coracina* 241
intermedia, *Egretta* 84, 85
intermedius, *Ploceus* 398
intermedius, *Syrmaticus* 3
interpositus, *Otus* 209
interpres, *Arenaria* 144
interstinctus, *Falco* 234
iriomotensis, *Zoothera* 312
isabellina, *Oenanthe* 329
isabellinus, *Lanius* 249
islandica, *Alca* 185, 404
iwasakii, *Accipiter* 200
Ixobrychus 75

J

Jacanidae 156
jankowskyi, *Cygnus* 14
janthina, *Columba* 43
japonensis, *Corvus* 257
japonensis, *Falco* 237
japonensis, *Grus* 91
japonensis, *Regulus* 259
japonica, *Alauda* 270
japonica, *Aquila* 206
japonica, *Bombycilla* 301
japonica, *Certhia* 303
japonica, *Coturnix* 2
japonica, *Cyanopica* 253
japonica, *Gallinago* 127

japonica, *Hirundo* 274
japonica, *Jynx* 224
japonica, *Lagopus* 2
japonica, *Loxia* 363
japonica, *Ninox* 214
japonica, *Nucifraga* 254
japonica, *Strix* 211
japonicus, *Aegithalos* 282
japonicus, *Anthus* 355
japonicus, *Buteo* 203
japonicus, *Coccothraustes* 366
japonicus, *Dendrocopos* 230
japonicus, *Garrulus* 252
japonicus, *Otus* 209
japonicus, *Zosterops* 292, 394
javanica, *Dendrocygna* 6, 404
javanicus, *Acridotheres* 397
javanicus, *Chlidonias* 180
javensis, *Dryocopus* 231
jessoensis, *Picus* 232
jotaka, *Caprimulgus* 110
jouyi, *Ardea* 82
jouyi, *Columba* 44, 404
juncidis, *Cisticola* 300
Jynx 224

K

kaiurka, *Cephus* 186
kamtschaticus, *Corvus* 258
kamtschatkensis, *Pinicola* 362

kamtschatschensis, Larus
167
karpowi, Phasianus 387
kawahariba, Chloris 357
kennicotti, Phylloscopus
287
Ketupa 211
kiautschensis, Bubo 210
kittlitz, Chloris 357
kiusiuensis, Aegithalos 282
kizuki, Dendrocopos 225,
226
komadori, Luscinia 321,
322
kotataki, Dendrocopos 226
krameri, Psittacula 392
kumlien, Larus 169
kunikyoni, Tachybaptus
37
kuntzi, Apus 113
kurodae, Apus 112

L

lagopodum, Delichon 274
Lagopus 1
lagopus, Buteo 204
lanceolata, Locustella 294
Laniidae 247
Lanius 247
lapponica, Limosa 132
lapponicus, Calcaris 368
Laridae 159
Larus 163
latham, Emberiza 371
latifascia, Emberiza 376
leclancheri, Ptilinopus 49

Leiothrix 396
lempiji, Otus 207
lepturus, Phaethon 41
leschenaultii, Charadrius
120
leucocephala, Motacilla
345
leucocephalos, Emberiza
371, 372
leucocephalus, Haliaeetus
195
leucocephalus, Himantopus
124
leucogaster, Sula 69
leucogenis, Dicrurus 244
leucogeranus, Grus 90
leucomelas, Calonectris 56
leucopareia, Branta 11
leucophaeus, Dicrurus 244
leucophrys, Zonotrichia
384
leucopsis, Motacilla 350
leucoptera, Loxia 364
leucopterus, Chlidonias
181
leucorhoa, Oceanodroma
63
leucorodia, Platalea 88
leucorynchus, Artamus 240
Leucosticte 359
leucotos, Dendrocopos 228
lherminieri, Puffinus 60
lidthi, Garrulus 252
lignator, Centropus 104
lilfordi, Grus 92
Limicola 153

Limnodromus 130
Limosa 131
limosa, Limosa 131
lineatus, Milvus 194
livia, Columba 389
lobatus, Phalaropus 155
Locustella 294
Locustellidae 294
lomvia, Uria 184
Lonchura 400
longicaudus, Stercorarius
183
longimembris, Tyto 207
longipennis, Calandrella
268
longipennis, Sterna 179
longirostris, Pterodroma
56
lonnbergi, Alauda 269
loochooensis, Zosterops
293
Loxia 363
lucionensis, Lanius 248
lucens, Motacilla 349
lugubris, Megascops 222
lugubris, Surniculus 105
lunata, Sterna 176, 404
Luscinia 321
lutea, Leiothrix 396
luzonica, Anas 20
Lymnocyptes 126

M

maccormicki, Stercorarius
182
macrocerus, Dicrurus 243

- macronyx*, *Motacilla* 345
macroptera, *Ninox* 213
macrorhynchos, *Corvus* 257
macrorhynchos, *Nucifraga* 254, 404
macrourus, *Circus* 198
macularius, *Actitis* 143
madagascariensis, *Numenius* 135
magnirostris, *Hypsipetes* 277
magnus, *Aegithalos* 282
magnus, *Aegolius* 213
maja, *Lonchura* 401
major, *Dendrocopos* 229
major, *Halcyon* 218
major, *Zoothera* 312
malacca, *Lonchura* 401
maldivarum, *Glareola* 158
mandarinus, *Turdus* 314
mandshuricus, *Corvus* 257
manilensis, *Ardea* 83
manillensis, *Psittacula* 392
marcusi, *Anous* 160
marila, *Aythya* 28, 29
martius, *Dryocopus* 231
matsudairae, *Oceanodroma* 64
matsudairai, *Dendrocopos* 226
mauri, *Calidris* 146
medioximus, *Treron* 49
Megaceryle 222
megala, *Gallinago* 129
Melanitta 31
melanocephala, *Emberiza* 378
melanocephalus, *Threskiornis* 87
Melanocorypha 267
melanoleuca, *Tringa* 139
melanoleucos, *Circus* 199
melanolophus, *Gorsachius* 78
melanotos, *Calidris* 149
melanuroides, *Limosa* 131
melaschistos, *Coracina* 240
melodia, *Melospiza* 383
Melopsittacus 392
Melospiza 383
melpoda, *Estrilda* 399
menzbieri, *Buteo* 205
menzbieri, *Limosa* 132
merganser, *Mergus* 34, 35
Mergellus 34
Mergus 34
Meropidae 222
Merops 222
merula, *Turdus* 314
mexicanus, *Himantopus* 391
micropterus, *Cuculus* 107
middendorffii, *Anser* 7
migrans, *Milvus* 193
migratoria, *Eophona* 367
Milvus 193
minima, *Branta* 12
minimus, *Catharus* 313
minimus, *Lymnocyptes* 126
minor, *Chloris* 357
minor, *Dendrocopos* 227
minor, *Fregata* 67
minor, *Parus* 264, 265
minor, *Platalea* 89
minussensis, *Sterna* 179
minuta, *Calidris* 147
minutus, *Anous* 160
minutus, *Larus* 165
minutus, *Numenius* 133
mira, *Scolopax* 126
miyakoensis, *Todiramphus* 220, 404
modesta, *Ardea* 84
moiffitti, *Branta* 389
mollis, *Lanius* 250, 404
momiyamae, *Strix* 212
monacha, *Grus* 92
monachus, *Aegyptius* 196
monachus, *Myiopsitta* 393
Monarchidae 245
monedula, *Corvus* 255
mongola, *Muscicapa* 333
mongolica, *Melanocorypha* 267
mongolicus, *Larus* 171
mongolus, *Charadrius* 120, 404
monocerata, *Cerorhinca* 190
monorhis, *Oceanodroma* 63
montanella, *Prunella* 341
montanus, *Passer* 343
montanus, *Poecile* 261
Monticola 332

montifringilla, *Fringilla* 356
morinellus, *Charadrius* 122
mosukei, *Troglodytes* 305
Motacilla 344
Motacillidae 344
mugimaki, *Ficedula* 338
Muscicapa 333
Muscicapidae 311
muta, *Lagopus* 1
Myiopsitta 393

N

nagamichii, *Hypsipetes* 278
namiyei, *Dendrocopos* 229
namiyei, *Hirundo* 273
namiyei, *Luscinia* 322
namiyei, *Poecile* 262
narcissina, *Ficedula* 337
nativitatis, *Puffinus* 59
naumanni, *Falco* 233
naumanni, *Turdus* 318, 319
nebularia, *Tringa* 138
neglecta, *Pterodroma* 54
Netta 25
Nettapus 17
newelli, *Puffinus* 60
niger, *Chlidonias* 181
nigra, *Ciconia* 65
nigrescens, *Dendrocopos* 227
nigricollis, *Podiceps* 39, 40
nigriloris, *Parus* 265
nigripennis, *Pterodroma*

55
nigripes, *Phoebastria* 52
nilotica, *Gelochelidon* 172, 173
Niltava 340
Ninox 213
nipalensis, *Apus* 113
nipalensis, *Nisaetus* 206
nippon, *Dendrocopos* 226
nippon, *Nipponia* 88, 391
Nipponia 88, 391
Nisaetus 206
nisosimilis, *Accipiter* 201
nisus, *Accipiter* 201
nitens, *Columba* 44
nivalis, *Plectrophenax* 369
noguchii, *Sapheopipo* 233
nubilosa, *Sterna* 177
Nucifraga 254
Numenius 133
Nycticorax 78
nycticorax, *Nycticorax* 78, 79
nympha, *Pitta* 239
nyroca, *Aythya* 27

O

obscurus, *Turdus* 315
oceanicus, *Oceanites* 62
Oceanites 62
Oceanodroma 62
ochotensis, *Locustella* 294
ochropus, *Tringa* 140
ochruros, *Phoenicurus* 326
ocularis, *Motacilla* 349
Oenanthe 329

oenanthe, *Oenanthe* 330
oenas, *Columba* 42
ogawae, *Hypsipetes* 278
ogawae, *Troglodytes* 305
okinavensis, *Turnix* 158
okinawae, *Gallirallus* 95
okinawae, *Parus* 265
olivaceus, *Poecile* 263
olor, *Cygnus* 13, 389, 404
onocrotalus, *Pelecanus* 73
optatus, *Cuculus* 108
oreophila, *Oenanthe* 331
orientalis, *Acrocephalus* 297
orientalis, *Branta* 12
orientalis, *Corvus* 256
orientalis, *Eurystomus* 223
orientalis, *Mergus* 35
orientalis, *Nisaetus* 206
orientalis, *Numenius* 135
orientalis, *Pernis* 192
orientalis, *Streptopelia* 45
orii, *Dendrocopos* 227
orii, *Garrulus* 252
orii, *Poecile* 263, 404
orii, *Troglodytes* 305, 404
orii, *Turdus* 316
Oriolidae 242
Oriolus 242
orix, *Euplectes* 398
ornata, *Emberiza* 377
ornatus, *Merops* 222, 404
oryzivora, *Lonchura* 402
osai, *Corvus* 258
osculans, *Haematopus* 122
oshiroi, *Buteo* 204

ostralegus, Haematopus
122
Otididae 102
Otidiformes 102
Otis 102
Otus 207
otus, Asio 215
owstoni, Dendrocopos 229
owstoni, Ficedula 337
owstoni, Poecile 262

P

pacifica, Gavia 51
pacificus, Apus 112
pacificus, Falco 235, 404
pacificus, Puffinus 57
Pagophila 162
pallasi, Emberiza 381, 405
pallasii, Cinclus 310
pallida, Megasceryle 222
pallidifrons, Lanius 249
pallidissimus, Larus 169
pallidus, Turdus 315
paludicola, Riparia 271
palustris, Poecile 261
Pandion 191
Pandionidae 191
pandoo, Monticola 332
Panuridae 266
Panurus 266
paradisaea, Sterna 180
paradisaea, Vidua 402
paradoxus, Syrrhaptes 42
parasiticus, Stercorarius
183
Paridae 261

Paroaria 402
Parulidae 370
Parus 264
Passer 342
Passerculus 385
Passerella 383
Passeridae 342
Passeriformes 239, 394
pastinator, Corvus 256
Pastor 308
Pavo 388
paykullii, Porzana 99
pealei, Falco 238
pekinensis, Alauda 269
pelagicus, Haliaeetus 195
pelagicus, Phalacrocorax
70, 71
Pelecanidae 73
Pelecaniformes 73, 391
Pelecanus 73
pendulinus, Remiz 260
penelope, Anas 19
perdix, Brachyramphus
187
peregrinus, Falco 237
Pericrocotus 241
Periparus 264
permagnus, Treron 48
Pernis 192
perplexus, Spilornis 196
personata, Emberiza 380
personata, Eophona 368
personata, Motacilla 348
personata, Sula 68
perspicillata, Melanitta 31
perspicillatus, Garrulax

395
phaeopus, Numenius 133
phaeopyga, Porzana 99
phaeopygia, Pterodroma
55
Phaethon 40
Phaethontidae 40
Phaethontiformes 40
Phalacrocoracidae 70
Phalacrocorax 70
Phalaropus 155
Phasianidae 1, 386
Phasianus 4, 387
philadelphia, Larus 164
philippensis, Agropsar 307
philippensis, Monticola
332
philippensis, Pelecanus 73
Philomachus 154
Phoebastria 52
Phoenicurus 326
phoenicurus, Amaurornis
96
phoenicurus, Phoenicurus
326, 327
Phylloscopidae 283
Phylloscopus 283
Pica 253, 394
pica, Pica 253, 394
Picidae 224
Piciformes 224
Picoides 230
Picus 231
pilaris, Turdus 319
pileata, Halcyon 219
pileatus, Anous 159

Pinicola 362
pipixcan, Larus 166
Pitta 239
Pittidae 239
placidus, Charadrius 118
Platalea 88
platyrhynchos, Anas 20
Plectrophenax 369
pleschanka, Oenanthe 331
pleskei, Locustella 295
plexa, Motacilla 345
Ploceidae 398
Ploceus 398
plotus, Sula 70
plumbeitarsus, Phylloscopus
 288
Pluvialis 115
Podiceps 38
Podicipedidae 37
Podicipediformes 37
Poecile 261
poggei, Tachybaptus 37
polaris, Emberiza 381
poliocephalus, Cuculus
 106
pollicaris, Rissa 161
poltaratskyi, Sturnus 309
Polysticta 30
pomarinus, Stercorarius
 182
Porzana 97
porzana, Porzana 98
pratensis, Anthus 352
Procellariidae 53
Procellariiformes 52
Procelsterna 160

proregulus, Phylloscopus
 286
Prunella 340
Prunellidae 340
pryeri, Hypsipetes 278
pryeri, Locustella 296
pryeri, Otus 208
Psittacidae 392
Psittaciformes 392
Psittacula 392
psittacula, Aethia 189
Pteroclididae 42
Pterocliiformes 42
Pterodroma 54
Ptilinopus 49
ptilocnemis, Calidris 151
ptilorhynchus, Pernis 192
Puffinus 57
puffinus, Puffinus 60
pugnax, Philomachus 154
pullus, Anous 160
punctulata, Lonchura 400
purpurea, Ardea 83
pusilla, Aethia 189
pusilla, Cardellina 370
pusilla, Emberiza 374
pusilla, Porzana 97
Pycnonotidae 276
Pycnonotus 276
pygmaea, Aethia 189
pygmeus, Eurynorhynchus
 153
Pyrrhula 364
pyrrhula, Pyrrhula 364
pyrrhulina, Emberiza 382

Q

quarta, Calidris 151
querquedula, Anas 23

R

Rallidae 94
Rallina 94
Rallus 95
Recurvirostra 124
Recurvirostridae 123, 391
Regulidae 259
Regulus 259
regulus, Regulus 259
relictus, Larus 166
Remiz 260
Remizidae 260
restricta, Cettia 280
restrictus, Poecile 261
Rhodostethia 163
richardi, Anthus 351
richardsi, Dryocopus 231,
 404
ridibundus, Larus 164
Riparia 271
riparia, Riparia 271
Rissa 161
riukiensis, Cettia 281
robustipes, Phasianus 4
rogersii, Fulmarus 53
rogersi, Calidris 145
rosacea, Pyrrhula 365
rosea, Rhodostethia 163
roseatus, Anthus 354
roseilia, Sitta 303
roseus, Carpodacus 362

roseus, Pastor 308
Rostratula 157
Rostratulidae 157
rothschildi, Phaethon 40
rubecula, Erithacus 320
rubescens, Anthus 355
rubescens, Locustella 295
rubetra, Saxicola 328
rubida, Prunella 341
rubricauda, Phaethon 40
rubripes, Sula 69
rubrirostris, Anser 8
ruficollis, Calidris 147
ruficollis, Tachybaptus 37
ruficollis, Turdus 317, 318
rufina, Netta 25
rufiventris, Phoenicurus
 326
russicus, Panurus 266
rustica, Emberiza 375
rustica, Hirundo 272
rusticola, Scolopax 125
rusticolus, Falco 237
rutila, Emberiza 377
rutilans, Passer 342, 343

S

sabini, Xema 162
sachalinensis, Poecile 261,
 404
sacra, Egretta 86
sakhalina, Calidris 151
sakhalinensis, Cettia 279
sakhalinensis, Pinicola 363
sandwichensis, Passerculus
 385

sandwichensis, Pterodroma
 55
sanguinolentus, Uragus
 360
sannio, Garrulax 396
Sapheopipo 233
saturata, Hirundo 272
saturata, Upupa 216
saturatus, Passer 343
saundersi, Larus 165
saxatilis, Procelsterna 160,
 404
Saxicola 328
scandiacus, Bubo 210
schach, Lanius 249
schistisagus, Larus 171
schoeniclus, Emberiza 382
schwarzi, Phylloscopus
 285
scintillans, Syrmaicus 3,
 387
scolopaceus, Eudynamys
 105
scolopaceus, Limnodromus
 130
Scolopacidae 125
Scolopax 125
scutulata, Ninox 213
seebohmi, Dendrocopos
 225
semipalmatus, Charadrius
 117
semipalmatus, Limnodromus
 131
semitorques, Otus 208
sepiaria, Rallina 94

serica, Pica 253, 394
sericeus, Spodiopsar 305
serrator, Mergus 35
serrirostris, Anser 8
Setophaga 370
shikokuensis, Dendrocopos
 226
sibilans, Luscinia 324
sibilatrix, Phylloscopus
 284
sibirica, Ficedula 336
sibirica, Limicola 153
sibirica, Muscicapa 334
sibirica, Zoothera 311
sibiricus, Uragus 360
sieboldii, Treron 48
simillima, Motacilla 345
sinensis, Ixobrychus 75
sinensis, Pycnonotus 276
sinensis, Sterna 175
sinensis, Sturnia 308
sinica, Chloris 356
Sitta 302
Sittidae 302
smithsonianus, Larus 171
smyrnensis, Halcyon 219
snowi, Cephus 186
soemmerringii, Syrmaicus
 3, 4, 387
solandri, Pterodroma 54
solitaria, Gallinago 127
solitarius, Monticola 332
soloensis, Accipiter 199
Somateria 30
sonorivox, Bambusicola
 386

sordida, *Pitta* 239
sorghophilus, *Acrocephalus* 298
sparveriioides, *Hierococcyx* 106
spectabilis, *Somateria* 30
sphenocercus, *Lanius* 250, 251
sylonotus, *Circus* 197
Spilornis 196
spinus, *Carduelis* 358
Spodiopsar 305
spodocephala, *Emberiza* 379
squamatus, *Mergus* 36
squameiceps, *Urosphena* 281
squamiceps, *Hypsipetes* 277
squatarola, *Pluvialis* 116
stagnatilis, *Tringa* 137
stegmanni, *Acrocephalus* 299
stegmanni, *Charadrius* 120
stejnegeri, *Columba* 44
stejnegeri, *Dendrocopos* 228
stejnegeri, *Hypsipetes* 278
stejnegeri, *Melanitta* 31
stejnegeri, *Saxicola* 328
stejnegeri, *Zosterops* 292, 394
stellaris, *Botaurus* 74
stellata, *Gavia* 50
stelleri, *Polysticta* 30
stenura, *Gallinago* 128

Stercorariidae 182
Stercorarius 182
Sterna 173
stimpsoni, *Streptopelia* 45
stolidus, *Anous* 159
strepera, *Anas* 17, 18
Streptopelia 45, 390
striata, *Butorides* 79
striata, *Lonchura* 400
striata, *Muscicapa* 333
striatus, *Gallirallus* 95
Strigidae 207
Strigiformes 207
Strix 211
Sturnia 308
Sturnidae 305, 396
sturninus, *Agropsar* 307
Sturnus 309
subbuteo, *Falco* 236
subcirris, *Dendrocopos* 228
subminuta, *Calidris* 148
subruficollis, *Tryngites* 154
subrufinus, *Dendrocopos* 225
subrufus, *Luscinia* 322, 404
subrufus, *Syrmaticus* 3, 387
Sula 68
sula, *Sula* 69
Sulidae 68
Suliformes 67
sulphurata, *Emberiza* 379
sumatrana, *Sterna* 178
sunia, *Otus* 208

sunsunpi, *Poecile* 263
superciliosus, *Lanius* 248
surinamensis, *Chlidonias* 182
Surniculus 105
suscitator, *Turnix* 157
svecica, *Luscinia* 322, 323
Sylvia 290
Sylviidae 290
Synthliboramphus 187
Syrmaticus 3, 387
Syrphaptus 42

T

Tachybaptus 37
Tachycineta 272
Tadorna 15
tadorna, *Tadorna* 15
tahitica, *Hirundo* 273
tahitiensis, *Numenius* 134
taitensis, *Urodynamis* 105
taivana, *Motacilla* 346
taiwanus, *Ptilinopus* 49
takatsukasae, *Picus* 232
tanensis, *Luscinia* 321
tanensis, *Phasianus* 5
tarda, *Otis* 102
Tarsiger 325
tegimae, *Pericrocotus* 242
telephonus, *Cuculus* 109
temminckii, *Calidris* 148
tenuirostris, *Calidris* 145
tenuirostris, *Numenius* 134, 404
tenuirostris, *Puffinus* 58
Terpsiphone 245

terrestris, *Cichlopasser* 312, 404
Tetrastes 1
Tetrax 103
tetrax, *Tetrax* 103
thalassinus, *Eumyias* 340
thayeri, *Larus* 170
thoracicus, *Bambusicola* 386
Thraupidae 402
Threskiornis 87
Threskiornithidae 87, 391
tianschanicus, *Cyanistes* 266
tigrinus, *Lanius* 247
Timaliidae 395
tinnunculus, *Falco* 233
Todiramphus 220
tohkaidi, *Phasianus* 5
tokugawae, *Garrulus* 252
topela, *Lonchura* 400
torda, *Alca* 185
torquata, *Melanocorypha* 267
torquatus, *Saxicola* 328
torquilla, *Jynx* 224
totanus, *Tringa* 137
totogo, *Ninox* 214
townsendi, *Plectrophenax* 369
toyoshimai, *Buteo* 203
tranquebarica, *Streptopelia* 46
Treron 48
tricolor, *Phalaropus* 155
tridactyla, *Rissa* 161

tridactylus, *Picoides* 230
Tringa 136
tristis, *Acridotheres* 397
tristis, *Phylloscopus* 284
tristrami, *Emberiza* 373
tristrami, *Oceanodroma* 64
trivialis, *Anthus* 352
trivirgatus, *Aegithalos* 282
trochilus, *Phylloscopus* 283
Troglodytes 304
troglodytes, *Estrilda* 399
troglodytes, *Troglodytes* 304
Troglodytidae 304
Tryngites 154
tundrae, *Charadrius* 117
Turdus 313
Turnicidae 157
Turnix 157
Tyto 207
Tytonidae 207

U

unalaschensis, *Passerella* 383
undulatus, *Melopsittacus* 392
Upupa 216
Upupidae 216
Uragus 360
uralensis, *Strix* 211
urbicum, *Delichon* 274
Uria 184
urile, *Phalacrocorax* 71
Urocissa 394

Urodynamis 105
Urosphena 281
ussuriensis, *Otus* 208, 404
ussuriensis, *Tringa* 137

V

valisineria, *Aythya* 25
Vanellus 113
vanellus, *Vanellus* 113
variabilis, *Emberiza* 380
variegatus, *Numenius* 134
varius, *Poecile* 262
vegae, *Larus* 170
venustulus, *Periparus* 264
veredus, *Charadrius* 121
versicolor, *Columba* 44, 404
versicolor, *Phasianus* 5
vicinitas, *Tetrastes* 1
Vidua 402
Viduidae 402
vipio, *Grus* 91
virgo, *Anthropoides* 93
viridigularis, *Gavia* 50
viscivorus, *Turdus* 320
vivida, *Niltava* 340
vlasowae, *Plectrophenax* 369
vulgaris, *Sturnus* 309

W

washingtoniensis, *Haliaeetus* 195
wumizusume,
Synthliboramphus 188

X

xanthodryas, *Phylloscopus*
288
Xema 162
Xenus 142

Y

yakushimensis, *Poecile* 263
yakutensis, *Phylloscopus*
283
yamashinai, *Chalcophaps*
47
yessoensis, *Emberiza* 382
yunnanensis, *Anthus* 353

Z

zanthopygia, *Ficedula* 336
zonorhyncha, *Anas* 21
Zonotrichia 384
Zoothera 311
Zosteropidae 291, 394
Zosterops 291, 394

索引

ア

- アイイロヒタキ属 340
 アイスランドカモメ 169
 アオアシシギ 138
 アオゲラ 231, 232
 アオゲラ属 231
 アオサギ 82
 アオサギ属 82
 アオジ 379, 380
 アオシギ 127
 アオショウビン 219
 アオツラカツオドリ 68
 アオバズク 213, 214
 アオバズク属 213
 アオバト 48
 アオバト属 48
 アオハライソヒヨドリ
 332
 アオヒタキ属 340
 アカアシアジサシ 179
 アカアシカツオドリ 69
 アカアシシギ 137
 アカアシチョウゲンボウ
 234
 アカアシミズナギドリ
 59
 アカアシミツユビカモメ
 162
 アカウソ 365
 アカエリカイツブリ 38
 アカエリヒレアシシギ
 155
 アカオネツタイチョウ
 40
 アカガオアメリカムシク
 イ属 370
 アカガシラカラスバト
 44
 アカガシラサギ 80
 アカガシラサギ属 80
 アカゲラ 229, 230
 アカゲラ属 225
 アカコッコ 317
 アカショウビン 217, 218
 アカショウビン属 217
 アカツクシガモ 16
 アカノドカルガモ 20
 アカハシハジロ 25
 アカハシハジロ属 25
 アカハジロ 27
 アカハラ 316
 アカハラダカ 199
 アカハラツバメ 272
 アカヒゲ 321, 322
 アカマシコ 361
 アカモズ 248
 アカヤマドリ 4
 アサクラサンショウクイ
 240, 241
 アサクラサンショウクイ
 属 240
 アジサシ 179
 アジサシ属 173
 アシナガウミツバメ 62
 アシナガウミツバメ属
 62
 アシナガシギ 152
 アトリ 356
 アトリ科 355
 アトリ属 355
 アナドリ 61
 アナドリ属 61
 アネハヅル 93
 アネハヅル属 93
 アビ 50
 アビ科 50
 アビ属 50
 アビ目 50
 アホウドリ 53
 アホウドリ科 52
 アホウドリ属 52
 アマサギ 81
 アマサギ属 81
 アマツバメ 112
 アマツバメ科 110
 アマツバメ属 112
 アマツバメ目 110
 アマミコゲラ 227
 アマミシジュウカラ 265
 アマミヒヨドリ 278
 アマミヤマガラ 263
 アマミヤマシギ 126
 アメリカイソシギ 143
 アメリカウズラシギ 149
 アメリカオオハシシギ
 130
 アメリカオグロシギ 132
 アメリカコガモ 25
 アメリカコハクチョウ
 14
 アメリカコムシクイ 287
 アメリカズグロカモメ
 166

アメリカセグロカモメ
171
アメリカハシグロクロハ
ラアジサシ 182
アメリカハヤブサ 239
アメリカヒドリ 19
アメリカヒレアシシギ
155
アメリカホシハジロ 26
アメリカムシクイ科 370
アメリカムナグロ 116
アラナミキンクロ 31
アリスイ 224
アリスイ属 224
アリューシャンウミバト
186

イ

イイジマムシクイ 289
イエスズメ 342
イオウトウメジロ 293,
394
イカル 368
イカル属 367
イカルチドリ 118
イシガキシジュウカラ
265
イシガキヒヨドリ 278
イスカ 363
イスカ属 363
イソシギ 143
イソシギ属 143
イソヒヨドリ 332
イソヒヨドリ属 332
イナダヨシキリ 298
イナバヒタキ 329

イヌワシ 206
イヌワシ属 205
イワツバメ 275
イワツバメ属 274
イワバホオジロ 373
イワヒバリ 340, 341
イワヒバリ科 340
イワミセキレイ 344
イワミセキレイ属 344
インコ科 392
インコ目 392
インドガン 10
インドクジャク 388
インドハッカ 397

ウ

ウィルソンアメリカムシ
クイ 370
ウ科 70
ウグイス 279, 280
ウグイス科 279
ウグイス属 279
ウスアカヒゲ 322, 404
ウスアカヤマドリ 3, 387
ウスハイイロチュウヒ
198
ウスベニタヒバリ 354
ウズラ 2
ウズラシギ 150
ウズラ属 2
ウソ 364, 365
ウ属 70
ウソ属 364
ウタスズメ 383
ウタスズメ属 383
ウチヤマセンニュウ 295

ウトウ 190
ウトウ属 190
ウミアイサ 35
ウミアイサ属 34
ウミウ 72
ウミオウム 189
ウミガラス 185
ウミガラス属 184
ウミスズメ 187
ウミスズメ科 184
ウミスズメ属 187
ウミツバメ科 62
ウミネコ 166
ウミバト 186
ウミバト属 186

エ

エゾアカゲラ 230
エゾオオアカゲラ 228
エゾコゲラ 225
エゾセンニュウ 296, 297
エゾビタキ 334
エゾフクロウ 211
エゾムシクイ 288
エゾヤマセミ 222
エゾライチョウ 1
エゾライチョウ属 1
エトピリカ 191
エトロフウミスズメ 190
エトロフウミスズメ属
189
エナガ 282
エナガ科 282
エナガ属 282
エリグロアジサシ 178
エリマキシギ 154

エリマキシギ属 154

オ

オウチュウ 243

オウチュウ科 243

オウチュウカッコウ 105

オウチュウカッコウ属
105

オウチュウ属 243

オオアカゲラ 228

オオアカハラ 316

オオアジサシ 174

オオカナダガン 389

オオカラモズ 250, 251

オオカワラヒワ 357

オオキアシシギ 139

オオキンランチョウ 398

オオクイナ 94

オオクイナ属 94

オオグンカンドリ 67

オオコノハズク 207, 208

オオジシギ 127

オオシベリアジュリン

381, 405

オオジュウイチ 106

オオジュリン 382

オオシロハラミズナギド
リ 54

オオズグロカモメ 166

オーストラリアセイタカ
シギ 124

オーストンウミツバメ
64

オーストンウミツバメ属
62

オーストンオオアカゲラ
229

オーストンヤマガラ 262

オオセグロカモメ 171

オオセッカ 296

オオソリハシシギ 132

オオタカ 201, 202

オオチドリ 121

オオトウゾクカモメ 182

オオトラツグミ 312

オオノスリ 204

オオハクガン 11

オオハクチョウ 14

オオハシウミガラス

185, 404

オオハシウミガラス属

185

オオハシシギ 130

オオハシシギ属 130

オオハム 50

オオハヤブサ 238

オオバン 101, 102

オオバン属 101

オオヒシクイ 7

オオヒバリ 269

オオホシハジロ 25

オオホンセイインコ 392

オオマシコ 362

オオマシコ属 361

オオミズナギドリ 56

オオミズナギドリ属 56

オオムシクイ 287

オオメダイチドリ 120

オオモズ 250

オオユキホオジロ 369

オオヨシキリ 297

オオヨシゴイ 76

オオルリ 339

オオルリ属 339

オオワシ 195

オガサワラガビチョウ

312, 404

オガサワラガビチョウ属
312

オガサワラカラスバト

44, 404

オガサワラカワラヒワ

357

オガサワラノスリ 203

オガサワラヒメミズナギ

ドリ 61

オガサワラヒヨドリ 277

オガサワラマシコ 361,

405

オガサワラマシコ属 361

オカヨシガモ 17, 18

オガワコマドリ 322, 323

オガワミソサザイ 305

オキナインコ 393

オキナインコ属 393

オキナワシジュウカラ

265

オグロシギ 131

オグロシギ属 131

オサハシブトガラス 258

オシドリ 16

オシドリ属 16

オジロトウネン 148

オジロビタキ 338

オジロワシ 194

オジロワシ属 194

オナガ 253

オナガガモ 22
 オナガ属 253
 オナガミズナギドリ 57
 オニアジサシ 173
 オニカッコウ 105
 オニカッコウ属 105
 オバシギ 145
 オバシギ属 145
 オリイコゲラ 227
 オリイヤマガラ 263

カ

カイツブリ 37
 カイツブリ科 37
 カイツブリ属 37
 カイツブリ目 37
 カエデチョウ 399
 カエデチョウ科 399
 カエデチョウ属 399
 カオグロガビチョウ 395
 カオジログビチョウ 396
 カオジロツメナガセキレイ 345
 カケス 251, 252
 カケス属 251
 カゴシマアオゲラ 232
 カササギ 253, 394
 カササギ属 253, 394
 カササギヒタキ科 245
 カシラダカ 375, 376
 カタグロトビ 193
 カタグロトビ属 193
 カタシロワシ 205
 カツオドリ 69, 70
 カツオドリ科 68
 カツオドリ属 68

カツオドリ目 67
 カッコウ 108, 109
 カッコウ科 104
 カッコウ属 106
 カッコウ目 104
 カナダカモメ 170
 カナダガン 388
 カナダヅル 90
 ガビチョウ 395
 ガビチョウ属 395
 カモ科 6, 388
 カモメ 167
 カモメ科 159
 カモメ属 163
 カモ目 6, 388
 カヤクグリ 341
 カヤクグリ属 340
 カラアカハラ 313
 カラシラサギ 86
 カラス科 251, 394
 カラス属 255
 カラスバト 43
 カラフトアオアシシギ 139
 カラフトウグイス 279
 カラフトコガラ 261, 404
 カラフトチュウヒバリ 269
 カラフトビンズイ 353
 カラフトムシクイ 286
 カラフトムジセッカ 285
 カラフトワシ 205
 カラムクドリ 308
 カラムクドリ属 308
 カリガネ 9
 カルガモ 21

カワアイサ 34, 35
 カワウ 71, 72
 カワガラス 310
 カワガラス科 310
 カワガラス属 310
 カワセミ 220
 カワセミ科 217
 カワセミ属 220
 カワラバト 389
 カワラバト属 42, 389
 カワラヒワ 356, 357
 カワラヒワ属 356
 カワリシロハラミズナギドリ 54
 カンムリウミスズメ 188
 カンムリオウチュウ 244, 245
 カンムリカイツブリ 38
 カンムリカイツブリ属 38
 カンムリカッコウ 104
 カンムリカッコウ属 104
 カンムリツクシガモ 16, 404
 カンムリワシ 196
 カンムリワシ属 196

キ

キアオジ 371
 キアシシギ 141
 キアシシギ属 141
 キアシセグロカモメ 171
 キガシラシトド 384
 キガシラセキレイ 346
 キクイタダキ 259
 キクイタダキ科 259

キクイタダキ属 259
 キジ 4, 387
 キジ科 1, 386
 キジカッコウ 105
 キジカッコウ属 105
 キジ属 4, 387
 キジバト 45
 キジバト属 45, 390
 キジ目 1, 386
 キセキレイ 347
 キタアマツバメ 112
 キタアラスカハマシギ
 152
 キタキバシリ 303
 キタタキ 231, 404
 キタツメナガセキレイ
 345
 キタヤナギムシクイ 283
 キヅタアメリカムシクイ
 370
 キツツキ科 224
 キツツキ目 224
 キバシリ 303
 キバシリ科 303
 キバシリ属 303
 キハタオリ属 398
 キバラガラ 264
 キバラムシクイ 285
 キビタキ 337
 キビタキ属 336
 キマユホオジロ 375
 キマユムシクイ 286
 キュウシュウエナガ 282
 キュウシュウキジ 5
 キュウシュウコゲラ 226

キュウシュウゴジュウカ
 ラ 303
 キュウシュウフクロウ
 212
 キョウジョシギ 144
 キョウジョシギ属 144
 キョクアジサシ 180
 キリアイ 153
 キリアイ属 153
 キレンジャク 301
 キンクロハジロ 28
 ギンザンマシコ 362, 363
 ギンザンマシコ属 362
 キンバト 47
 キンバト属 47
 キンパラ 401
 ギンパラ 401
 キンパラ属 400
 ギンムクドリ 305
 キンメフクロウ 213
 キンメフクロウ属 213
 キンランチョウ属 398

ク

クイナ 95
 クイナ科 94
 クイナ属 95
 クサシギ 140
 クサシギ属 136
 クジャク属 388
 クビワカモメ 162
 クビワカモメ属 162
 クビワキンクロ 27
 クビワコウテンシ 267
 クビワムクドリ属 398
 クマゲラ 231

クマゲラ属 231
 クマタカ 206
 クマタカ属 206
 クムリーンアイスランド
 カモメ 169
 クロアゴヒメアオバト
 49
 クロアジアホウドリ 52
 クロアジサシ 159
 クロアジサシ属 159
 クロウタドリ 314
 クロウミツバメ 64
 クロエリセイタカシギ
 391
 クロエリヒタキ 245
 クロエリヒタキ属 245
 クロガモ 32
 クロコシジロウミツバメ
 62
 クロサギ 86
 クロジ 380
 クロジョウビタキ 326
 クロツグミ 314
 クロツラヘラサギ 89
 クロヅル 92
 クロトウゾクカモメ 183
 クロトキ 87
 クロトキ属 87
 クロノビタキ 329
 クロハゲワシ 196
 クロハゲワシ属 196
 クロハラアジサシ 180
 クロハラアジサシ属 180
 グンカンドリ科 67
 グンカンドリ属 67

ケ

ケアシノスリ 204, 205
 ケイマフリ 186
 ケリ 114
 ケワタガモ 30
 ケワタガモ属 30

コ

コアオアシシギ 137
 コアカゲラ 227, 228
 コアジサシ 175
 コアホウドリ 52
 コイカル 367
 ゴイサギ 78, 79
 ゴイサギ属 78
 コウカンチョウ 402
 コウカンチョウ属 402
 コウテンシ 267
 コウテンシ属 267
 コウノトリ 66, 390
 コウノトリ科 65, 390
 コウノトリ属 65, 390
 コウノトリ目 65, 390
 コウミスズメ 189
 コウライアイサ 36
 コウライウグイス 242
 コウライウグイス科 242
 コウライウグイス属 242
 コウライキジ 387
 コウライクイナ 99
 コオバシギ 145
 コオリガモ 32
 コオリガモ属 32
 コガモ 24
 コカモメ 168
 コガラ 261
 コガラ属 261
 コカワアイサ 35
 コキアシシギ 139
 コクガン 12
 コクガン属 11, 388
 コクチョウ 389
 コクマルガラス 255
 コグンカンドリ 67, 68
 コゲラ 225, 226
 コケワタガモ 30
 コケワタガモ属 30
 コサギ 85
 コサギ属 84
 コサメビタキ 335
 コシアカツバメ 274
 コシギ 126
 コシギ属 126
 コシジロアジサシ 175
 コシジロウズラシギ 149
 コシジロウミツバメ 63
 コシジロオオソリハシシギ 132
 コシジロキンパラ 400
 コシジロヤマドリ 4
 コシヤクシギ 133
 ゴジュウカラ 302
 ゴジュウカラ科 302
 ゴジュウカラ属 302
 コジュケイ 386
 コジュケイ属 386
 コジュリン 382
 コスズガモ 29
 コチドリ 118
 コチョウゲンボウ 235
 コトラツグミ 312
 コノドジロムシクイ 290
 コノハズク 208, 209
 コノハズク属 207
 コハクチョウ 13, 14
 コバシギンザンマシコ 362
 コバシチドリ 122
 ゴビズキンカモメ 166
 コヒバリ 268
 コブハクチョウ 13, 389, 404
 コベニヒワ 359
 コホオアカ 374
 コマドリ 321
 ゴマフスズメ 383
 ゴマフスズメ属 383
 コマミジロタヒバリ 351
 コミズナギドリ 59
 コミミズク 215, 216
 コムクドリ 307
 コムクドリ属 307
 コムシクイ 287
 コモンクイナ 98
 コモンシギ 154
 コモンシギ属 154
 コヨシキリ 298
 コルリ 324

サ

サイチョウ目 216
 サカツラガン 6
 サギ科 74
 サケイ 42
 サケイ科 42
 サケイ属 42
 サケイ目 42

ササゴイ 79, 80
 ササゴイ属 79
 サシバ 202
 サシバ属 202
 サドカケス 252
 サバクヒタキ 331
 サバクヒタキ属 329
 サバンナシトド 385
 サバンナシトド属 385
 サメイロオオコノハズク
 208, 404
 サメビタキ 334
 サメビタキ属 333
 サルハマシギ 150
 サンカノゴイ 74
 サンカノゴイ属 74
 サンコウチョウ 245
 サンコウチョウ属 245
 サンジャク属 394
 サンショウクイ 241
 サンショウクイ科 240
 サンショウクイ属 241

シ

シギ科 125
 シコクコゲラ 226
 シコクヤマドリ 3
 シジュウカラ 264, 265
 シジュウカラ科 261
 シジュウカラガン 11
 シジュウカラ属 264
 シチトウメジロ 292, 394
 シノリガモ 30
 シノリガモ属 30
 シベリアアオジ 379

シベリアアリスイ 224,
 404
 シベリアオオハシシギ
 131
 シベリアオオモズ 250,
 404
 シベリアシメ 366
 シベリアジュリン 381
 シベリアセンニュウ 295
 シベリアツメナガセキレ
 イ 345
 シベリアハクセキレイ
 348
 シベリアムクドリ 307
 シマアオジ 377
 シマアカモズ 248
 シマアジ 23
 シマエナガ 282
 シマキジ 5
 シマキンパラ 400
 シマクイナ 94
 シマクイナ属 94
 シマゴマ 324
 シマセンニュウ 294
 シマノジコ 377
 シマハヤブサ 238, 404
 シマフクロウ 211
 シマフクロウ属 211
 シマメジロ 293
 シメ 366
 シメ属 366
 ジュウイチ 106
 ジュウイチ属 106
 ショウドウツバメ 271
 ショウドウツバメ属 271
 ジョウビタキ 327

ジョウビタキ属 326
 シラオネツタイチョウ
 41
 シラガホオジロ 371, 372
 シラコバト 46, 390
 シラヒゲウミスズメ 189
 シロアジサシ 161
 シロアジサシ属 161
 シロエリオオハム 51
 シロオオタカ 201
 シロガシラ 276
 シロガシラカツオドリ
 70
 シロガシラ属 276
 シロカモメ 169
 シロチドリ 119
 シロハヤブサ 237
 シロハラ 315
 シロハラアカアシミズナ
 ギドリ 59
 シロハラクイナ 96
 シロハラクイナ属 96
 シロハラゴジュウカラ
 302
 シロハラチュウシャクシ
 ギ 134, 404
 シロハラトウゾクカモメ
 183
 シロハラホオジロ 373
 シロハラミズナギドリ
 56
 シロハラミズナギドリ属
 54
 シロビタイジョウビタキ
 326, 327
 シロフクロウ 210

ス

ズアオアトリ 355, 356
 ズアオホオジロ 373
 ズアカアオバト 48
 ズグロカモメ 165
 ズグロチャキンチョウ
 378
 ズグロミゾゴイ 78
 ズグロムシクイ科 290
 ズグロムシクイ属 290
 ズグロヤイロチョウ 239
 スズガモ 28, 29
 スズガモ属 25
 スズメ 343
 スズメ科 342
 スズメ属 342
 スズメ目 239, 394

セ

セアカジョウビタキ 326
 セアカモズ 249
 セイタカシギ 123, 391
 セイタカシギ科 123, 391
 セイタカシギ属 123, 391
 セキセイインコ 392
 セキセイインコ属 392
 セキレイ科 344
 セキレイ属 344
 セグロアジサシ 177
 セグロカッコウ 107
 セグロカモメ 170
 セグロサバクヒタキ 331
 セグロセキレイ 350
 セグロミズナギドリ 60
 セジロタヒバリ 353, 354

セスジコヨシキリ 298
 セッカ 300
 セッカ科 300
 セッカ属 300
 センダイムシクイ 289
 センニュウ科 294
 センニュウ属 294

ソ

ゾウゲカモメ 162
 ゾウゲカモメ属 162
 ソウシチョウ 396
 ソウシチョウ属 396
 ソデグロヅル 90
 ソリハシシギ 142
 ソリハシシギ属 142
 ソリハシセイタカシギ
 124
 ソリハシセイタカシギ属
 124

タ

ダイサギ 83, 84
 ダイシャクシギ 135
 ダイシャクシギ属 133
 ダイゼン 116
 ダイトウウグイス 280
 ダイトウカイツブリ 37
 ダイトウコノハズク 209
 ダイトウノスリ 204
 ダイトウヒヨドリ 277
 ダイトウミソサザイ
 305, 404
 ダイトウメジロ 293
 ダイトウヤマガラ 263,
 404

タイリクワシミミズク
 210
 タイワンショウドウツバ
 メ 271
 タイワンハクセキレイ
 349
 タイワンヒヨドリ 278
 タカ科 192
 タカサゴクロサギ 77
 タカサゴモズ 249
 タカブシギ 140
 タカ目 191
 タゲリ 113
 タゲリ属 113
 タシギ 129
 タシギ属 127
 タネアオゲラ 232
 タネコマドリ 321
 タネヤマガラ 263
 タヒバリ 355
 タヒバリ属 351
 タマシギ 157
 タマシギ科 157
 タマシギ属 157
 ダルマインコ 393
 ダルマインコ属 392
 タンチョウ 91

チ

チゴハヤブサ 236
 チゴモズ 247
 チシマウガラス 71
 チシマシギ 151
 チドリ科 113
 チドリ属 117
 チドリ目 113, 391

チフチャフ 283, 284
 チメドリ科 395
 チャガシラカモメ 164
 チャキンチョウ 378
 チャツグミ属 313
 チャバラアカゲラ 225
 チャバラオオルリ 340
 チュウサギ 84, 85
 チュウジンギ 129
 チュウシャクシギ 133,
 134
 チュウダイサギ 84
 チュウダイズアカアオバ
 ト 49
 チュウヒ 197
 チュウヒ属 197
 チョウゲンボウ 233, 234
 チョウセンアオバズク
 213
 チョウセンウグイス 279
 チョウセンエナガ 282
 チョウセンオオルリ 339
 チョウセンハシブトガラ
 ス 257
 チョウセンミソサザイ
 304
 チョウセンメジロ 291

ツ

ツクシガモ 15
 ツクシガモ属 15
 ツグミ 318
 ツグミ属 313
 ツシマコゲラ 226
 ツツドリ 108
 ツノメドリ 190

ツノメドリ属 190
 ツバメ 272, 273
 ツバメ科 271
 ツバメ属 272
 ツバメチドリ 158
 ツバメチドリ科 158
 ツバメチドリ属 158
 ツミ 200
 ツメナガセキレイ 344,
 346
 ツメナガホオジロ 368
 ツメナガホオジロ科 368
 ツメナガホオジロ属 368
 ツリスガラ 260
 ツリスガラ科 260
 ツリスガラ属 260
 ツル科 90
 ツルクイナ 100
 ツルクイナ属 100
 ツルシギ 136
 ツル属 90
 ツル目 90

テ

テkkeイ 386
 テンニンチョウ科 402
 テンニンチョウ属 402

ト

トウカイキジ 5
 トウゾクカモメ 182
 トウゾクカモメ科 182
 トウゾクカモメ属 182
 トウネン 147
 トキ 88, 391

トキ科 87, 391
 トキ属 88, 391
 ドバト 389
 トビ 193, 194
 トビ属 193
 トモエガモ 24
 トラツグミ 311
 トラツグミ属 311
 トラフズク 215
 トラフズク属 215

ナ

ナキイスカ 364
 ナキハクチョウ 13
 ナベコウ 65
 ナベヅル 92
 ナミエオオアカゲラ 229
 ナミエヤマガラ 262
 ナンキンオシ 17
 ナンキンオシ属 17
 ナンヨウショウビン 220
 ナンヨウショウビン属
 220
 ナンヨウマミジロアジサ
 シ 176, 404

ニ

ニシイワツバメ 274
 ニシコクマルガラス 255
 ニシシベリアカモメ 168
 ニシシベリアハクセクレ
 イ 348
 ニシセグロカモメ 172
 ニュウナイスズメ 342,
 343

ネ

ネツタイチョウ科 40
 ネツタイチョウ属 40
 ネツタイチョウ目 40
 ネパールハクセキレイ
 348

ノ

ノガン 102, 103
 ノガン科 102
 ノガン属 102
 ノガン目 102
 ノグチゲラ 233
 ノグチゲラ属 233
 ノゴマ 323
 ノゴマ属 321
 ノジコ 379
 ノスリ 203
 ノスリ属 203
 ノドアカツグミ 318
 ノドグロツグミ 317
 ノハラツグミ 319
 ノビタキ 328
 ノビタキ属 328

ノ

ハイイロアジサシ 160,
 404
 ハイイロアジサシ属 160
 ハイイロウミツバメ 64,
 65
 ハイイロオウチュウ 244
 ハイイロガン 8
 ハイイロチャツグミ 313

ハイイロチュウヒ 198
 ハイイロハッカ 397
 ハイイロヒレアシシギ
 155
 ハイイロペリカン 73
 ハイイロミズナギドリ
 58
 ハイイロミズナギドリ属
 57
 ハイタカ 201
 ハイタカ属 199
 ハギマシコ 359, 360
 ハギマシコ属 359
 ハクガン 10
 ハクセキレイ 348, 349
 ハクチョウ属 13, 389
 ハクトウワシ 195
 ハグロシロハラミズナギ
 ドリ 55
 ハゴロモムシクイ属 370
 ハシグロアビ 51
 ハシグロクロハラアジサ
 シ 181
 ハシグロヒタキ 330
 ハシジロアビ 51
 ハシナガウグイス 280
 ハシナガホシガラス
 254, 404
 ハシビロガモ 21
 ハシブトアカゲラ 229
 ハシブトアジサシ 172,
 173
 ハシブトアジサシ属 172
 ハシブトウミガラス 184
 ハシブトオオヨシキリ
 299

ハシブトガラ 261
 ハシブトガラス 257
 ハシブトゴイ 79, 404
 ハシブトヒヨドリ 277
 ハシボソカモメ 163
 ハシボソガラス 256
 ハシボソシロチドリ 119
 ハシボソミズナギドリ
 58
 ハジロカイツブリ 39, 40
 ハジロクロハラアジサシ
 181
 ハジロコチドリ 117
 ハジロミズナギドリ 54
 ハタオリドリ科 398
 ハチクイ 222, 404
 ハチクイ科 222
 ハチクイ属 222
 ハチクマ 192
 ハチクマ属 192
 ハチジョウツグミ 319
 ハッカチョウ 396, 397
 ハッカチョウ属 396
 ハト科 42, 389
 ハト目 42, 389
 ハハジマメグロ 291
 ハマシギ 151
 ハマヒバリ 270
 ハマヒバリ属 270
 ハヤブサ 237
 ハヤブサ科 233
 ハヤブサ属 233
 ハヤブサ目 233
 バライロムクドリ 308
 バライロムクドリ属 308
 ハリオアマツバメ 111

ハリオアマツバメ属 111
 ハリオシギ 128
 ハリモモチュウシャク
 134
 ハワイシロハラミズナギ
 ドリ 55
 ハワイセグロミズナギド
 リ 60
 バン 100, 101
 バンケン 104
 バンケン属 104
 バン属 100

ヒ

ヒガシコチュウゲンボウ
 235, 404
 ヒガシメンフクロウ 207
 ヒガラ 264
 ヒガラ属 264
 ヒクイナ 98
 ヒゲガビチョウ 395
 ヒゲガラ 266
 ヒゲガラ科 266
 ヒゲガラ属 266
 ヒシクイ 7, 8
 ヒタキ科 311
 ヒドリガモ 19
 ヒバリ 269, 270
 ヒバリ科 267
 ヒバリシギ 148
 ヒバリ属 269
 ヒマラヤアナツバメ 110
 ヒマラヤアナツバメ属
 110
 ヒメアオバト属 49
 ヒメアマツバメ 113

ヒメイソヒヨ 333
 ヒメウ 70, 71
 ヒメウズラシギ 149
 ヒメウタイムシクイ 299
 ヒメウタイムシクイ属
 299
 ヒメウミスズメ 184
 ヒメウミスズメ属 184
 ヒメカモメ 165
 ヒメクイナ 97
 ヒメクイナ属 97
 ヒメクビワカモメ 163
 ヒメクビワカモメ属 163
 ヒメクロアジサシ 160
 ヒメクロウミツバメ 63
 ヒメコウテンシ 267, 268
 ヒメコウテンシ属 267
 ヒメシジュウカラガン
 12
 ヒメシロハラミズナギド
 リ 56
 ヒメチョウゲンボウ 233
 ヒメノガン 103
 ヒメノガン属 103
 ヒメハジロ 33
 ヒメハマシギ 146
 ヒメヒシクイ 7
 ヒメモリバト 42
 ヒヨドリ 276
 ヒヨドリ科 276
 ヒヨドリ属 276
 ヒレアシシギ属 155
 ヒレンジャク 301
 ビロードキンクロ 31
 ビロードキンクロ属 31
 ビンズイ 353

フ

フウキンチョウ科 402
 フクロウ 211, 212
 フクロウ科 207
 フクロウ属 211
 フクロウ目 207
 ブッポウソウ 223
 ブッポウソウ科 223
 ブッポウソウ属 223
 ブッポウソウ目 217
 フルマカモメ 53
 フルマカモメ属 53
 ブンチョウ 402

ヘ

ヘキチョウ 401
 ベニアジサシ 177, 178
 ベニスズメ 399
 ベニスズメ属 399
 ベニバト 46, 47
 ベニバラウソ 365
 ベニヒワ 358, 359
 ベニマシコ 360
 ベニマシコ属 360
 ヘラサギ 88
 ヘラサギ属 88
 ヘラシギ 153
 ヘラシギ属 153
 ペリカン科 73
 ペリカン属 73
 ペリカン目 73, 391
 ベンガルアジサシ 175

ホ

ホウオウジャク 402

ホウロクシギ 135
 ホオアカ 374
 ホオアカカエデチョウ
 399
 ホオジロ 372
 ホオジロ科 371
 ホオジロガモ 33
 ホオジロガモ属 33
 ホオジロ属 371
 ホオジロハクセキレイ
 350
 ホオジロムクドリ 398
 ホシガラス 254
 ホシガラス属 254
 ホシバシペリカン 73
 ホシハジロ 26
 ホシムクドリ 309
 ホシムクドリ属 309
 ホトトギス 106
 ボナパルトカモメ 164
 ホンセイインコ 392
 ホントウアカヒゲ 322

マ

マガモ 20
 マガモ属 17
 マガン 9
 マガン属 6
 マキノセンニュウ 294
 マキバタヒバリ 352
 マダラウミスズメ 187
 マダラウミスズメ属 187
 マダラシロハラミズナギ
 ドリ 55
 マダラチュウヒ 199
 マダラヒタキ 336

マナヅル 91
 マヒワ 358
 マヒワ属 358
 マミジロ 311
 マミジロアジサシ 176
 マミジロキビタキ 336
 マミジロクイナ 99, 404
 マミジロタヒバリ 351
 マミジロツメナガセキレ
 イ 345
 マミジロノビタキ 328
 マミチャジナイ 315
 マリアナヨシゴイ 75,
 404
 マンクスミズナギドリ
 60

ミ

ミカツキシマアジ 21
 ミカドガン 11
 ミコアイサ 34
 ミコアイサ属 34
 ミサゴ 191, 192
 ミサゴ科 191
 ミサゴ属 191
 ミズカキチドリ 117
 ミズナギドリ科 53
 ミズナギドリ目 52
 ミゾゴイ 77
 ミゾゴイ属 77
 ミソサザイ 304
 ミソサザイ科 304
 ミソサザイ属 304
 ミツユビカモメ 161
 ミツユビカモメ属 161
 ミツユビカワセミ 221

ミツユビカワセミ属 221
 ミドリツバメ 272
 ミドリツバメ属 272
 ミナミオナガミズナギド
 リ 58
 ミナミクイナ 95
 ミフウズラ 157, 158
 ミフウズラ科 157
 ミフウズラ属 157
 ミミカイツブリ 39
 ミヤケコゲラ 226
 ミヤコショウビン 220,
 404
 ミヤコドリ 122
 ミヤコドリ科 122
 ミヤコドリ属 122
 ミヤマカケス 251
 ミヤマガラス 256
 ミヤマシトド 384
 ミヤマシトド属 384
 ミヤマヒタキ 335
 ミヤマホオジロ 376
 ミユビゲラ 230
 ミユビゲラ属 230
 ミユビシギ 146

ム

ムギマキ 338
 ムクドリ 306
 ムクドリ科 305, 396
 ムクドリ属 305
 ムシクイ科 283
 ムシクイ属 283
 ムジセッカ 284
 ムナグロ 115
 ムナグロ属 115

ムナフヒタキ 333
ムネアカタヒバリ 354
ムラサキサギ 83

メ

メグロ 291, 404
メグロ属 291
メジロ 292, 394
メジロ科 291, 394
メジロガモ 27
メジロ属 291, 394
メダイチドリ 120
メボソムシクイ 288
メリケンキアシシギ 141
メンガタハクセキレイ
348
メンハタオリドリ 398
メンフクロウ科 207
メンフクロウ属 207

モ

モウコアカモズ 249
モウコメダイチドリ
120, 404
モズ 247
モズ科 247
モスケミソサザイ 305
モズ属 247
モミヤマフクロウ 212
モモイロペリカン 73
モリツバメ 240
モリツバメ科 240
モリツバメ属 240
モリハッカ 397
モリムシクイ 284

ヤ

ヤイロチョウ 239
ヤイロチョウ科 239
ヤイロチョウ属 239
ヤクシマカケス 252
ヤクシマヤマガラ 263
ヤツガシラ 216
ヤツガシラ科 216
ヤツガシラ属 216
ヤドリギツグミ 320
ヤナギムシクイ 288
ヤブサメ 281
ヤブサメ属 281
ヤブヨシキリ 299
ヤマガラ 262
ヤマゲラ 232
ヤマザキヒタキ 329
ヤマシギ 125
ヤマシギ属 125
ヤマショウビン 219
ヤマセミ 222
ヤマセミ属 222
ヤマドリ 3, 387
ヤマドリ属 3, 387
ヤマヒバリ 341
ヤマムスメ 394
ヤンバルクイナ 95
ヤンバルクイナ属 95

ユ

ユキホオジロ 369
ユキホオジロ属 369
ユリカモメ 164

ヨ

ヨーロッパコマドリ 320
ヨーロッパコマドリ属
320
ヨーロッパチュウヒ 197
ヨーロッパトウネン 147
ヨーロッパビンズイ 352
ヨーロッパムナグロ 115
ヨシガモ 18
ヨシキリ科 297
ヨシキリ属 297
ヨシゴイ 75
ヨシゴイ属 75
ヨタカ 109, 110
ヨタカ科 109
ヨタカ属 109
ヨタカ目 109
ヨナグニカラスバト 44

ラ

ライチョウ 1, 2
ライチョウ属 1

リ

リュウキュウアオバズク
214
リュウキュウアカショウ
ビン 218
リュウキュウウグイス
281
リュウキュウオオコノハ
ズク 208
リュウキュウガモ 6, 404
リュウキュウガモ属 6

リュウキュウカラスバト
44, 404

リュウキュウキジバト
45

リュウキュウキビタキ
337

リュウキュウクロアジサ
シ 160

リュウキュウコゲラ 227

リュウキュウコノハズク
209

リュウキュウサンコウ
チョウ 246

リュウキュウサンショウ
クイ 242

リュウキュウツバメ 273

リュウキュウツミ 200

リュウキュウハシブトガ
ラス 258

リュウキュウヒクイナ
99

リュウキュウヒヨドリ
278

リュウキュウメジロ 293

リュウキュウヨシゴイ
76

ル

ルリカケス 252

ルリガラ 266

ルリガラ属 266

ルリビタキ 325

ルリビタキ属 325

レ

レンカク 156

レンカク科 156

レンカク属 156

レンジャク科 301

レンジャク属 301

レンジャクノジコ 371

ロ

ロクショウヒタキ 340

ワ

ワカケホンセイインコ
392

ワキアカツグミ 319, 320

ワキスジハヤブサ 236

ワシカモメ 168

ワシミミズク 210, 211

ワシミミズク属 210

ワタリガラス 258

ワライカモメ 165

日本鳥類目録 改訂第 7 版
Check-list of Japanese Birds, 7th revised edition.

2012 年 9 月 7 日印刷

2012 年 9 月 15 日発行

編集： 日本鳥学会（目録編集委員会）

発行： 日本鳥学会

〒669-1546 兵庫県三田市弥生が丘 6 丁目

兵庫県立大学自然・環境科学研究所気付

Tel: 079-559-2001 Fax: 079-559-2015

印刷： レタープレス株式会社 東京営業所

〒170-0003 東京都豊島区駒込 1-37-4 エクセルハイム 201

Tel: 03-5976-8985 Fax: 03-5981-9471

Recommended citation:

The Ornithological Society of Japan (2012) Check-list of Japanese Birds, 7th revised edition.
The Ornithological Society of Japan, Sanda.

日本鳥学会 (2012) 日本鳥類目録改訂第 7 版. 日本鳥学会, 三田.

©日本鳥学会 2012

乱丁・落丁本はお取り替えます。印刷所までご連絡ください。

ISBN978-4-930975-00-3



